

DEFINICIÓN DE SINTOMÁTICO RESPIRATORIO PARA TUBERCULOSIS EN PERSONAS CON VIH O INMUNOSUPRESIÓN

De acuerdo a los lineamientos de la Resolución 227 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis.

Definición:

En personas con VIH o inmunosuprimidas, un sintomático respiratorio se caracteriza por presentar:



Tos y expectoración más de 15 días.



Fiebre.



Pérdida de peso.



Sudoración nocturna.

De cualquier tiempo de duración.

RECUERDE:

Si cumple la definición de sintomático respiratorio. Debe solicitar: **Baciloscopia, prueba molecular, cultivo y radiografía de Tórax.**



Una persona puede estar inmunosuprimida por diferentes razones:

- **Edad:** Adultos mayores (>65 años) y niños (<5 años).
- **Comorbilidades:** Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) /Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), Diabetes Mellitus, Cáncer, Desnutrición, Enfermedad Renal Crónica, entre otras.
- **Tratamientos farmacológicos:** Antineoplásicos, antirretrovirales, corticoesteroides.
- Personas en proceso y tratamiento de **trasplante de órganos.**



Referencia bibliográfica:

1. República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 227 del 2020. [Internet] 2020 [Consultado 27 - 03- 20]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20227%20de%202020.pdf

Autoras

Ana Helena Puerto Guerrero.
Profesora Asociada, Facultad de Enfermería
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.

Alba Idaly Muñoz Sánchez.
Profesora Titular, Facultad de Enfermería
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.

Yurian Lida Rubiano Mesa.
Profesora Asistente, Facultad de Enfermería
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.

Heidy Natalia Urrego Parra.
Estudiante de pregrado Facultad de Enfermería
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.