

# BÚSQUEDA ACTIVA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS

¡Información para recordar!

1

## Sintomáticos respiratorios en población general

Se caracteriza por presentar:

- Tos y expectoración por **más de 15 días**



2

## Si un sintomático respiratorio cumple con la definición debe solicitar:


- **Baciloscopia** seriada de esputo.
- **Cultivo** para *Mycobacterium tuberculosis*.
- **Pruebas moleculares.**
- **Radiografía de Tórax.**



3

**La tuberculosis pulmonar** es la más común. En Bogotá, representa el **70%** del total de los casos.

**Requiere aislamiento por aerosol.**



## Síntomas

Los síntomas más comunes en la población en general son:



Tos y expectoración más de 15 días.



Sudoración nocturna.



Fiebre.



Pérdida de peso.



Fatiga y/o debilidad.



Dolor torácico.

4

5

## Tratamiento

El esquema se compone de **dos fases:**

### •Fase Intensiva - 2 Meses

**Tetraconjugados:** Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida, Etambutol.

### •Fase Continua - 4 Meses

**Biconjugados:** Rifampicina, Isoniacida.

6

## Elementos de protección personal

El personal de salud **siempre** debe utilizar el **mascarilla N95** en la atención de pacientes con tuberculosis activa.

Las personas con tuberculosis tienen **derecho** a los **controles** establecidos en la Resolución 227 del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.



### Referencia bibliográfica:

1. República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 227 del 2020. [Internet] 2020 [Consultado 27 - 03- 20]. Disponible en: [https://www.minsalud.gov.co/Normatividad\\_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20227%20de%202020.pdf](https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20227%20de%202020.pdf)