

## CARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON VITILIGO EN UN HOSPITAL UNIVERSITARIO EN COLOMBIA

---

Jorge M Palmezano Diaz<sup>1\*</sup>, Claudia L Figueroa Pineda<sup>1</sup>, Reynaldo M Amaya<sup>1</sup>,  
Lisette K. Plazas<sup>1</sup>, Jaime A. Machado Bernal<sup>1</sup>, Viviana P. Estupiñan Garzón<sup>1</sup>, Zully J. Ballesteros<sup>1</sup>

**Introducción y objetivo:** El vitiligo es una hipomelanosis adquirida que se manifiesta clínicamente por la aparición progresiva de máculas acrómicas en la piel y cabello de áreas afectadas. La prevalencia mundial es de 0,5% a 2%. El objetivo, es dar a conocer la caracterización dermatológica clínica y terapéutica de los pacientes del Hospital Universitario de Santander. **Métodos:** Estudio observacional, descriptivo de corte transversal retrospectivo. La población estudio fueron pacientes con Vitiligo que ingresaron a un hospital universitario de Colombia entre el período comprendido entre los años 2012-2016 en pacientes mayores de 13 años que ingresen a la institución. **Resultados:** Se analizaron 64 pacientes que tenían una mediana de edad de 41,1 años, la mediana de tiempo de evolución de la enfermedad fue de 12 meses, con distribución de sexo con relación 1:1; en la caracterización clínica 100% de los pacientes presentaron hipopigmentación cutánea; la localización de las lesiones fue en miembros superiores 51.56%, cabeza y cuello 43.75%, miembros inferiores con 28.13%, tórax 18.75%, región perineal 9.38% y abdomen 6.25%. El tratamiento, 62,5% con tacrolímús, 28.13% clobetasol, 3,13% psoralenos + PUVA (fotoquimioterapia), y 1,56% fototerapia. **Conclusiones:** Las características sociodemográficas encontradas son similares a lo encontrado teóricamente a nivel mundial, la distribución por sexo es similar, la característica clínica general fue la hipopigmentación cutánea, con localización más frecuente en miembros superiores y el tratamiento fue con tacrolímús.

**Palabras clave:**

*Vitiligo, Fotoquimioterapia, Mácula, Tratamiento.*

---

<sup>1</sup> Escuela de Medicina, Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga, Colombia.  
<sup>\*</sup> **Correo electrónico:** palmezano96@hotmail.com

**Tabla 1.** Características sociodemográficas de pacientes con Vitiligo.

Características sociodemográficas (n=64)	
Edad promedio	41,1 años, DE: 20,5
Tiempo de enfermedad	Mediana: 12 meses
Sexo	Femenino: 33 (51,6%)

**Tabla 2.** Características clínicas de pacientes con Vitiligo.

Características clínicas (n=64)		
Localización de las lesiones		
Variable	n	%
Miembros superiores	33	51.6
Cabeza y cuello	28	43.8
Miembros inferiores	18	28.1
Tórax	12	18.8
Región perineal	6	9.4
Abdomen	4	6.3

**Tabla 3.** Características del tratamiento de pacientes con Vitiligo.

Tratamiento (n=64)		
Variable	n	%
Tacrolimús	40	62,5
Clobetasol	18	28,1
Psoralenos + PUVA	2	3,1
Fototerapia	1	1,6
No farmacológico	55	85,9
Sin datos	9	14,1