Análisis de impacto presupuestal de 21 tecnologías para el manejo quimioterapéutico del cáncer en Colombia

Octubre 2017

Miembro de:

International Network of Agencies
for Health Technology
Assessment

Red de Evaluación de
Tecnologías en Salud de las
Américas

Centro asociado

El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS, es una corporación sin ánimo de lucro, de participación mixta y de carácter privado, con patrimonio propio, creado según lo estipulado en la Ley 1438 de 2011. Su misión es contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas y prácticas asistenciales en salud, mediante la producción de información basada en evidencia, a través de la evaluación de tecnologías en salud y guías de práctica clínica, con rigor técnico, independencia y participación. Sus miembros son el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, el Instituto Nacional de Salud - INS, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina - ASCOFAME y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Autores

Vanegas, Egdda. Química Farmacéutica. Magister, Diseño y Gestión de Procesos. PhD (c) Ingeniería Industrial, Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS.

Pinzón, Carlos. Médico, MSc en Epidemiología Clínica, Doctor en Salud Pública con área de concentración en Sistemas de Salud. Subdirector de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS.

Rodríguez, Edisson. Administrador público, Especialista en proyectos, MSc (c) en Economía de las políticas públicas. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IETS

Gamboa, Carlos. Economista. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud- IETS.

Avellaneda, Paola. Economista. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS.

Morales, Gilberto. Ingeniero Industrial, Msc Ingeniería Industrial. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IETS.

León, Érika. Odontóloga. Especialista en Epidemiología. MSc en Epidemiología Clínica. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud- IETS.

López, Nancy. Química Farmacéutica, Especialista en Gerencia Hospitalaria, Ms(c) Gestión y auditorías ambientales, Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS.

Segura, Diana. Química Farmacéutica, Especialista en economía de la salud, Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS

Rojas, Marcela. Química Farmacéutica, Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS

Osorio Diana. Economista – Msc (c), Economía de la Salud. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud IETS.

Agradecimientos

Gamboa Garay Óscar Andrés. Médico. Especialista en Estadística. MSc en Economía.
Instituto Nacional de Cancerología.

Suárez Mattos, Amaranto. Médico. Pediatra – Oncólogo. Subdirector de Investigaciones,
Instituto Nacional de Cancerología.

Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología - ACHO

Entidad que solicita la evaluación

Este análisis de impacto presupuestal se realiza por solicitud del Ministerio de Salud y
Protección Social, en el marco de la actualización integral del plan de beneficios.

Fuentes de financiación

Ministerio de Salud y Protección Social. Contrato 487 de 2017.

Conflictos de interés

Los autores declaran, bajo la metodología establecida por el Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud - IETS, que no existe ningún conflicto de interés invalidante de tipo
financiero, intelectual, de pertenencia o familiar que pueda afectar el desarrollo de este
análisis de impacto presupuestal.

Declaración de independencia editorial

El desarrollo de este estudio, así como sus conclusiones, se realizaron de manera
independiente, transparente e imparcial por parte de los autores.

Derechos de autor

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de este documento son de propiedad
del Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos
morales y las citas y referencias bibliográficas enunciadas.

En consecuencia, constituirá violación a la normativa aplicable a los derechos de autor, y
acarreará las sanciones civiles, comerciales y penales a que haya lugar, su modificación,
copia, reproducción, fijación, transmisión, divulgación, publicación o similares, parcial o
total, o el uso del contenido del mismo sin importar su propósito, sin que medie el
consentimiento expreso y escrito del Ministerio de Salud y Protección Social.

Citación

Vanegas E, Pinzón C, Rodríguez E, Gamboa C, Avellaneda P, Morales G, León E, López
N, Segura D, Rojas M, Osorio D. Análisis de impacto presupuestal de 21 tecnologías para

el manejo quimioterapéutico del cáncer en Colombia. Bogotá D.C. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud -IETS y Ministerio de Salud y Protección Social; 2017.

Correspondencia

Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS
Carrera 49A # 91- 91
La Castellana, Bogotá, D.C., Colombia.
www.iets.org.co
subdireccion.etes@iets.org.co

© Ministerio de Salud y Protección Social, 2017.

Tabla de contenido

Introducción	9
1. Estado actual del cáncer.....	10
1.1 Situación de cáncer en el mundo	10
1.2 Situación del cáncer en Colombia	10
1.3 Tratamientos	11
1.4 Barreras de acceso en Colombia	12
1.5 Objetivo de la evaluación	14
2. Insumos y método	14
2.1 Perspectiva	14
2.2 Horizonte temporal.....	14
2.3 Población total.....	14
2.4 Población objeto del análisis	15
2.5 Población refinada	16
2.6 Priorización tecnologías	19
2.7 Identificación de protocolos de quimioterapia.....	22
2.8 Identificación de eventos adversos.....	25
2.9 Costos.....	25
2 Datos del modelo.....	27
3 Escenarios.....	28
4 Resultados.....	28
ANEXOS.....	36
Anexo 1 Registros sanitarios INVIMA	36
Tabla 1. Registros sanitarios ácido todotransretinoico (tretinoína)	36
Tabla 2. Registros sanitarios Capecitabina.....	36
Tabla 3. Registros sanitarios Carmustina	60
Tabla 4. Registros sanitarios Dactinomicina	61
Tabla 5. Registros sanitarios Daunorubicina	62
Tabla 6. Registros sanitarios Docetaxel	63
Tabla 7. Registros sanitarios Epirubicina.....	95
Tabla 8. Registros sanitarios Filgrastim.....	103

Tabla 9. Registros sanitarios Fludarabina	126
Tabla 10. Registros sanitarios Gemcitabina	130
Tabla 11. Registros sanitarios Hidroxiurea	198
Tabla 12. Registros sanitarios Idarubicina.....	200
Tabla 13. Registros sanitarios Ifosfamida.....	205
Tabla 14. Registros sanitarios Irinotecan.....	212
Tabla 15. Registros sanitarios Megestrol.....	232
Tabla 16. Registros sanitarios Melfalán.....	235
Tabla 17. Registros sanitarios Mesna	236
Tabla 18. Registros sanitarios Mitomicina	239
Tabla 19. Registros sanitarios Mitoxantrona.....	243
Tabla 20. Registros sanitarios Oxaliplatino.....	247
Tabla 21. Registros sanitarios Vinorelbina	263
Anexo 2 Priorización tecnologías	268
Anexo 3 Datos del modelo	279

Lista de abreviaturas y siglas

AIP	Análisis de Impacto Presupuestal
ATC	Código de Clasificación Anatómica-Terapéutica-Química
CAC	Cuenta de Alto Costo
CIE-10	Clasificación Internacional de Enfermedades Versión 10
IETS	Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
INVIMA	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
MinSalud	Ministerio de Salud y Protección Social
PBSUPC	Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC - PBSUPC
RIPS	Registro Individual de Prestación de Servicios
SGSSS	Sistema General de Seguridad Social en Salud
SISMED	Sistema de Información de Precios de Medicamentos
SISPRO	Sistema Integral de Información de la Protección Social
UPC	Unidad de Pago por Capitación

Resumen

Tecnología evaluada	Capecitabina ¹ , carmustina, dactinomicin (actinomocina-d), daunorubicina, docetaxel ² , epirubicina ³ , filgrastim, fludarabina, gemcitabine ⁴ , hidroxiurea (hidroxicarbamida), idarubicina, ifosfamida, irinotecan, megestrol acetato, melfalan ⁵ , mesna, mitomicina, mitoxantrona, oxaliplatino, tretinoína (ac. todo trans retinoico), vinorelbina.
Población objetivo	Población con diagnóstico de cáncer que requiere tratamiento con quimioterapia. Esta población fue estimada a partir de la identificación de casos que pueda requerir alguno de los medicamentos priorizados y que fueron suministrados durante el 2015, recobrados en los años 2015 y 2016.
Definición del escenario actual	Actualmente no existen tecnologías sustitutas dentro del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC, considerando que hacen parte de protocolos específicos de quimioterapia.
Definición del escenario nuevo	Incorporación de los medicamentos evaluados al PBS con cargo a la UPC
Perspectiva	Tercer pagador, que en este caso es el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia.
Horizonte temporal	El horizonte temporal de este AIP en el caso base corresponde a un año. Adicionalmente se reportan las estimaciones del impacto presupuestal para los años 2 y 3, bajo el supuesto de inclusión en el PBS en el año 1.
Costos incluidos	Costos de adquisición de los medicamentos evaluados
Fuente de costos	Sistema de información de Precios de Medicamentos (SISMED).
Escenarios	Se espera una adopción del 100% de los tratamientos evaluados teniendo en cuenta que no son alternativas terapéuticas para las patologías observadas, si no que hacen parte de los protocolos de tratamiento que son parte de la práctica clínica colombiana.
Resultados	Asumiendo la adopción total en el escenario 1, la inclusión de los 21 medicamentos implicaría un esfuerzo presupuestal de \$ 43.726.843.963,83

¹ Para capecitabina no se tuvieron en cuenta las indicaciones de cáncer de mama y de estómago, por estar cubiertas actualmente por el PBSCUPC.

² Para docetaxel no se tuvo en cuenta la indicación de cáncer de próstata, por estar cubierta actualmente por el PBSCUPC.

³ Para epirubicina no se tuvo en cuenta la indicación de cáncer gástrico, por estar cubierta actualmente por el PBSCUPC.

⁴ Para gemcitabina no se tuvo en cuenta la indicación de cáncer de pulmón, por estar cubierta actualmente por el PBSCUPC.

⁵ Para melfalán solo se tuvieron en cuenta las formas farmacéuticas de administración parenteral, dado que las demás formas farmacéuticas de uso por vía oral están cubiertas actualmente por el PBSCUPC.

Introducción

El análisis de impacto presupuestal (AIP) de los medicamentos quimioterapéuticos para el tratamiento de cáncer en Colombia, se desarrolló en el marco del mecanismo técnico-científico para la ampliación progresiva del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC (PBSUPC) y la definición de la lista de exclusiones, establecido en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 (1).

La quimioterapia tiene un gran impacto en el tratamiento oncológico, la cual es indispensable por su valor terapéutico en varios tipos de cáncer. Esta tecnología puede ser usada sola o junto con otros tratamientos, tales como la cirugía o la radioterapia. La quimioterapia engloba a una gran variedad de fármacos y su objetivo es destruir las células tumorales con el fin de lograr la reducción de la enfermedad, los medicamentos empleados en este tipo de tratamiento se les denomina fármacos antineoplásicos (1).

Cada tipo de tumor canceroso tiene una determinada sensibilidad a estos medicamentos, por lo tanto, es frecuente que el mismo fármaco se pueda emplear en el tratamiento de distintos tumores, variando las dosis o asociándolo a otros fármacos distintos(1).

La quimioterapia puede ser administrada con fines curativos o para aliviar los síntomas y prolongar la supervivencia. La forma de administración de la quimioterapia es por ciclos y esto se logra alternando los periodos de tratamiento con periodos de descanso. Un ciclo es, por lo tanto, el periodo de administración del tratamiento y el de descanso hasta la siguiente administración.

El objetivo de este análisis de impacto presupuestal (AIP) es estimar el esfuerzo financiero necesario para la adopción de la quimioterapia en el tratamiento de pacientes con cáncer en Colombia, en un horizonte temporal de tres años.

Este documento está conformado por cuatro secciones: en la primera se identifican las tecnologías a evaluar, en la segunda sección se especifica la perspectiva, horizonte temporal y la población sobre la cual se realizó el AIP; en la sección tres se detallan los costos utilizados en el modelo, además de los escenarios planteados por los investigadores; por último, en la sección cuatro se exponen los resultados en los diferentes escenarios planteados.

Este documento describe la metodología desarrollada para realizar el análisis de impacto presupuestal de 21 tecnologías para el manejo quimioterapéutico del cáncer en Colombia. Este informe, sigue los lineamientos propuestos en el Manual para la Elaboración de Análisis de Impacto Presupuestal y en Manual de Participación y Deliberación publicados por IETS (2). A continuación, se muestran los detalles del ejercicio poblacional, de costeo y de la modelación de escenarios. Posteriormente, se presenta una interpretación de los resultados y los análisis de incertidumbre sobre los mismos.

1. Estado actual del cáncer

1.1 Situación de cáncer en el mundo

El control del cáncer es una prioridad crítica para los sistemas de salud a nivel mundial, para lo cual se debe fortalecer el diagnóstico temprano, el tratamiento y la atención. La Asamblea Mundial de la Salud destaca la necesidad de intensificar la prevención y el control del cáncer, para poder alcanzar las metas orientadas a reducir la carga de enfermedades no transmisibles.

El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. En el 2015 el 16% de las muertes ocurridas se atribuyó a esta condición en salud y se estima que el 70% de estos fallecimientos se reportaron en países de bajos y medianos ingresos (3).

Para el 2030 se calcula que se diagnosticara a más de 22 millones de personas con cáncer al año, con un 64% de muertes, según estas proyecciones el número de personas diagnosticadas con cáncer aumentará en 500 000 por año, cada año, en los próximos 15 años. El costo económico del cáncer está calculado en 1.6 millones de dólares del producto interno bruto mundial (4).

En América del sur el índice de mortalidad por incidencia en promedio es 0.53 y América Central 0.55 frente a un 0.40 de la unión europea y 0.67 del Sudeste asiático (5).

1.2 Situación del cáncer en Colombia

El número de afectados por cáncer en Colombia muestra una tendencia creciente lo cual presenta un desafío importante en las políticas en salud pública. Dicha tendencia muestra la transición epidemiológica por la cual atraviesa el país, en la cual se pasa a un aumento de las condiciones crónicas sumado a una mayor esperanza de vida de los ciudadanos. Según las estimaciones de incidencia del cáncer en Colombia, en el período de 2007-2011 se presentaron en Colombia cerca de 29.734 casos nuevos de cáncer por año en hombres y 33.084 en mujeres. En los hombres, la tasa de incidencia ajustada por edad para todos los cánceres (excepto cáncer de piel) fue de 151,5 (por 100.000 habitantes) mientras que en las mujeres fue de 145,6. Las principales localizaciones de cáncer en los hombres en orden decreciente fueron próstata, estómago, pulmón y colon, mientras que en las mujeres fueron los cánceres de mama, cuello del útero, tiroides y estómago(6).

Adicionalmente para el mismo período de tiempo se registraron en promedio 16.081 muertes anuales por cáncer en hombres y 16.572 en mujeres. La tasa de mortalidad ajustada por edad en los hombres por 100.000 habitantes fue de 82,3 (excepto cáncer de piel de tipo no melanoma) y en las mujeres fue de 73,2(6). En la población adulta, las principales causas de muerte por cáncer en hombres son estómago, próstata y pulmón, mientras que en las mujeres son cáncer de mama, cuello uterino y estómago. En los niños, son las leucemias y los tumores del sistema nervioso central(6).

Es así como se busca que las intervenciones políticas y sanitarias del cáncer sean oportunas, certeras y coordinadas para lograr el impacto esperado a nivel poblacional e individual sobre su incidencia, discapacidad, calidad de vida y mortalidad. En consecuencia, el Ministerio de Salud y Protección Social junto con el Instituto Nacional de Cancerología tienen como lineamiento el Plan Decenal para el control del Cáncer en Colombia 2012-2020, el cual consta de seis líneas estratégicas que abarcan todos los aspectos relacionados con el Modelo Central del Cáncer, teniendo en cuenta los avances normativos y sociales relacionados con esta enfermedad en Colombia(7).

1.3 Tratamientos

Cirugía

Alrededor del 60% de los pacientes tienen indicación de algún tipo de cirugía para tratar el cáncer. En algunos casos, la cirugía es el único tratamiento recomendado. También se puede combinar con otras alternativas terapéuticas como son quimioterapia o radioterapia como parte de un plan de tratamiento integral indicado por un médico especialista en el manejo del cáncer (8).

Hay varios tipos de cirugía para el manejo del cáncer:

- La cirugía curativa: implica la extirpación de la masa tumoral de comportamiento maligno. Funciona mejor con cánceres localizados que aún no se han diseminado a otros órganos a nivel local o sistémico. Frecuentemente, posterior al procedimiento quirúrgico se debe iniciar manejo con radioterapia o quimioterapia según sea el caso para reducir la probabilidad de recurrencia tumoral.
- La cirugía preventiva: se usa para evitar que se presente el cáncer. Muchos cánceres gastrointestinales y del aparato reproductor femenino se pueden prevenir mediante la eliminación de lesiones preneoplásicas o tejido sano que se conoce que por presencia de mutaciones genéticas la probabilidad de malignidad supera al de la población general. Las mujeres con alto riesgo de cáncer de mama debido a antecedentes familiares o mutaciones genéticas pueden decidir que se extirpen los senos para evitar que ocurra cáncer. La cirugía preventiva también se conoce como cirugía profiláctica.
- La cirugía reconstructiva: Estos procedimientos tienen como propósito garantizar una apariencia o función normal o casi normal luego del tratamiento contra el cáncer. El más común es la cirugía de reconstrucción mamaria después de una mastectomía. La reconstrucción facial y los implantes testiculares son otros ejemplos de cirugía reconstructiva.
- La cirugía de estadificación: Este tipo de procedimientos determina la extensión del cáncer. La cirugía de estadificación a veces se puede realizar sin una incisión mediante el uso de un endoscopio para ver el área sospechosa y tomar una muestra de tejido.
- La cirugía paliativa: se usa para mejorar la calidad de vida de un paciente al aliviar el dolor u otros síntomas causados por cáncer avanzado o no tratable.
- La cirugía mínimamente invasiva: Estos procedimientos emplea técnicas avanzadas para eliminar tumores a través de pequeñas incisiones.

Quimioterapia

La quimioterapia es una de las modalidades terapéuticas más empleadas en el tratamiento del cáncer, que engloba a una gran variedad de fármacos. Su objetivo es destruir las células que componen el tumor con el fin de lograr la reducción de la enfermedad (9).

Radioterapia

La radioterapia utiliza haces de fotones enfocados y de alta energía para destruir las células cancerosas. Más de la mitad de los pacientes con cáncer se someten a algún tipo de radioterapia. Puede usarse como un tratamiento independiente o en combinación con otras terapias, reduciendo los tamaños tumorales antes de un procedimiento quirúrgico o la quimioterapia o destruyendo cualquier célula cancerosa que pueda permanecer después de otros tratamientos (10).

La radiación es producida por un acelerador lineal, o LINAC. Emplea energía de microondas para acelerar electrones a casi la velocidad de la luz dentro de un área contenida. Los electrones colisionan con una barrera de metal, creando potentes rayos X llamados fotones. Los fotones se conforman en haces y se entregan al paciente a través de un pórtico que se mueve 360 grados alrededor de la mesa de tratamiento.

Inmunoterapia

La inmunoterapia es un tratamiento que usa el sistema inmune del individuo para el control del cáncer. Las células T que conforman el sistema inmune pueden ser estimuladas de varias maneras por medicamentos especialmente diseñados que les permiten reconocer y destruir las células cancerosas (11) (12).

Tipos de inmunoterapia.

- **Anticuerpos monoclonales**, los cuales son fármacos diseñados para unirse a blancos específicos en el cuerpo. Pueden causar una reacción inmunitaria que destruye células cancerosas. Otros tipos de anticuerpos monoclonales pueden "marcar" las células cancerosas para facilitar que el sistema inmunitario las encuentre y las destruya. Es posible referirse a estos tipos de anticuerpos monoclonales como terapias dirigidas.
- **Transferencia adoptiva celular** es un tratamiento que intenta reforzar la capacidad natural de sus células T para combatir el cáncer.
- **Citocinas**, las cuales son proteínas producidas por las células. Tienen funciones importantes en la reacción inmunitaria normal del cuerpo y en la capacidad del sistema inmunitario para responder al cáncer. Los dos tipos principales de citocinas usadas para tratar cáncer son los interferones e interleuquinas.
- **Vacunas de tratamiento**, las cuales trabajan contra el cáncer al reforzar la reacción del sistema inmune a las células cancerosas.

1.4 Barreras de acceso en Colombia

Las barreras de acceso al sistema de salud son uno de los inconvenientes que tienen que afrontar los más de 70.000 pacientes diagnosticados con cáncer cada año en Colombia

(13). A lo largo del proceso de atención de cáncer se crean numerosas barreras para el acceso oportuno y equitativo a la atención de la salud, las cuales influyen de manera negativa sobre los resultados a mediano y largo plazo del paciente. Para mejorar el acceso a la atención y reducir las disparidades en los resultados, es necesario identificar y abordar dichas barreras, las cuales difieren según la localización y la población, pero en general pueden clasificarse como estructurales, socioculturales, personales y financieras.

De acuerdo con un informe del Observatorio Interinstitucional de Cáncer de Adultos (OICA) (14), los procesos son largos y engorrosos para acceder al tratamiento. Ejemplo de esto es la autorización del medicamento pero sin realizar la entrega, dada la no existencia de un contrato con la Institución Prestadora de Salud (IPS) que pueda suministrarlo; la negación del suministro del medicamento, demoras en la citas con el especialista, proceso fragmentado de atención y por último dificultades de transporte y alojamiento, entre otros.

En este contexto, el Plan Decenal para el Control de Cáncer en Colombia 2012-2021 (15) enlista las dificultades en términos de acceso a las cuales se enfrentan los usuarios del sistema de salud y sus familias al padecer esta enfermedad. Estas se mencionan a continuación:

- El proceso de atención debe cumplir con una serie de condiciones y requerimientos como la oportunidad en la confirmación del diagnóstico y el inicio de los tratamientos. El tratamiento de estos pacientes requiere un abordaje multidisciplinario.
- La atención médica requiere de altos estándares de especialización y calificación del talento humano al igual que de un alto nivel de desarrollo tecnológico.
- En el caso colombiano se tiene la necesidad de promover una atención continua desde las acciones de prevención hasta las de rehabilitación y cuidado paliativo.
- La cantidad de servicios oncológicos existentes, debe ir de la mano con la atención integral que requiere el paciente con cáncer. La mayoría de los tratamientos requieren la integración de diferentes modalidades de terapéuticas y la interacción de los especialistas tratantes.
- Ampliar la oferta de servicios, la cual se encuentra concentrada en unas cuantas ciudades del país, entre las cuales se encuentra, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.
- Hay un subdesarrollo de servicios de cuidado paliativo y de apoyo a familiares y cuidadores.
- Ausencia de verificación en el cumplimiento de los estándares de habilitación en los servicios que representan un alto riesgo para los pacientes.

- Sistema deficiente de regulación, vigilancia y control de la oferta de servicios, medicamentos y calidad de la atención para el paciente.
- Control deficiente de costos de atención dada las diferentes modalidades de contratación, pago y la fragmentación en la atención en salud.
- Es necesario reconocer la baja cobertura que existe en el país de servicios de rehabilitación y de cuidado paliativo relacionados con cáncer.

1.5 Objetivo de la evaluación

Este documento describe la metodología desarrollada para realizar el análisis de impacto presupuestal de 21 tecnologías para el manejo quimioterapéutico del cáncer en Colombia. Este informe, sigue los lineamientos propuesto en el Manual para la Elaboración de Análisis de Impacto Presupuestal y el Manual de Participación y Deliberación publicados por IETS. A continuación, se muestran los detalles del ejercicio poblacional, de costeo y de la modelación de escenarios. Posteriormente, se presenta una interpretación de los resultados y los análisis de incertidumbre sobre los mismos. Al final de este documento, se presentan las conclusiones y la discusión de los hallazgos.

2. Insumos y método

Esta sección presenta los supuestos, parámetros y métodos utilizados para el modelo de estimación del impacto presupuestal describiendo la siguiente información:

2.1 Perspectiva

La perspectiva de este AIP es la del tercer pagador el cual en nuestro contexto es el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

2.2 Horizonte temporal

El horizonte temporal de este AIP en el caso base corresponde a un año. Adicionalmente se reportan las estimaciones del impacto presupuestal para los años 2 y 3, bajo el supuesto de inclusión en el PBS en el año 1.

2.3 Población total

Para el desarrollo de este AIP se parte de la población general afiliada al SGSSS colombiano sin distinción de sexo o edad.

Las estimaciones de los años 1 a 3 se calcularon de acuerdo al comportamiento del crecimiento demográfico estimado por el DANE.

2.4 Población objeto del análisis

El número de casos para cada tipo de cáncer se estimó a partir de las tasas brutas de incidencia estimadas y publicadas en 2015 por el Instituto Nacional de Cancerología (INC) en el reporte *Incidencia, Mortalidad y Prevalencia de Cáncer en Colombia 2007-2011*(6), dicha información se alimenta de los registros poblacionales departamentales, la cual es considerada a nivel internacional como la metodología estándar apropiada(16). De no encontrar la información en la fuente anterior, se recurrió al Sistema de Información de Cáncer (Infocancer)(17).

Adicionalmente se tomaron las proyecciones de población para los años 2018, 2019 y 2020 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del censo de Población y Vivienda de 2005. Adicionalmente se asume que la incidencia en cada tipo de cáncer permanece constante a través del tiempo.

Para cada año k , ($k = 1,2,3$), la estimación de los casos para cada tipo de cáncer, se realizó usando la siguiente fórmula:

$$C_i = P \left(\frac{I_i}{100000} \right)$$

Donde:

- I_i es la tasa bruta de incidencia estimada para cada tipo de cáncer.
- P es la proyección de población para el año estimado.
- C_i son los casos estimados para un tipo de cáncer en particular.

Para la estimación del total de casos C_k , para cada sistema en el año k , se procede a sumar las estimaciones para cada tipo de cáncer dependiendo del sistema al que pertenecen:

$$C_k = \sum_i C_i$$

Con C_i los casos estimados para cada tipo de cáncer para cada sistema, según la información disponible.

Dado que el incremento en las proyecciones de población se hace de manera lineal, se procede a calcular un promedio ponderado para establecer el número promedio de casos en los tres años, ponderando por la distancia en años, desde el presente, para cada uno de los casos estimados:

$$\bar{C} = \frac{\sum_k k C_k}{\sum_k k}$$

Posteriormente la población se ajusta teniendo en cuenta el porcentaje de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2.5 Población refinada

La estimación de la población objeto de este análisis de impacto al presupuesto fue basado en datos reales de las bases de datos de recobros que hacen parte de las fuentes de información oficial de las actividades de aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Para ajustar la población teniendo en cuenta los pacientes posibles afiliados al régimen subsidiado se toma el valor reportado por la Cuenta de Alto Costo(CAC)(18) de 2016 en su documento *Situación del cáncer en Colombia*, donde se menciona que el 70% de los pacientes corresponde a régimen contributivo y el 26 % a régimen subsidiado, para estimar un total de la población que requiere cada uno de los fármacos analizados.

Registros administrativos

Para estimar el uso de las tecnologías en salud evaluadas por el SGSSS, se utilizó la base de los recobros al FOSYGA para los años 2015 y 2016, en estas dos anualidades se realizaron búsquedas de coincidencia por el código ATC5 relacionado en la Tabla 1. Como resultado se obtuvo una base de datos de 65.535 registros.

Tabla 1. Listado de las tecnologías sanitarias evaluadas

ATC5	Principio activo
L01DB03	Epirubicina
L01AD01	Carmustina
L01XX19	Irinotecan
L01DB02	Daunorubicina
L01AA06	Ifosfamida
L01CD02	Docetaxel
L01XX05	Hidroxiurea (hidroxicarbamida)
L01BC05	Gemcitabine
L01DB07	Mitoxantrona
L01AA03	Melfalan
L01DA01	Dactinomycin (actinomicina-d)
L01DC03	Mitomicina
L01BC06	Capecitabina
L01DB06	Idarubicina
L02AB01	megestrol, Acetato
L01BB05	Fludarabina
L01XA03	Oxaliplatino
L01CA04	Vinorelbina
L03AA02	Filgrastim
V03AF01	Mesna
L01XX14	Ac. Todo trans retinoico

Luego de esta consulta inicial, se efectuaron las siguientes actividades para estimar los posibles casos que pueden requerir el uso de cada uno de los medicamentos evaluados en el régimen contributivo y subsidiado del SGSSS:

- Para evitar duplicidad en el conteo de casos, se restringió el análisis a los registros tipo 1 correspondientes a los recobros aprobados y excluyendo así, a todos los registros glosados que potencialmente pueden repetirse. Esta acción excluye 4.254 registros.
- Los recobros efectuados al FOSYGA al contar con dos mecanismos de entrada (fallos de tutela y Comité Técnico Científico) y múltiples decisores (pluralidad de comités y juzgados), existen registros que representan diferentes unidades de tratamiento: tratamiento/año, tratamiento/mes o presentación comercial del medicamento. Para evitar contar a la misma persona en más de una ocasión, se decidió agrupar los registros por persona/año, convirtiéndose en la unidad de análisis de este registro administrativo. Esta agrupación limita la consulta a 46.011 registros.
- Posteriormente, se filtraron los registros por el diagnóstico reportado en cada recobro al FOSYGA conservando aquellos registros en donde el CIE10 reportado inicia con la letra C, correspondiente a “Neoplasias”. Esta actividad elimina 13.117 registros equivalente al 28,5% de los datos obtenidos hasta esta etapa.
- Luego de obtener los registros únicos por persona, se extrajo el año de la prestación del servicio o suministro del medicamento. Como se observa en la Ilustración 1, al clasificar los registros en cada anualidad se observa que el año 2015 cuenta con el mayor número de casos.

Ilustración 1. Número de casos por anualidad

Fuente. Elaboración propia

Este hallazgo es consistente al considerar que parte de las prestaciones en salud del año 2016 serán recobradas hasta la anualidad 2017, de la cual, aun no se cuenta con la disponibilidad completa de la información. Por otra parte, al analizar las bases de recobros para el año 2015 y 2016, los servicios prestados en el año 2015 es el mejor periodo de tiempo del cual se puede efectuar algún tipo de proyección.

- Para finalizar, los servicios prestados en el año 2015 fueron clasificados según el CIE10, clasificándolo en cada uno de los diferentes tipos de cáncer evaluados en el presente documento y sintetizados en la Tabla 2.

Tabla 2. Número de personas/año, recobros 2015

Tipo de cáncer	Número de casos
ABDOMEN	42
ANO	143
CABEZA Y CUELLO	124
CERVIX	44
COLON	3756
ENDOMETRIO	44
ESOFAGO	66
ESTOMAGO	765
GENITAL FEMENINO	2
GENITOURINARIO	10
HIGADO	179
HODGKIN	849
HUESO	297
INTESTINO DELGADO	57
LARINGE	15
LEUCEMIA	2143
LINFOMA	66
LINFOMA	12
LINFOMA	162
MAMA	1871
MELANOMA	4
MESOTELIOMA	10
MIELOMA MULTIPLE	144
NASOFARINGE	37
NEUROENDOCRINO	6
NO INCLUIR	42
OJO	37
OROFARINGEO	137
OSTEOSARCOMA	55
OVARIO	269
PANCREAS	634
PELVIS	20
PENE	21
PIEL	11
PLEURA	16
PROSTATA	133
PULMON	239
RECTO	1744
RIÑON	102
SARCOMA	148

Tipo de cáncer	Número de casos
SARCOMA DE KAPOSI	53
SIST NERVIOSO	227
SUPRARENAL	3
TEJIDO BLANDO	389
TESTICULO	126
TIROIDES	15
TORAX	47
TUMOR MALIGNO DE SITIOS NO ESPECIFICADOS	30
UTERO	84
VAGINA	7
VEJIGA	261
VESICULA Y VIAS BILIARES	243
VIAS BILIARES	1
VULVA	7

Fuente: elaboración propia

2.6 Priorización tecnologías

Con el fin de determinar los medicamentos a ser incluidos dentro del AIP, se realizó un inventario de los principios activos actualmente empleados en el tratamiento del cáncer y aquellos que se consideran coadyuvantes como antieméticos. Dicho inventario, se basó en los medicamentos considerados dentro del Formulario de Cancer Care Ontario (19) y la lista de codificación ATC de la OMS (20) y se incluyó el año de aprobación de FDA.

Se identificaron un total de 158 principios activos (anexo 2), los cuales fueron clasificados de acuerdo al tipo de terapia: quimioterapia, hormonoterapia, terapia biológica. Posteriormente, para realizar el análisis de la lista obtenida se determinó si el medicamento contaba con registro sanitario en Colombia o si estaba incluido en la lista de medicamentos vitales no disponibles, un total de 118 medicamentos tienen permiso de comercialización para mayo de 2017 y 13 tienen carácter de vitales no disponibles.

Para cada uno de estos medicamentos, se incluyó información adicional, como su inclusión en Los Listados de medicamentos esenciales de la OMS para niños y adultos y su cobertura en el Plan de beneficios: 12 no están incluidos en el PB, 12 tienen cobertura condicionada a una o varias condiciones específicas y 24 están incluidos de forma completa.

Para la priorización se seleccionaron los medicamentos correspondientes a quimioterapéuticos registrados ante FDA antes de 2000. Se identificaron un total de 21 principios activos (Tabla No. 03).

Tabla 3 Medicamentos priorizados

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría
L01BC06	quimioterapia	Capecitabina	1998	Cáncer de colon en etapa temprana Cáncer de recto en estadio temprano Cáncer de mama metastásico Cáncer colorrectal metastásico	
L01AD01	quimioterapia	Carmustina	1977	No	
L01DA01	quimioterapia	Dactinomycin (actinomicina-d)	1964	Neoplasia trofoblástica gestacional Rabdomiosarcoma Tumor de Wilms	Tumor de Wilms Rabdomiosarcoma
L01DB02	quimioterapia	Daunorubicina	1979	Leucemia linfoblástica aguda Leucemia mielógena aguda Leucemia promielocítica aguda	Leucemia linfoblástica aguda
L01CD02	quimioterapia	Docetaxel	1996	Cáncer de mama en etapa temprana Cáncer de mama metastásico Cáncer metastásico de próstata	
L01DB03	quimioterapia	Epirubicina	1999	No	
L03AA02	Coadyudante	Filgrastim	1991	Neutropenia después de la quimioterapia mielotóxica previa Neutropenia febril asociada con quimioterapia mielotóxica. Para facilitar la administración de regímenes de quimioterapia a altas dosis Profilaxis primaria en pacientes con alto riesgo de desarrollar Profilaxis secundaria para pacientes que han experimentado	Profilaxis de neutropenia febril asociada a quimioterapias causantes de mielotoxicidad Profilaxis secundarias de pacientes que han tenido neutropenia febril Facilitar a administración de regímenes con dosis altas de quimioterapia
L01BB05	terapia dirigida	Fludarabina	1991	Leucemia linfocítica crónica	
L01BC05	quimioterapia	Gemcitabine	1996	Cáncer epitelial de ovario Cáncer de pulmón de células no pequeñas	
L01XX05	quimioterapia	Hidroxiurea (hidroxicarbamida)	1967	Leucemia mieloide crónica	
L01DB06	quimioterapia	Idarubicina	1990	No	
L01AA06	quimioterapia	Ifosfamida	1967	Osteosarcoma Rabdomiosarcoma Sarcoma de Ewing Tumor de células germinales ováricas Tumor de células germinales testiculares	Osteosarcoma, rabdomiosarcoma, sarcoma de erwin, tumores de células germinales

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20ª adultos	Incluida en listado OMS 6ª pediatría
L01XX19	quimioterapia	Irinotecan	1996	Cáncer colorrectal metastásico	
L02AB01	quimioterapia	megestrol, Acetato	1967	No	
L01AA03	quimioterapia	Melfalan	1964	Si	
V03AF01	Coadyudante	Mesna	1988	Osteosarcoma Rabdomiosarcoma Sarcoma de Ewing. Tumor de células germinales ováricas Tumor de células germinales testiculares	Osteosarcoma, rabdomiosarcoma, sarcoma de erwin, tumores de células germinales
L01DC03	quimioterapia	Mitomicina	1981	No	
L01DB07	quimioterapia	Mitoxantrona	1987	No	
L01XA03	quimioterapia	Oxaliplatino	1999	Cáncer de colon en etapa temprana Cáncer colorrectal metastásico	
L01XX14	quimioterapia	Tretinoína	1995	Leucemia promielocítica aguda	
L01CA04	Quimioterapia	Vinorelbina	1994	Cáncer de pulmón de células no pequeñas Cáncer de mama metastásico	

2.7 Identificación de protocolos de quimioterapia

Para cada uno de los medicamentos priorizados, se identificaron las indicaciones aprobadas por la agencia sanitaria, igualmente, se identificaron los UNIRS, los cuales se incluyeron dentro de la ficha de cada medicamento. Lo anterior con el fin de validar la información con expertos y poder diferenciar las indicaciones aprobadas por INVIMA y consolidar únicamente protocolos que consideraran estas condiciones de salud específicas.

Los protocolos se describieron para cada medicamento considerando las siguientes variables:

- Localización: se refiere a la localización del tumor
- Indicación INVIMA armonizada : describe la indicación INVIMA en la que se emplea el medicamento
- Protocolo: nombre del protocolo, si lo tiene
- Medicamento: nombre de los principios activos, se identifican con color verde los medicamentos ya incluidos en el plan de beneficios, en amarillo los medicamentos priorizados y en rojo medicamentos que no se considera incluir.
- Dosis: expresa la cantidad de medicamento a administrar por cada dosis del protocolo,
- Unidad de dosificación generalmente se expresa como mg/m², en otros casos como mg/kg y en el caso especial de carboplatino como AUC.
- Aplicación: indica la vía de administración y el tiempo de administración
- Día: muestra los días en los que debe ser administrado el medicamento en el protocolo.
- Frecuencia del ciclo: se especifica cada cuando se debe administrar cada protocolo, y las condiciones para determinar el número máximo o mínimo de protocolos de acuerdo con la condición y en algunos casos de acuerdo a las condiciones del paciente.

La información fue revisada con expertos, en algunos casos se complementaron los protocolos adoptados para el país como fue el caso de pediatría y hematología. Con la información resultante se calcularon las dosis de cada protocolo, una superficie corporal de 1,7 m² para adultos y el 0.5 m² para niños de 0 a 2 años de 3 a 14 años 1.0 m² (superficie corporal media consensuada por expertos oncólogos) y se utilizó un promedio de 6 ciclos por esquema por paciente. Para la revisión de los protocolos de cada medicamento remitirse a los informes individuales.

En la siguiente tabla, se presentan a manera de ejemplo, algunos de los protocolos usados con irinotecan en cáncer de colon y recto.

Tabla 4. Algunos de los protocolos para irinotecan

Localización	Indicación INVIMA armonizada		Protocolo	Medicamento	Dosis	Unidad de dosificación	Aplicación	Día	Frecuencia del ciclo
Gastrointestinal colorectal	Tratamiento del cáncer colorrectal en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Paliativo	FOLFOXIRI	Ácido folínico	400	mg /m ²	IV más de una hora	Día 1	Cada 14 días hasta completar 12 ciclos o progresión de la enfermedad o hasta aparición de toxicidad
				Fluorouracilo	3200	mg /m ²	IV por 48 horas	Día 1	
				Irinotecan	165	mg /m ²	IV en 1 hora	Día 1	
				Oxaliplatino	85	mg /m ²	IV en 2horas	Día 1	
Gastrointestinal colorectal	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Paliativo	FOLFOXIRI+BEVA	Bevacizumab	5	mg/kg	IV	Día 1	Cada 14 días hasta completar 12 ciclos o progresión de la enfermedad o hasta aparición de toxicidad
				Irinotecan	165	mg /m ²	IV en 1 hora	Día 1	
				Ácido folínico	400	mg /m ²	IV más de una hora	Día 1	
				Oxaliplatino	85	mg /m ²	IV en 2horas	Día 1	
				Fluorouracilo	3200	mg /m ²	IV por 48 horas	Día 1	
Gastrointestinal colorectal	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Paliativo	IROX	Oxaliplatino	85	mg /m ²	IV en 2horas	Día 1	Cada 21 días hasta progresión de la enfermedad o hasta aparición de toxicidad
				Irinotecan	200	mg /m ²	IV en 1 hora	Día 1	
Gastrointestinal - Colorectal	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Paliativo	FOLFIRI	Irinotecan	180	mg /m ²	IV	Día 1	Repetir cada 14 días. A menos que exista progresión de la enfermedad o
				Acido folínico	400	mg /m ²	IV	Día 1	
				Fluorouracilo	400	mg /m ²	IV en bolo después de leucovorina	Día 1	

Localización	Indicación INVIMA armonizada		Protocolo	Medicamento	Dosis	Unidad de dosificación	Aplicación	Día	Frecuencia del ciclo
Gastrointestinal colorectal	Tratamiento del cáncer colorrectal en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Paliativo	FOLFOXIRI	Ácido folínico	400	mg /m ²	IV más de una hora	Día 1	Cada 14 días hasta completar 12 ciclos o progresión de la enfermedad o hasta aparición de toxicidad
				Fluorouracilo	3200	mg /m ²	IV por 48 horas	Día 1	
				Irinotecan	165	mg /m ²	IV en 1 hora	Día 1	
				Oxaliplatino	85	mg /m ²	IV en 2horas	Día 1	
Gastrointestinal colorectal	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Paliativo	FOLFOXIRI+BEVA	Bevacizumab	5	mg/kg	IV	Día 1	Cada 14 días hasta completar 12 ciclos o progresión de la enfermedad o hasta aparición de toxicidad. En paliativo: Hasta progresión o aparición de toxicidad
				Irinotecan	165	mg /m ²	IV en 1 hora	Día 1	
				Ácido folínico	400	mg /m ²	IV más de una hora	Día 1	
				Oxaliplatino	85	mg /m ²	IV en 2horas	Día 1	
				Fluorouracilo	3200	mg /m ²	IV por 48 horas	Día 1	
				Fluorouracilo	2400	mg /m ²	IV en infusión por 46 horas	Día 1	

Fuente: documento de análisis de impacto presupuestal de irinotecan para el manejo quimioterapéutico del cáncer en Colombia.

2.8 Identificación de eventos adversos

En la búsqueda ampliada de la literatura (21), (22), (23), (24) se identificaron los siguientes eventos adversos con la frecuencia de ocurrencia:

Tabla 5. Eventos adversos relacionados con el manejo con quimioterapia

Evento adverso	Frecuencia de ocurrencia
Fatiga	50%
Leucopenia	30%
Trombocitopenia	21%
Anemia	22%
Pancitopenia	9%
Alopecia	81%
Equimosis	14%
Infecciones	7%
Anemia	17%
Náusea y vómito	40%
Hiporexia/Anorexia	58%
Diarrea	22%
Mucositis	35%
Neutropenia febril	16%

Posteriormente se concertó con el grupo de expertos cuales eventos adversos son los relevantes en términos de las implicaciones clínicas y son unidades generadoras de costo para este análisis. Dichos eventos adversos que comparten las dos características anteriormente mencionadas fueron: a) náusea y vómito, b) neutropenia febril y c) diarrea.

El manejo estándar de estos eventos adversos actualmente es financiado por el PBSUPC, por lo tanto no se incluyeron como parte estructural del proceso de costo de las tecnologías evaluadas y sus potenciales procedimientos o eventos adversos relacionados. Para el caso del manejo de náusea y vómito por esquemas de quimioterapia altamente emetizantes, se consideraron aquellos esquemas quimioterapéuticos basados en platinos y antraciclinas. En estos esquemas de tratamiento, el manejo estándar establecido actualmente es el esquema basado en corticoide sistémico (dexametasona), un fármaco antagonista del receptor de serotonina 5-HT₃ (Ondansetrón) que actualmente están incluidos en el PBSUPC. Para el caso de los medicamentos antagonistas selectivos de alta afinidad por los receptores de la sustancia P neurokinina 1 (NK1), aprepitant y fosaprepitant, no fueron incluidos dado que actualmente no se encontraron reportes en SIMED.

2.9 Costos

Para realizar el cálculo del precio para cada uno de los medicamentos evaluados, se efectuó la consulta en SIMED para el año 2016 de las 468 presentaciones comerciales de los medicamentos listados en la Tabla 6. En total, se obtuvieron 50.618 registros de SIMED.

Tabla 6. Presentaciones comerciales por medicamento

ATC	Principio activo	Número de presentaciones comerciales
L01AA03	Melfalan	1

ATC	Principio activo	Número de presentaciones comerciales
L01AA06	Ifosfamida	19
L01BB05	Fludarabina	22
L01BC05	Gemcitabina	77
L01BC06	Capecitabina	51
L01CA04	Vinorelbina	17
L01CD02	Docetaxel	48
L01DA01	Dactinomicina	6
L01DB02	Daunorrubicina	3
L01DB03	Epirubicina	31
L01DB06	Idarrubicina	17
L01DB07	Mitoxantrona	9
L01DC03	Mitomicina	18
L01XA03	Oxaliplatino	64
L01XX05	Hidroxicarbamida	7
L01XX14	Tretinoin	1
L01XX19	Irinotecan	46
L02AB01	Megestrol	1
L03AA02	Filgrastim	21
V03AF01	Mesna	9
Total		468

En todos los casos, se calculó el precio mínimo, máximo y el promedio ponderado por presentación comercial (CUM), por unidad farmacéutica (tableta, vial) y por unidad mínima de concentración. Estos tres cálculos están disponibles en el anexo 3.

Luego de obtener los resultados y al no observar diferencias significativas entre las diferentes unidades de cálculo se decidió optar por el precio por unidad mínima, siguiendo las directrices del Manual Metodológico para el AIP(2). En la Tabla 7 se relacionan estos precios.

Tabla 7. Precios por unidad mínima de concentración

Atc	Principio activo	Forma farmacéutica	Unidad	Punto de la cadena	Precio mínimo	Precio promedio	Precio máximo
L01aa03	Melfalan	Inyectable	Mg	Lab	\$ 4.269	\$ 7.467	\$ 7.505
L01aa03	Melfalan	Inyectable	Mg	May	\$ 2.541	\$ 10.263	\$ 11.979
L01aa06	Ifosfamida	Inyectable	G	Lab	\$ 3.240	\$ 67.017	\$ 85.734
L01aa06	Ifosfamida	Inyectable	G	May	\$ 16	\$ 85.826	\$ 157.749
L01ab01	Busulfan	Tableta oral	Mg	Lab	\$ 1.394	\$ 1.394	\$ 1.394
L01ab01	Busulfan	Tableta oral	Mg	May	\$ 4	\$ 316	\$ 350
L01bb05	Fludarabina	Inyectable	Mg	Lab	\$ 2.000	\$ 9.677	\$ 11.059
L01bb05	Fludarabina	Inyectable	Mg	May	\$ 2.236	\$ 7.632	\$ 13.807

Atc	Principio activo	Forma farmacéutica	Unidad	Punto de la cadena	Precio mínimo	Precio promedio	Precio máximo
L01bc05	Gemcitabina	Inyectable	Mg	Lab	\$ 29	\$ 147	\$ 470
L01bc05	Gemcitabina	Inyectable	Mg	May	\$ 0	\$ 143	\$ 288
L01bc06	Capecitabina	Tableta oral	Mg	Lab	\$ 3	\$ 9	\$ 47
L01bc06	Capecitabina	Tableta oral	Mg	May	\$ 0	\$ 8	\$ 16
L01ca04	Vinorelbina	Inyectable	Mg	Lab	\$ 606	\$ 1.833	\$ 4.300
L01ca04	Vinorelbina	Inyectable	Mg	May	\$ 0	\$ 1.827	\$ 5.000
L01cd02	Docetaxel	Inyectable	Mg	Lab	\$ 300	\$ 3.341	\$ 5.059
L01cd02	Docetaxel	Inyectable	Mg	May	\$ 1	\$ 4.168	\$ 6.211
L01da01	Dactinomicina	Inyectable	Mg	Lab	\$ -	\$ -	\$ -
L01da01	Dactinomicina	Inyectable	Mg	May	\$ 32.400	\$ 107.476	\$ 157.400
L01db02	Daunorrubicina	Inyectable	Mg	Lab	\$ 950	\$ 1.225	\$ 1.313
L01db02	Daunorrubicina	Inyectable	Mg	May	\$ 5	\$ 2.153	\$ 3.813
L01db03	Epirubicina	Inyectable	Mg	Lab	\$ 1.606	\$ 2.565	\$ 12.040
L01db03	Epirubicina	Inyectable	Mg	May	\$ 0	\$ 4.081	\$ 4.980
L01db06	Idarrubicina	Inyectable	Mg	Lab	\$ 18.000	\$ 62.473	\$ 77.849
L01db06	Idarrubicina	Inyectable	Mg	May	\$ 21.800	\$ 74.873	\$ 92.709
L01db07	Mitoxantrona	Inyectable	Mg	Lab	\$ 2.900	\$ 11.569	\$ 12.987
L01db07	Mitoxantrona	Inyectable	Mg	May	\$ 5	\$ 11.393	\$ 15.966
L01dc03	Mitomicina	Inyectable	Mg	Lab	\$ 7.000	\$ 7.493	\$ 8.502
L01dc03	Mitomicina	Inyectable	Mg	May	\$ 1	\$ 8.721	\$ 17.550
L01xa03	Oxaliplatino	Inyectable	Mg	Lab	\$ 350	\$ 1.075	\$ 1.278
L01xa03	Oxaliplatino	Inyectable	Mg	May	\$ 0	\$ 1.255	\$ 1.450
L01xx05	Hidroxycarbamida	Tableta oral	Mg	Lab	\$ 2	\$ 2	\$ 33
L01xx05	Hidroxycarbamida	Tableta oral	Mg	May	\$ 0	\$ 9	\$ 52
L01xx14	Tretinoin	Tableta oral	Mg	May	\$ 7	\$ 523	\$ 1.550
L01xx19	Irinotecan	Inyectable	Mg	Lab	\$ 141	\$ 1.039	\$ 3.500
L01xx19	Irinotecan	Inyectable	Mg	May	\$ 0	\$ 2.164	\$ 3.652
L02ab01	Megestrol	Tableta oral	Mg	May	\$ -	\$ -	\$ -
L03aa02	Filgrastim	Inyectable	µg	Lab	\$ 9	\$ 219	\$ 318
L03aa02	Filgrastim	Inyectable	µg	May	\$ 0	\$ 723	\$ 4.024
V03af01	Mesna	Inyectable	Mg	Lab	\$ 4	\$ 25	\$ 27
V03af01	Mesna	Inyectable	Mg	May	\$ 0	\$ 2	\$ 44

2 Datos del modelo

A partir de la estimación poblacional y de costos, descrita en las secciones anteriores, se determinaron los siguientes insumos necesarios para el cálculo del AIP, los cuales se sintetizan en el anexo 03

- Población objetivo
- Costo medicamentos

3 Escenarios

Se consideró para la formulación de los escenarios de adopción de las tecnologías evaluadas los siguientes aspectos:

1. Los medicamentos evaluados no son alternativas terapéuticas para las patologías observadas, estas tecnologías sanitarias hacen parte de los protocolos de tratamiento con evidencia científica suficiente que garantizan su efectividad y seguridad clínica y que actualmente se encuentran en las opciones de tratamiento utilizados en la práctica clínica colombiana.
2. Al ser esquemas de tratamiento que hacen parte de protocolos estandarizados de aplicación, sí alguno de los medicamentos es sujeto de recobros ante ADRES, este trámite puede generar barreras de acceso al tratamiento hasta que se efectúe la respectiva aprobación. Por lo tanto, no hay certeza de la efectividad clínica si los esquemas de tratamiento son suministrados de forma parcial o incompleta.
3. La elección del esquema de tratamiento obedece a criterios clínicos y a las características evaluadas en el paciente, no se espera una sustitución entre los diferentes esquemas si se realiza un cambio en el mecanismo de financiamiento.
4. La adopción de las tecnologías evaluadas en este AIP no se espera que se modifiquen de manera importante, debido a que estas tecnologías hacen parte integral de los esquemas de tratamiento y su incorporación en la práctica clínica habitual en el contexto internacional y nacional, data de aproximadamente 10 a 5 años. También son parte de las opciones de primera línea de tratamiento para estadios tempranos, avanzados y localmente avanzados del paciente diagnosticado con cáncer.

De acuerdo a las anteriores consideraciones, al incorporar los medicamentos evaluados al PBS con cargo a la UPC, se espera la misma composición del mercado con la adopción de los nuevos medicamentos en el 100% de los tratamientos esperados en la siguiente anualidad.

Los resultados esperados en el sistema de salud, en este cambio de financiamiento, se esperan obtener en dos puntos:

- a) En una mejor oportunidad de acceso a los esquemas de tratamiento en el SGSSS (25).
- b) En una mejora en la cobertura efectiva de los tratamientos de quimioterapia en pacientes con diagnóstico de cáncer.

4 Resultados

A continuación, se muestra el resultado consolidado para las veintinueve tecnologías objeto del Análisis de Impacto Presupuestal.

Suma de COSTO ACTUAL	Suma de COSTO ESCENARIO 1 AÑO 1	Suma de COSTO ESCENARIO 1 AÑO 2	Suma de COSTO ESCENARIO 1 AÑO 3
0	\$43.726.843.963,83	\$47.123.488.059,86	\$51.034.833.450,94

Gráfica 2. Costo por tecnología

La gráfica 2 presenta el valor total de cada tecnología usada en la población proyectada junto con el valor por persona.

La tecnología que genera un mayor impacto es Oxaliplatino, con un valor por persona de \$2.363.250,76 usada en 3170 pacientes, para un total de \$7.491.504.923,90. El Megestrol es la tecnología con menor impacto, con un costo por persona de \$ 383.791,06 y siendo usada en 34 pacientes, tiene un valor total de \$ 13.048.896,00.

La tretinoína es la tecnología más económica por paciente, con un valor de \$ 97.996,50, es usada en 242 personas para un total de \$ 23.715.153,00.

5 Discusión

En la práctica actual existe un volumen amplio de recobros en el caso de estos medicamentos por usos UNIRS. En algunos casos, los cambios en el mercado farmacéutico, ya sea por el retiro de medicamentos o la llegada de ellos, hace que se modifique indicaciones ya existentes en los registros y que pueden llegar a impactar estos

usos, por ejemplo aquellos casos en los que existe la indicación antineoplásico y se cambian por indicaciones específicas, que pueden no considerar condiciones de salud de baja incidencia.

Como se ha caracterizado con anterioridad, el mercado de tecnologías sanitarias que se encuentran incluidas al plan de beneficios en salud con cargo a la UPC difiere sustancialmente al mercado de tecnologías sanitarias aún no financiadas por dicho mecanismo. La existencia de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) presume la existencia de un actor que al maximizar su beneficio, es un buen negociador que en cumplimiento de los principios del SGSSS, llega a un precio de equilibrio que maximiza el beneficio social (26).

En cambio, los medicamentos que son sujetos a recobros al ADRES presume un precio fuera de aquel nivel en donde se maximiza al beneficio social, en la medida que no hay una función clara de monopsonio que coteje y negocie un precio de adquisición. En algunos casos puede llegar a asumir sobrecostos que las EAPB al ser intermediarias, no tienen incentivos para efectuar un adecuado control (26).

En la Tabla 8, se sintetiza el valor promedio de recobro por persona/año de cada uno de los medicamentos evaluados, para lograr su comparación con los resultados obtenidos del ejercicio de SISMED, la información de los servicios prestados del año 2015 en recobros se indexa a precios 2016 con el IPC de cierre reportado por el DANE para el año 2015.

Tabla 8. Valor de recobro promedio por medicamento

ATC	MEDICAMENTO	NÚMERO PERSONAS	RECOBRO 2015	RECOBROS 2015	INDEXADO 2016*
L01AA03	Melfalan	72	\$ 273.294.857	\$ 3.795.762	\$ 4.052.735
L01AA06	Ifosfamida	878	\$ 1.854.415.367	\$ 2.112.090	\$ 2.255.079
L01BB05	Fludarabina	232	\$ 1.611.969.763	\$ 6.948.146	\$ 7.418.535
L01BC05	Gemcitabine	1.648	\$ 5.744.208.603	\$ 3.485.563	\$ 3.721.536
L01BC06	Capecitabina	2.780	\$ 6.223.673.280	\$ 2.238.731	\$ 2.390.294
L01CA04	Vinorelbina	228	\$ 558.827.532	\$ 2.450.998	\$ 2.616.931
L01CD02	Docetaxel	1.763	\$ 9.242.245.414	\$ 5.242.340	\$ 5.597.246
L01DA01	Dactinomycin (actinomycin-d)	131	\$ 49.099.264	\$ 374.804	\$ 400.178
L01DB02	Daunorubicina	257	\$ 578.039.082	\$ 2.249.179	\$ 2.401.449
L01DB03	Epirubicina	341	\$ 433.348.413	\$ 1.270.816	\$ 1.356.851
L01DB06	Idarubicina	200	\$ 1.915.284.351	\$ 9.576.422	\$ 10.224.746
L01DB07	Mitoxantrona	103	\$ 322.773.916	\$ 3.133.727	\$ 3.345.881
L01DC03	Mitomicina	297	\$ 248.964.858	\$ 838.266	\$ 895.016
L01XA03	Oxaliplatino	3.140	\$ 3.786.943.511	\$ 1.206.033	\$ 1.287.681
L01XX05	Hidroxiurea (hidroxicarbamida)	415	\$ 146.184.140	\$ 352.251	\$ 376.098
L01XX14	Ac. Todo trans retinoico	190	\$ 1.200.966.206	\$ 6.320.875	\$ 6.748.798
L01XX19	Irinotecan	1.111	\$ 5.574.528.865	\$ 5.017.578	\$ 5.357.268
L03AA02	Filgrastim	1.011	\$ 3.921.094.968	\$ 3.878.432	\$ 4.141.002
V03AF01	Mesna	1.339	\$ 1.656.157.328	\$ 1.236.861	\$ 1.320.597

*Precio indexado a precios 2016 con el IPC de 6,77% reportado por el DANE para el año 2015

Con el objetivo de estimar el resultado de la incorporación de estos medicamentos al PBS con cargo a la UPC, se asumieron dos escenarios en los cuales la población objetivo del AIP se consideró constante y se asumieron los siguientes supuestos:

- En el primer escenario se asume que los precios observados en recobros serán el promedio de todas las transacciones de compra en la siguiente anualidad.
- En el segundo escenario los precios promedio de adquisición de los medicamentos evaluados, corresponden al promedio observado en SISMED como predictor de los precios de equilibrio que pueden generar las EAPB como ente negociador.
- Se asume que, en promedio, las EAPB son negociadores eficientes que se acercan a un precio de equilibrio que maximiza el bienestar social.
- Se asume que la población objetivo corresponde al total de posibles pacientes que requieren las tecnologías sanitarias en evaluación, sin que exista demanda insatisfecha para estos esquemas de tratamiento.

Para su cálculo, como se presenta en la tabla 09 de los servicios prestados durante el año 2015 y recobrados al FOSYGA en los años 2015 y 2016, se calculó un valor per-cápita de acuerdo con el identificador (cedula de ciudadanía anonimizada) registrado en cada recobro. Luego, este valor es indexado a precios 2016 con el IPC reportado por el DANE a diciembre 31 del año 2015. Este valor será el comparador del precio calculado para cada uno de los medicamentos a partir de SISMED 2016.

Tabla 9. Análisis recobros versus AIP

ATC	Medicamento	PERSONAS	Promedio de Promedio de PRECIO POR TTO PERSONA AÑO 1	PRECIO TTO/AÑO AIP	ESTIMADO SEGÚN RECOBROS	ESTIMADO AIP
L01AA03	Melfalan	53	\$ 1.874.682,84	\$ 2.193.591,36	\$ 99.358.190,45	\$ 116.260.342,17
L01AA06	Ifosfamida	1110	\$ 3.268.956,38	\$ 3.522.002,43	\$ 3.628.541.586,99	\$ 3.909.422.696,73
L01BB05	Fludarabina	295	\$ 9.827.649,00	\$ 9.382.776,00	\$ 2.899.156.455,00	\$ 2.767.918.920,00
L01BC05	Gemcitabina	1303	\$ 2.130.483,71	\$ 2.132.417,46	\$ 2.776.020.267,62	\$ 2.778.539.943,87
L01BC06	Capecitabina	2784	\$ 1.795.995,00	\$ 1.795.995,00	\$ 5.000.050.080,00	\$ 5.000.050.080,00
L01CA04	Vinorelbine	238	\$ 373.390,72	\$ 373.390,72	\$ 88.866.991,36	\$ 88.866.991,36
L01CD02	Docetaxel	1807	\$ 1.686.239,99	\$ 1.686.239,99	\$ 3.047.035.657,41	\$ 3.047.035.657,41
L01DA01	Dactinomicina	156	\$ 2.190.484,45	\$ 2.022.871,78	\$ 341.715.574,82	\$ 315.567.997,79
L01DB02	Daunorubicina	326,03	\$ 1.178.287,27	\$ 1.308.334,28	\$ 384.157.000,15	\$ 426.556.224,36
L01DB03	Epirubicina	430	\$ 2.367.241,99	\$ 2.340.653,54	\$ 1.017.914.055,09	\$ 1.006.481.023,21
L01DB06	Idarrubicina	248	\$ 21.115.357,20	\$ 126.692.143,20	\$ 5.236.608.585,60	\$ 31.419.651.513,60
L01DB07	Mitoxantrona	127	\$ 147.119,20	\$ 144.446,33	\$ 18.684.138,98	\$ 18.344.684,04
L01DC03	Mitomicina	233	\$ 534.818,84	\$ 545.733,51	\$ 124.612.790,65	\$ 127.155.908,83
L01XA03	Oxaliplatino	3170	\$ 1.436.576,03	\$ 1.496.544,11	\$ 4.553.946.023,03	\$ 4.744.044.833,65
L01XX05	Hidroxiurea	481	\$ 789.859,17	\$ 767.913,33	\$ 379.922.259,17	\$ 369.366.313,33
L01XX14	Tretinoína (ac. Todo trans retinoico)	242	\$ 97.996,50	\$ 97.996,50	\$ 23.715.153,00	\$ 23.715.153,00
L01XX19	Irinotecan	1291	\$ 695.096,94	\$ 723.240,41	\$ 897.370.145,80	\$ 933.703.374,04
L03AA02	Filgrastim	1278	\$ 4.880.933,40	\$ 5.036.600,58	\$ 6.237.832.885,44	\$ 6.436.775.538,78
V03AF01	Mesna	1701	\$ 1.589.203,61	\$ 1.659.695,81	\$ 2.703.235.339,13	\$ 2.823.142.578,44

GASTO ESTIMADO		
Recobros 2015 indexado	\$ 102.439.418.893,15	0
Estimado AIP	\$ 62.346.671.783,95	\$ 40.092.747.109,19

De acuerdo con lo anterior, como se observa en la

Gráfico 3 la medida de incorporación de estos medicamentos al PBS con cargo a la UPC tiene el potencial resultado de dejar 26 mil millones de pesos para su redistribución,

comparado al posible gasto si estos medicamentos continuaran condicionados al recobro ante ADRES.

Gráfico 3. Estimativo de redistribución

Referencias

1. Asociación Española Contra el Cáncer. ¿Qué es la Quimioterapia? Aecc. 2011;42.
2. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Manual para la elaboración de análisis de impacto presupuestal. 2014;8(1).
3. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/>.
4. Coleman, Michel P., and Claudia Allemani. 2015. "Cancer: The Elephant in the Room." *The Lancet* 385(9973): 1047–48. [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)60571-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60571-2).
5. *The Economist*. Control del cáncer, y acceso y desigualdad en América Latina. 2017;
6. Pardo, C. Cendales R. Incidencia, mortalidad y prevalencia de Cáncer en Colombia 2007-2011. Vol. 1, Instituto Nacional De Cancerología. 2015. 148 p.
7. Ministerio de Salud y Protección Social. Instituto Nacional de Cancerología E.S.E. Plan decenal para el control de cáncer en Colombia 2012-2021. Vasa. 2012. 1-124 p.
8. Subotic, S; Wyler, S; Bachmann, A (2012). "Surgical treatment of localised renal cancer". *European Urology Supplements*. 11 (3): 60–65. ISSN 1569-9056. doi:10.1016/j.eursup.2012.04.002.
9. Mieog, JSD; van der Hage, JA; van de Velde, CJH (2007). "Neoadjuvant chemotherapy for operable breast cancer". *British Journal of Surgery*. 94 (10): 1189–1200. PMID 17701939. doi:10.1002/bjs.5894.
10. Jafri, SH; Mills, G (2011). "Neoadjuvant chemotherapy in lung cancer". *Therapy*. 8 (1): 23–31. doi:10.2217/thy.10.82.
11. "Home Remedies for Lung Cancer".
12. Takimoto CH, Calvo E (2008). "Principles of Oncologic Pharmacotherapy". In Pazdur R, Wagman LD, Camphausen KA, Hoskins WJ. *Cancer Management: A Multidisciplinary Approach* (11 ed.).
13. Ministerio de Salud y Protección Social. Observatorio Nacional de Cáncer ONC Colombia. Guía Metodológica. 2015. Bogotá.
14. Se requieren 30 trámites para acceder al tratamiento de cáncer. *Revista Semana*. Consultado en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/tramites-para-acceder-al-tratamiento-de-cancer/482896>.
15. Plan Decenal para el Control de Cáncer en Colombia 2012-2021.
16. De Vries E, Pardo C, Wiesner C. Active Versus Passive Cancer Registry Methods Make the Difference: Case Report From Colombia. *J Glob Oncol*. 2017;JGO.17.00093.
17. Yepez MC, Uribe C, Arias N, Navarro E, de Vries E, Gamboa O, Gil OF, Pardo C. Sistema de información de cáncer en Colombia -SICC (Versión 1.0). [Internet]. Bogotá, Colombia: Instituto Nacional de Cancerología -INC 2017. Disponible de: <http://www.infocance>.
18. Cuenta de Alto Costo. Situación del cáncer en población adulta atendida en el SGSSS de Colombia ,2016. 2016.

19. Action Cancer Ontario, 2017.
20. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics, 2017.
21. Val R. Adams PD. Adverse Events Associated with Chemotherapy for Common Cancer.
22. Anna Markert, V_eronique Thierry, Martina Kleber MB and ME. Chemotherapy safety and severe adverse events in cancer patients: Strategies to efficiently avoid chemotherapy errors in in- and outpatient treatment. *Int J Cancer* 124, 722–728.
23. Michael J. Hassett , A. James O'Malley , Juliana R. Pakes JPN, Earle CC. Frequency and Cost of Chemotherapy-Related Serious Adverse Effects in a Population Sample of Women With Breast Cancer. *J Natl Cancer Inst.* 2006;
24. Elizabeth A. Chrischilles, Jane F. Pendergast, Katherine L. Kahn, Robert B. Wallace DCM, David P. Harrington, Catarina I. Kiefe, Jane C. Weeks, Dee W. West, S. Yousuf Zafar and RHF. Adverse events among the elderly receiving chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer. *J Clin Oncol.* 2010;
25. Sánchez G, Laza C, Estupiñán C, Estupiñán L. Barreras de acceso a los servicios de salud: narrativas de mujeres con cáncer de mama en Colombia. *Rev. Fac. Nac. Salud Pública* 2014; 32(3): 305-313.
26. Cardona J. Cuanto Costaría un Plan de Beneficios Integral JCardona. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo; 2012.

Anexos

Anexo 1. Registros sanitarios INVIMA

Tabla 1. Registros sanitarios ácido todotransretinoico (tretinoína)

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01XX14	INVIMA 2016M-004250-R2	tretinoína	vesanoid 10 mg.	capsula blanda	caja por un frasco de vidrio color ámbar por 100 cápsulas blandas.	coadyuvante en el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda (lpa, clasificación de la fab:lma-m3) pueden recibir tratamiento con el ácido holotransretinoico los pacientes no tratados previamente, así como los pacientes que han recaído o no han respondido a la quimioterapia habitual (daunomicina y arabinosido de citosina o un tratamiento equivalente)	vigente	cheplapharm arzneimittel gmbh	27207-1

Tabla 2. Registros sanitarios Capecitabina

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01BC06	INVIMA 2013M-0014640	Capecitabina	Kaxel 500 mg	Tableta cubierta con película	Caja de maule plegadiza con 1 blíster de aluminio/PVC-PVDC transparente	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia	Vigente	Medispray Laboratorios PVT Ltd.	20059955-1

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2013M-0014640	Capecita bina	Kaxel 500 mg	Tableta cubierta con película	Caja de maule plegadiza con 3 blisters de aluminio/PVC-PVDC transparente por 10 tabletas cada uno.	con paclitaxel y antraciclinas, cáncer colorrectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Manejo por médico oncólogo.	Vigente	Medispray Laboratori es PVT Ltd.	20059 955-2
L01 BC0 6	INVIMA 2013M-0014640	Capecita bina	Kaxel 500 mg	Tableta cubierta con película	Caja de maule plegadiza con 6 blisters de aluminio/PVC-PVDC transparente por 10 tabletas.		Vigente	Medispray Laboratori es PVT Ltd.	20059 955-3
L01 BC0 6	INVIMA 2013M-0014640	Capecita bina	Kaxel 500 mg	Tableta cubierta con película	Caja de maule plegadiza con 12 blisters de aluminio/PVC-PVDC transparente por 10 tabletas cada uno.		Vigente	Medispray Laboratori es PVT Ltd.	20059 955-4
L01 BC0 6	INVIMA 2008 M-012106 R-1	Capecita bina	Xeloda "Roche" tabletas lacadas 500mg	Tableta cubierta con película	Caja con blíster de película doble (PVC/PVDC) sellada con lámina de aluminio por 120 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	F. Hoffmann-La Roche Ltd. Basilea - Suiza	22974 5-1
L01 BC0 6	INVIMA M-012364	Capecita bina	Xeloda tabletas lacadas 150 mg	Tableta cubierta con película	Frasco de polietileno de alta densidad por 60 tabletas		Vencido	F. Hoffmann-La Roche Ltd. Basilea - Suiza	22974 6-1

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA M-012364	Capecitabina	Xeloda tabletas lacadas 150 mg	Tableta cubierta con película	Blíster de película doble (PVC/PVDC) sellada con lamina de aluminio en caja de cartón	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclinas. Cáncer colorrectal metastásico. En combinación con docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vencido	F. Hoffmann-La Roche Ltd. Basilea - Suiza	22974 6-2
L01 BC0 6	INVIMA 2012M-0012999	Capecitabina	Citabibex 500 mg	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blíster alu / alu	Cáncer de mama: la biterapia con capecitabina y docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. la capecitabina está indicada, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal: la capecitabina está indicada como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. La capecitabina está indicada como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico: la capecitabina está indicada como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Cancelado	Astrazene ca UK Limited	20040 580-1
L01 BC0 6	INVIMA 2012M-0012999	Capecitabina	Citabibex 500 mg	Tableta recubierta	Caja por 60 tabletas recubiertas en blíster alu / alu	Cáncer de mama: la biterapia con capecitabina y docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. la capecitabina está indicada, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal: la capecitabina está indicada como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. La capecitabina está indicada como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico: la capecitabina está indicada como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Cancelado	Astrazene ca UK Limited	20040 580-2

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2012M-0012999	Capecitabina	Citabibex 500 mg	Tableta recubierta	Caja por 120 tabletas recubiertas en blíster alu / alu	Cáncer de mama: la biterapia con capecitabina y docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. La capecitabina está indicada, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal: la capecitabina está indicada como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. La capecitabina está indicada como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico: la capecitabina está indicada como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Cancelado	Astrazene ca UK Limited	20040 580-3
L01 BC0 6	INVIMA 2013M-0014576	Capecitabina	Capexel tabletas 500 mg	Tableta cubierta con película	Caja por 120 tabletas recubiertas en blíster Alu/Alu (12 blíster c/u por 10 tabletas)	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Welfare Care SAS.	20053 629-1
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015032	Capecitabina	Capec 500 mg Tabletás Recubiertas	Tableta recubierta	Caja X 1 frasco HDPE X 120 tabletas	Cáncer de mama: la biterapia con capecitabina y docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. La capecitabina está indicada, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal: la capecitabina está indicada como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. La capecitabina está indicada como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico: la capecitabina está indicada como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Hetero Labs Limited	20060 296-1

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015032	Capecitabina	Capec 500 mg Tabletas Recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 3 blíster alu-alu con 10 tabletas c/u	Cáncer de mama: la biterapia con capecitabina y docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. La capecitabina está indicada, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal: la capecitabina está indicada como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. La capecitabina está indicada como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico: la capecitabina está indicada como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Hetero Labs Limited	20060 296-2
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecitabina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza por un blíster alu-alu por 7 tabletas recubiertas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-1
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecitabina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza por un blíster alu-alu por 10 tabletas recubiertas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-2
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecitabina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza con dos blísteres alu-alu por 7 tabletas recubiertas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-3
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecitabina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza con dos blísteres alu-alu por 10 tabletas recubiertas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-4

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecita bina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza con un blíster alu-alu por 4 tabletas recubiertas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclinas. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-5
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecita bina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza con cinco blísteres alu-alu por 4 tabletas recubiertas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclinas. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-6
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecita bina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 7 blíster alu-alu por 4 tabletas recubiertas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclinas. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-7
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecita bina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 3 blíster alu-alu por 10 tabletas recubiertas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclinas. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-8
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecita bina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 5 blíster alu-alu por 10 tabletas recubiertas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclinas. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-9

ATC INVI MA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecitabina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 10 blíster alu-alu por 10 tabletas recubiertas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclinas. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-10
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecitabina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 30 blíster alu-alu por 4 tabletas recubiertas cada uno.	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclinas. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-11
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015267	Capecitabina	Caxeta	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 50 blíster alu-alu por 10 tabletas recubiertas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclinas. Cáncer colorectal metastásico. Manejo por médico oncólogo. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun pharmaceutical industries ltd,	20060 323-12
L01 BC0 6	No reporta	Capecitabina	Cimtabina 500 mg	Tableta recubierta	Caja x 120 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Negado	Laboratorios Chalver de Colombia S.A.	20065 547-1
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecitabina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja con 1 blíster alu - alu x 7 tabletas	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclinas. Cáncer colorectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	20066 786-1

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecita bina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja con 1 blíster alu - alu x 10 tabletas	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmace utical Industries Ltd.	20066 786-2
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecita bina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja con 2 blíster alu - alu x 7 tabletas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmace utical Industries Ltd.	20066 786-3
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecita bina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja con 2 blíster alu - alu x 10 tabletas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmace utical Industries Ltd.	20066 786-4
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecita bina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja x 1 blíster alu - alu x 4 tabletas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmace utical Industries Ltd.	20066 786-5
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecita bina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja x 5 blíster alu - alu x 4 tabletas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmace utical Industries Ltd.	20066 786-6

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecita bina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja x 7 blíster alu - alu x 4 tabletas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmace utical Industries Ltd.	20066 786-7
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecita bina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja x 3 blíster alu - alu x 10 tabletas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmace utical Industries Ltd.	20066 786-8
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecita bina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja x 5 blíster alu - alu x 10 tabletas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmace utical Industries Ltd.	20066 786-9
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecita bina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja x 10 blíster alu - alu x 10 tabletas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmace utical Industries Ltd.	20066 786-10
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecita bina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja x 30 blíster alu - alu x 4 tabletas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclina. Cáncer colorectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmace utical Industries Ltd.	20066 786-11

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015343	Capecitabina	Caxeta 500	Tableta recubierta	Caja x 50 blíster alu - alu x 10 tabletas cada uno	Indicado en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico, resistente a la quimioterapia con paclitaxel y antraciclinas. Cáncer colorrectal metastásico. En combinación de docetaxel en cáncer de seno. Tratamiento adyuvante de los pacientes con cáncer de colon. Tratamiento en primera línea del cáncer gástrico localmente avanzado o metastásico.	Vigente	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	20066 786-12
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 10 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-1
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 20 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-2

ATC INVI MA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 30 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-3
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 40 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-4
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 50 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-5

ATC INVI MA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 60 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-6
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 70 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-7
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 80 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-8

ATC INVI MA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 90 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-9
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 100 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-10
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 120 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-11

ATC INVI MA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 10 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-12
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 20 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-13
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 30 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-14

ATC INVI MA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 40 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-15
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 50 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-16
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 60 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-17

ATC INVI MA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 70 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-18
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 80 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-19
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 90 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-20

ATC INVI MA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 100 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-21
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 120 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-22
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 50 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-23

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 60 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-24
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 70 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-25
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 80 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-26

ATC INVI MA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 90 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-27
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster PVC/PVDC- Alu por 100 tabletas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-28
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 50 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-29

ATC INVI MA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 60 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-30
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 70 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-31
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 80 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-32

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 90 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-33
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster ALU/OPA/ PVC por 100 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-34
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina a 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster PVC/PVCD-Alu por 120 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-35

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2014M-0015535	Capecitabina	Capecitabina 500 mg tabletas	Tableta con cubierta entérica con película	Uso institucional: caja en blíster ALU/OPA/PVC por 120 tabletas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Sandoz GMBH	20067 760-36
L01 BC0 6	INVIMA 2016M-0017502	Capecitabina	Nabticen 150 mg	Tableta recubierta	Caja de cartón con blíster de AL/PVC/PVDC por: 60 tabletas recubiertas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	NISSI S.A.S	20074 690-1
L01 BC0 6	INVIMA 2016M-0017502	Capecitabina	Nabticen 150 mg	Tableta recubierta	Caja de cartón con blíster de AL/PVC/PVDC por: 120 tabletas recubiertas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	NISSI S.A.S	20074 690-2

ATC INVI MA	REGISTR O SANITARI O	PRINCI PIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIA L	FORMA FARMACÉU TICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTAD O DEL REGISTR O	TITULAR DEL REGISTR O	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2016M-0017502	Capecita bina	Nabticen 150 mg	Tableta recubierta	Uso institucional: caja de cartón con blíster de AL/PVC/PVDC por: 60 tabletas recubiertas	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	NISSI S.A.S	20074 690-3
L01 BC0 6	INVIMA 2016M-0017065	Capecita bina	Capiibine 500 mg tabletas	Tableta recubierta	120 tabletas, caja x 12 blíster (cada blíster con 10 tabletas) genérico	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Dr Reddy's Laboratories Limited	20095 993-1
L01 BC0 6	INVIMA 2016M-0017065	Capecita bina	Capiibine 500 mg tabletas	Tableta recubierta	120 tabletas caja x 12 blíster (cada blíster con 10 tabletas). Uso institucional genérico.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Dr Reddy's Laboratories Limited	20095 993-2

ATC INVI MA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC0 6	INVIMA 2016M-0017065	Capecitabina	Capiibine 500 mg tabletas	Tableta recubierta	120 tabletas caja x 12 blíster (cada blíster con 10 tabletas) comercial	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Dr Reddy's Laboratories Limited	20095 993-27
L01 BC0 6	INVIMA 2016M-0017065	Capecitabina	Capiibine 500 mg tabletas	Tableta recubierta	120 tabletas caja x 12 blíster (cada blíster con 10 tabletas)- uso institucional comercial	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicada en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	Dr Reddy's Laboratories Limited	20095 993-28
L01 BC0 6	INVIMA 2016M-0017503	Capecitabina	Nabticen 500 mg tabletas	Tableta recubierta	Caja de cartón con blíster de AL/PVC/PVDC por: 60 tabletas recubiertas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicado en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	NISSI S.A.S	20105 320-2

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR DEL REGISTRO	CUM
L01 BC06	INVIMA 2016M-0017503	Capecitabina	Nabticen 500 mg tabletas	Tableta recubierta	Uso institucional: caja de cartón con blíster de AL/PVC/PVDC por: 60 tabletas recubiertas.	Cáncer de mama. La biterapia con docetaxel está indicado en el tratamiento de cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. La terapia previa debería haber incluido una antraciclina. Está indicado, además como monoterapia en el tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado o metastásico resistente a una pauta antineoplásica con un taxano y una antraciclina, o cuando no está indicado proseguir el tratamiento antraciclínico. Cáncer colorrectal, está indicado como tratamiento adyuvante en el cáncer de colon. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico. Cáncer gástrico. Está indicado como tratamiento de primera línea en el cáncer gástrico avanzado.	Vigente	NISSI S.A.S	20105320-3

Tabla 3. Registros sanitarios Carmustina

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01AD01	INVIMA 2015M-0015983	Carmustina	BICNU®-100MG	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 vial de vidrio ámbar con ampolla con diluyente por 3 ml	Agente antineoplásico único o combinado en tumores cerebrales, mieloma múltiple, enfermedad de Hodgkin y linfomas	Vigente	Emcure Pharmaceuticals, Ltd	20086666-1
L01AD01	INVIMA 2012M-013097-R2	Carmustina	BICNU® 100MG	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 10 viales ámbar x 100 mg con tapón butilo, sello flip-off alu/pp y ampolla diluyente de vidrio tipo i, con 3 ml alcohol	Agente antineoplásico único o combinado en tumores cerebrales, mieloma múltiple, enfermedad de Hodgkin y linfomas	Perdida fuerza ejec	Bristol Myers Squibb De Colombia S.A.	40540-1
L01AD01	INVIMA 2012M-013097-R2	Carmustina	BICNU® 100MG	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 vial ámbar x 100 mg con tapón butilo y sello flip-off alu/pp con ampolla de vidrio tipo i con diluyente por 3 ml.	Agente antineoplásico único o combinado en tumores cerebrales, mieloma múltiple, enfermedad de Hodgkin y linfomas	Perdida fuerza ejec	Bristol Myers Squibb De Colombia S.A.	40540-2
L01AD01	INVIMA M-13893	Carmustina (bcnu)	GLIADEL (CARMUSTINA)	Implantes y sistemas	Caja de tratamiento de dosis única que contiene ocho wafers	Está indicado para el uso como adyuvante de la cirugía, para	Vencido	Sanofi-Aventis De Colombia S.A.	19900945-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
				intrauterinos e intraoculares	empacados individualmente	prolongar la supervivencia en pacientes con glioblastoma multiforme recurrente en quienes está indicada la resección quirúrgica.			

Tabla 4. Registros sanitarios Dactinomicina

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01DA01	INVIMA 2009 M-013368-R1	Dactinomicina	Dactinomicina 0,5mg inyección	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Vial de vidrio, color ámbar con tapón, caja 1 viales	Tratamiento de tumor de Wilms, rabdomiosarcoma, tumores del útero y tumores sólidos.	Vigente	Korea United Pharm. Inc.	19902428-1
L01DA01	INVIMA 2009 M-013368-R1	Dactinomicina	Dactinomicina 0,5mg inyección	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Vial de vidrio, color ámbar con tapón, caja 5 viales	Tratamiento de tumor de Wilms, rabdomiosarcoma, tumores del útero y tumores sólidos.	Vigente	Korea United Pharm. Inc.	19902428-2
L01DA01	INVIMA 2009 M-013368-R1	Dactinomicina	Dactinomicina 0,5mg inyección	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Vial de vidrio, color ámbar con tapón, caja 10 viales	Tratamiento de tumor de Wilms, rabdomiosarcoma, tumores del útero y tumores sólidos.	Vigente	Korea United Pharm. Inc.	19902428-3
L01DA01	INVIMA 2009 M-013368-R1	Dactinomicina	Dactinomicina 0,5mg inyección	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Vial de vidrio, color ámbar con tapón, caja 100 viales	Tratamiento de tumor de Wilms, rabdomiosarcoma, tumores del útero y tumores sólidos.	Vigente	Korea United Pharm. Inc.	19902428-4
L01DA01	INVIMA M-001167 R-2	Dactinomicina uso	Cosmegen lyovac	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco vial. 0,5 mg/ml	Antineoplásico	Vencido	Merck & Co. Inc. Elkton	30322-1
L01DA01	INVIMA M-007324	Dactinomicina	Actinomicina d inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Vial x 0,5 mg	Tratamiento de tumor de Wilms, rabdomiosarcoma, tumores de útero y testículos, sarcoma de ewing's, osteogénico y de	Vencido	Laboratorios Eron S.A.	49300-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						Kaposi y otros tumores sólidos			
	M-014478	Dactinomicina d	Dactinomicina	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable		Tratamiento de tumor de Wilms, rabdomiosarcoma, tumores de útero y testículos, sarcoma de ewing's, osteogénico y de Kaposi y otros tumores sólidos.	Vencido	Empresa Cubana Importadora Y Exportadora De Productos Medico	49422-
L01DA01	INVIMA 2005M-0005026	Dactinomicina (actinomicina d)	Ac-de® 0.5 mg solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 frasco ampula.	Tratamiento de tumor de Wilms, rabdomiosarcoma, tumores de útero y tumores sólidos	Vencido	Lemery S.A. De C.V.	19955771-1
L01DA01	INVIMA 2005M-0005026	Dactinomicina (actinomicina d)	Ac-de® 0.5 mg solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 10 frascos ampula.	Tratamiento de tumor de Wilms, rabdomiosarcoma, tumores de útero y tumores sólidos	Vencido	Lemery S.A. De C.V.	19955771-2

Tabla 5. Registros sanitarios Daunorubicina

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01DB02	INVIMA M-001720 R-2	Daunorubicina clorhidrato (equivalente a daunorubicina base 20 mg)	Cerubidine polvo liofilizado para inyección	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Vial por 20 mg + ampolla de solvente por 5 ml.	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia aguda, leucemia mieloide crónica, enfermedad de Hodking y sarcoma.	Vencido	Bellon	32067-1
L01DB02	INVIMA 2009 M-13938 R1	Daunorubicina clorhidrato equivalente a daunorubicina	Daunorubicina hydrochloride 20 mg/vial	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 frasco vial + ampolla con 4 ml de diluyente.	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma transicional (sarcoma, neuroblastoma, carcinoma de mama, ovario, tiroides y gástrico, tumor de Wilms, leucemia linfoblástica aguda, linfomas, neoplasma maligno de pulmón y sangre)	Vigente	Korea United Pharm. Inc.	19905590-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01DB02	INVIMA 2009M-0009166	Clorhidrato de daunorubicina equivalente a daunorubicina	Runabicon®	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco vial de vidrio tipo I con liofilizado	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia aguda, leucemia mieloide crónica, enfermedad de Hodgkin y sarcoma.	Vigente	Laboratorios Pisa S.A. De C.V.	19993866-1
L01DB02	INVIMA 2009M-0009999	Daunorubicina clorhidrato 21mg equivalente a daunorubicina	Daunac 20 mg vial	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por vial vidrio tipo I por 20 mg.	Inducción de la remisión en la leucemia aguda no linfocítica (mielógena, monocítica, eritroide) de adultos y para la inducción de la remisión en la leucemia linfocítica aguda de niños y de adultos.	Vigente	Vitalchem Laboratories De Colombia S.A.	20004388-1

Tabla 6. Registros sanitarios Docetaxel

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01CD02	INVIMA 2016M-005127-R2	Docetaxel	Taxotere Vial X 20 mg	Solución concentrada para infusión	Caja por 1 vial con 0,5 ml de producto más 1 vial con 1,5 ml de solvente	<p><i>Tratamiento adyuvante en cáncer de mama:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - En combinación con doxorubicina y ciclofosfamida está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con: - Cáncer de mama operable con ganglios positivos. - Cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo (ver eficacia clínica/estudios clínicos). - Doxorubicina y ciclofosfamida seguidos por docetaxel en combinación con trastuzumab (AC TH) está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama operable cuyos tumores sobre expresan HER2. - En combinación con trastuzumab y carboplatino (TCH) está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama operable cuyos tumores sobre expresan HER2. <p>Cáncer de mama metastásico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En combinación con doxorubicina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o 	Vigente	Sanofi Aventis de Colombia S.A	112083-1

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
						<p>metastásico que no recibieron previamente terapia citotóxica para esta enfermedad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En combinación con trastuzumab está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico cuyos tumores sobre expresan HER2 y que no recibieron previamente quimioterapia para la enfermedad metastásica. - Como monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la terapia citotóxica. La quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina o un agente alquilante. - En combinación con capecitabina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia citotóxica. La terapia previa debe haber incluido una antraciclina. <p><i>Cáncer pulmonar de células no-pequeñas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - En combinación con cisplatino está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas irresecable, localmente avanzado o metastásico, en los pacientes que no recibieron previamente quimioterapia para esta enfermedad. En combinación con carboplatino representa una opción de tratamiento para la terapia a base de cisplatino. - Está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia previa. <p><i>Cáncer de ovario.</i></p> <p><i>Cáncer de próstata:</i></p> <p>En combinación con prednisona o prednisolona está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico independiente de andrógeno (refractario a hormonas).</p> <p><i>Adenocarcinoma gástrico:</i></p> <p>En combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo está indicado para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no recibieron quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.</p> <p><i>Cáncer de cabeza y cuello:</i></p> <p>En combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo, está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer escamocelular de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecable (estados III y IV) con buen estado funcional.</p>			

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIMA 2016M - 00512 7-R2	Docetaxel	Taxotere Vial X 20 mg	Solución concentrada para infusión	Caja por un vial de vidrio tipo I incoloro con 1 ml de solución concentrada para infusión	<p>Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa.</p> <p><i>Tratamiento adyuvante en cáncer de mama:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - En combinación con doxorubicina y ciclofosfamida está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con: <ul style="list-style-type: none"> - Cáncer de mama operable con ganglios positivos. - Cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo (ver eficacia clínica/estudios clínicos). - Doxorubicina y ciclofosfamida seguidos por docetaxel en combinación con trastuzumab (AC TH) está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama operable cuyos tumores sobre expresan HER2. - En combinación con trastuzumab y carboplatino (TCH) está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama operable cuyos tumores sobre expresan HER2. <p><i>Cáncer de mama metastásico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - En combinación con doxorubicina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico que no recibieron previamente terapia citotóxica para esta enfermedad. - En combinación con trastuzumab está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico cuyos tumores sobre expresan HER2 y que no recibieron previamente quimioterapia para la enfermedad metastásica. - Como monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la terapia citotóxica. La quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina o un agente alquilante. - En combinación con capecitabina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia citotóxica. La terapia previa debe haber incluido una antraciclina. <p><i>Cáncer pulmonar de células no-pequeñas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - En combinación con cisplatino está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas irresecable, localmente avanzado o metastásico, en los pacientes que no recibieron previamente quimioterapia para esta enfermedad. En combinación con carboplatino representa una opción de tratamiento para la terapia a base de cisplatino. 	Vigente	Sanofi Aventis de Colombia S.A	11208 3-2

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
						<p>- Está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia previa.</p> <p><i>Cáncer de ovario.</i></p> <p><i>Cáncer de próstata:</i></p> <p>En combinación con prednisona o prednisolona está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico independiente de andrógeno (refractario a hormonas).</p> <p><i>Adenocarcinoma gástrico:</i></p> <p>En combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo está indicado para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no recibieron quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.</p> <p><i>Cáncer de cabeza y cuello:</i></p> <p>En combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo, está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer escamocelular de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecable (estados III y IV) con buen estado funcional.</p> <p>Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa.</p>			
L01C D02	INVIMA 2006M - 00512 6R1	Docetaxel	Taxotere Vial X 80 mg	Solución concentrada para infusión	Caja por un vial con 2 ml de producto más un vial con 6 ml de solvente	<p><i>Tratamiento adyuvante en cáncer de mama:</i></p> <p>- En combinación con doxorubicina y ciclofosfamida está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con:</p> <p>- Cáncer de mama operable con ganglios positivos.</p> <p>- Cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo (ver eficacia clínica/estudios clínicos).</p> <p>- Doxorubicina y ciclofosfamida seguidos por docetaxel en combinación con trastuzumab (AC TH) está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama operable cuyos tumores sobre expresan HER2.</p> <p>- En combinación con trastuzumab y carboplatino (TCH) está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama operable cuyos tumores sobre expresan HER2.</p> <p><i>Cáncer de mama metastásico:</i></p> <p>- En combinación con doxorubicina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico que no recibieron previamente terapia citotóxica para esta enfermedad.</p>	En trámite de renovación	Sanofi Aventis de Colombia S.A	11208 4-1

Evidencia que promueve Confianza

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
						<p>- En combinación con trastuzumab está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico cuyos tumores sobre expresan HER2 y que no recibieron previamente quimioterapia para la enfermedad metastásica.</p> <p>- Como monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la terapia citotóxica. La quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina o un agente alquilante.</p> <p>- En combinación con capecitabina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia citotóxica. La terapia previa debe haber incluido una antraciclina.</p> <p><i>Cáncer pulmonar de células no-pequeñas:</i></p> <p>- En combinación con cisplatino está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas irresecable, localmente avanzado o metastásico, en los pacientes que no recibieron previamente quimioterapia para esta enfermedad. En combinación con carboplatino representa una opción de tratamiento para la terapia a base de cisplatino.</p> <p>- Está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia previa.</p> <p><i>Cáncer de ovario.</i></p> <p><i>Cáncer de próstata:</i></p> <p>En combinación con prednisona o prednisolona está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico independiente de andrógeno (refractario a hormonas).</p> <p><i>Adenocarcinoma gástrico:</i></p> <p>En combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo está indicado para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no recibieron quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.</p> <p><i>Cáncer de cabeza y cuello:</i></p> <p>En combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo, está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer escamocelular de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecable (estados III y IV) con buen estado funcional.</p>			

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIMA 2006M - 00512 6R1	Docetaxel	Taxotere Vial X 80 mg	Solución concentrada para infusión	Estuche por un vial con 4 ml de solución concentrada para infusión I.V.	<p>Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa.</p> <p><i>Tratamiento adyuvante en cáncer de mama:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - En combinación con doxorubicina y ciclofosfamida está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con: <ul style="list-style-type: none"> - Cáncer de mama operable con ganglios positivos. - Cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo (ver eficacia clínica/estudios clínicos). - Doxorubicina y ciclofosfamida seguidos por docetaxel en combinación con trastuzumab (AC TH) está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama operable cuyos tumores sobre expresan HER2. - En combinación con trastuzumab y carboplatino (TCH) está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama operable cuyos tumores sobre expresan HER2. <p><i>Cáncer de mama metastásico:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - En combinación con doxorubicina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico que no recibieron previamente terapia citotóxica para esta enfermedad. - En combinación con trastuzumab está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico cuyos tumores sobre expresan HER2 y que no recibieron previamente quimioterapia para la enfermedad metastásica. - Como monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la terapia citotóxica. La quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina o un agente alquilante. - En combinación con capecitabina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia citotóxica. La terapia previa debe haber incluido una antraciclina. <p><i>Cáncer pulmonar de células no-pequeñas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - En combinación con cisplatino está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas irreseccable, localmente avanzado o metastásico, en los pacientes que no recibieron previamente quimioterapia para esta enfermedad. En combinación con carboplatino representa una opción de tratamiento para la terapia a base de cisplatino. 	En trámite de renovación	Sanofi Aventis de Colombia S.A	11208 4-2

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
						<p>- Está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia previa.</p> <p><i>Cáncer de ovario.</i></p> <p><i>Cáncer de próstata:</i></p> <p>En combinación con prednisona o prednisolona está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico independiente de andrógeno (refractario a hormonas).</p> <p><i>Adenocarcinoma gástrico:</i></p> <p>En combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo está indicado para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no recibieron quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.</p> <p><i>Cáncer de cabeza y cuello:</i></p> <p>En combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo, está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer escamocelular de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecable (estados III y IV) con buen estado funcional.</p> <p>Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa.</p>			
L01C D02	INVIMA 2009 M-012237 - R1	Docetaxel	Oncodocel 20 mg solución inyectable	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1 frasco ampolla de vidrio + un frasco ampolla por 1.5 ml de solvente.	<p>Cáncer de mama metastásico refractario a otros</p> <p>Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado.</p> <p>En combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a sida, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.</p>	Vigente	Farmacéutica Paraguaya/ Asofarma S.A.I. Y C.	23018

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIMA 2016M - 14333-R2	Docetaxel	Oncodocel 80 mg solución inyectable	Solución inyectable	Caja con frasco ampolla con solución inyectable + frasco ampolla solvente.	<p>Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario.</p> <p>Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa.</p> <p>Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadío III o IV), con buen estado funcional.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante.</p> <p>Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.</p> <p>Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.</p>	Vigente	Farmacéutica Paraguaya S.A	23018
L01C D02	INVIMA 2016M - 14333-R2	Docetaxel	Oncodocel 80 mg solución inyectable	Solución inyectable	Caja con frasco ampolla con 2 ml de solución inyectable+ frasco ampolla con 6 ml solvente.	<p>Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario.</p> <p>Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa.</p> <p>Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadío III o IV), con buen estado funcional.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante.</p> <p>Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.</p> <p>Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.</p>	Vigente	Farmacéutica Paraguaya S.A	23018
L01C D02	INVIMA M-	Docetaxel	Adenex Inyecta	Inyectables	Caja por 1 vial más solvente	<p>Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y localmente avanzado. Cáncer de ovario.</p> <p>Tratamiento de segunda línea para sarcoma de Kaposi en pacientes</p>	Vencido	Biogen laboratorios	19907

ATC INVIM A	Registro sanitario	Principio activo INVIM A	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
	014586		ble 20 mg		para docetaxel inyectable.	con SIDA que estén recibiendo terapia antiretroviral en los cuales ha fracasado la quimioterapia previa.		de Colombia S.A.	
L01C D02	INVIM A M-014586	Docetaxel	Adenex Inyectable 20 mg	Inyectables	Caja por 4 viales más solvente para docetaxel inyectable.	Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y localmente avanzado. Cáncer de ovario. Tratamiento de segunda línea para sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA que estén recibiendo terapia antiretroviral en los cuales ha fracasado la quimioterapia previa.	Vencido	Biogen laboratorios de Colombia S.A.	19907
L01C D02	INVIM A M-014607	Docetaxel	Adenex Inyectable 80 mg	Inyectables	Caja x 1 vial más solvente para docetaxel inyectable.	Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y localmente avanzado. Cáncer de ovario. Tratamiento de segunda línea para sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA que estén recibiendo terapia antiretroviral en los cuales ha fracasado la quimioterapia previa.	Vencido	Biogen laboratorios de Colombia S.A.	19907
L01C D02	INVIM A M-014607	Docetaxel	Adenex Inyectable 80 mg	Inyectables	Caja x 4 viales más solvente para docetaxel inyectable.	Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y localmente avanzado. Cáncer de ovario. Tratamiento de segunda línea para sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA que estén recibiendo terapia antiretroviral en los cuales ha fracasado la quimioterapia previa.	Vencido	Biogen laboratorios de Colombia S.A.	19907
L01C D02	INVIM A 2001M - 0000183	Docetaxel	Docetaxel Inyectable (80 mg.)	Solución inyectable	Frasco vial en vidrio tipo I por 2,0 ml + frasco vial en vidrio tipo I con solvente, en caja.	Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y localmente avanzado. Cáncer de ovario. Tratamiento de segunda línea para sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA que estén recibiendo terapia antiretroviral en los cuales ha fracasado la quimioterapia previa.	Cancelado	laboratorios Filaxis S.A.	19915
L01C D02	INVIM A 2001M - 0000482	Docetaxel	Docetaxel inyectable 20 mg/ml	Solución inyectable	Caja de cartón impresa con un frasco ampolla de vidrio transparente tipo I que contiene docetaxel 20 mg/0, 5 ml, más un frasco	Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y localmente avanzado. Cáncer de ovario. Tratamiento de segunda línea para sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA que estén recibiendo terapia antiretroviral en los cuales ha fracasado la quimioterapia previa.	Cancelado	laboratorios Filaxis S.A.	19915
L01C D02	INVIM A 2002M -	Docetaxel	Docetaxel 80 mg / 2.0 ml	Solución inyectable	Caja por 1 frasco ampolla por 2 ml más 1 ampolla por 6,0 ml de	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19926

ATC INVIM A	Regist ro sanita rio	Princi pio activo INVIM A	Nombr e comerc ial	Forma farmacé utica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitari o	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	00010 13 INVIM A 2002M - 00010 13	Docet axel	Docetax el 80 mg / 2.0 ml	Solució n inyectabl e	diluyente. (vidrio tipo I) Caja por 5 frascos ampollas por 2 ml más 5 ampollas por 6,0 ml de diluyente. (vidrio tipo I)	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19926
L01C D02	00010 13 INVIM A 2002M - 00010 13	Docet axel	Docetax el 80 mg / 2.0 ml	Solució n inyectabl e	Caja por 10 frascos ampollas por 2 ml más 10 ampollas por 6,0 ml de diluyente. (vidrio tipo I)	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19926
L01C D02	00010 13 INVIM A 2002M - 00010 13	Docet axel	Docetax el 80 mg / 2.0 ml	Solució n inyectabl e	Caja por 20 frascos ampollas por 2 ml más 20 ampollas por 6,0 ml de diluyente. (vidrio tipo I)	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19926
L01C D02	00010 13 INVIM A 2002M - 00010 13	Docet axel	Docetax el 80 mg / 2.0 ml	Solució n inyectabl e	Caja por 50 frascos ampollas por 2 ml más 50 ampollas por 6,0 ml de diluyente. (vidrio tipo I)	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19926
L01C D02	00021 86 INVIM A 2003M - 00021 86	Docet axel	Docetax el Sandoz 20 mg	Polvo liofilizado para reconstit uir a solución inyectabl e	Frasco ampolla incolore de vidrio neutro tipo I, con capacidad de 7 ml, tapón de clorobutilo y agrafe de aluminio y solución sol	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	Sandoz S.A.	19934
L01C D02	00021 86 INVIM A 2003M - 00021 86	Docet axel	Docetax el Sandoz 20 mg	Polvo liofilizado para reconstit uir a solución	Frasco ampolla de vidrio tipo I con capacidad 7 ml, tapón de bromobutilo y agrafe de	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	Sandoz S.A.	19934

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
				inyectable	aluminio y solución solvente.				
L01C D02	INVIMA 2003M - 00021 86	Docetaxel	Docetaxel Sandoz 20 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con frasco ampolla incoloro vidrio trat de 80 ml tapón de caucho de bromobutilo y cápsula de aluminio por 1 frasco ampolla	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	Sandoz S.A.	19934
L01C D02	INVIMA 2003M - 00022 97	Docetaxel	Docetaxel Sandoz (R) 80 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con frasco ampolla incoloro vidrio tipo I de 2ml tapón de caucho y precinta de aluminio por 1 frasco ampolla más 1 frasco	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	Sandoz S.A.	19934
L01C D02	INVIMA 2003M - 00022 97	Docetaxel	Docetaxel Sandoz (R) 80 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con frasco ampolla incoloro vidrio tipo I de 2ml tapón de caucho y precinta de aluminio por 2 frasco ampolla más 2 frascos	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	Sandoz S.A.	19934
L01C D02	INVIMA 2003M - 00022 97	Docetaxel	Docetaxel Sandoz (R) 80 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con frasco ampolla incoloro vidrio tipo I de 2ml tapón de caucho y precinta de aluminio por 3 frasco ampolla más 3 frascos	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	Sandoz S.A.	19934
L01C D02	INVIMA A	Docetaxel	Docetaxel	Polvo liofilizado	Uso hospitalario: caja con frasco	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	Sandoz S.A.	19934

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
	2003M - 00022 97		Sandoz (R) 80 mg	para reconstituir a solución inyectable	ampolla incoloro vidrio tipo I de 2ml tapón de caucho por 10 frasco ampolla más 10 frascos				
L01C D02	INVIMA 2003M - 00022 97	Docetaxel	Docetaxel Sandoz (R) 80 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Uso hospitalario: caja con frasco ampolla incoloro vidrio tipo I de 2ml tapón de caucho por 20 frasco ampolla más 20 frascos	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	Sandoz S.A.	19934
L01C D02	INVIMA 2003M - 00022 97	Docetaxel	Docetaxel Sandoz (R) 80 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con frasco ampolla incoloro vidrio tipo I de 2ml tapón de caucho y precinta de aluminio por 6 frasco ampolla más 6 frascos	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	Sandoz S.A.	19934
L01C D02	INVIMA 2003M - 00022 97	Docetaxel	Docetaxel Sandoz (R) 80 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con frasco ampolla incoloro vidrio tipo I de 80 ml tapón de caucho y precinta de aluminio por 1 frasco ampolla	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos.	Vencido	Sandoz S.A.	19934
No reporta	No reporta	Docetaxel	Docetaxel 20 mg/0.5 ml Solución Inyectable	Solución inyectable	No reporta	No reporta	Negado	laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19938

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIMA 2015M - 00034 35-R1	Docetaxel	Oncotaxel 80 mg	Solución inyectable	Caja con un vial de vidrio tipo I traslúcido con tapón de butilo y agrafe de aluminio por 2 ml de docetaxel 80 mg + 1 vial tipo I traslúcido con tapón de butilo y agrafe de aluminio de solvente para inyección 6 ml.	<p>Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario.</p> <p>Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa.</p> <p>Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadío III o IV), con buen estado funcional.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante.</p> <p>Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.</p> <p>Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.</p>	Vigente	Biotoscana Farma S.A.	19941
L01C D02	INVIMA 2015M - 00034 35-R1	Docetaxel	Oncotaxel 80 mg	Solución inyectable	Uso institucional, caja con un vial de vidrio tipo I traslúcido con tapón de butilo y agrafe de aluminio por 2 ml de docetaxel 80 mg + 1 vial tipo I traslúcido con tapón de butilo y agrafe de aluminio de solvente para inyección 6 ml.	<p>Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario.</p> <p>Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa.</p> <p>Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadío III o IV), con buen estado funcional.</p> <p>Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante.</p> <p>Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.</p> <p>Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.</p>	Vigente	Biotoscana Farma S.A.	19941
L01C D02	INVIMA 2015M	Docetaxel	Oncotaxel Solución	Solución inyectable	Caja con vial 0.5 ml de docetaxel 20 mg + caja con	Cáncer de mama metastásico refractario. Terapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo. Tratamiento del cáncer de pulmón	Vigente	Biotoscana Farma S.A.	19942

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
	- 00033 83-R1		n Inyectable 20 mg		vial x 1. 5 ml de solvente.	de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado. En combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de segunda línea para sarcoma de Kaposi en pacientes con sida que están recibiendo terapia antiretroviral en los cuales ha fracasado la quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.			
L01C D02	INVIMA A 2015M - 00033 83-R1	Docetaxel	Oncotaxel Solución Inyectable 20 mg	Solución inyectable	Caja con un vial de vidrio tipo I con tapón de butilo gris y agrafe de aluminio color rojo conteniendo 20 mg de docetaxel	Cáncer de mama metastásico refractario. Terapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado. En combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de segunda línea para sarcoma de Kaposi en pacientes con sida que están recibiendo terapia antiretroviral en los cuales ha fracasado la quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.	Vigente	Biotoscana Farma S.A.	19942
L01C D02	INVIMA A 2015M - 00033 83-R1	Docetaxel	Oncotaxel Solución Inyectable	Solución inyectable	Caja con un vial de vidrio tipo I con tapón de butilo gris y agrafe de aluminio color	Cáncer de mama metastásico refractario. Terapia adyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado. En combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo	Vigente	Biotoscana Farma S.A.	19942

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
			ble 20 mg		rojo conteniendo 20 mg de docetaxel + 1 vial de vidrio tipo I y tapón de butilo siliconado conteniendo 1.5 mL de solvente (diluyente).	adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de segunda línea para sarcoma de Kaposi en pacientes con sida que están recibiendo terapia antiretroviral en los cuales ha fracasado la quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.			
No reporta	No reporta	Docetaxel	Tarckodoc 20 mg Solución Inyectable	Solución inyectable	No reporta	Cáncer de mama metastásico, refractario a otros tratamientos.	Negado	Merck S.A.	19962
No reporta	No reporta	Docetaxel	Tarkodoc 80 mg Solución Inyectable	Solución inyectable	No reporta	Cáncer de mama metastásico, refractario a otros tratamientos.	Negado	Merck S.A.	19962
L01CD02	INVIMA 2017M - 00061 97-R1	Docetaxel	Docetaxel 80 mg - Solución Inyectable	Solución inyectable	Caja con 1 vial de vidrio transparente tipo I con tapón de butilo y precinto de aluminio con 2,0 ml de Solución Concentrada para infusión (40mg/ml) y 1 vial de vidrio tipo I tapón de butilo y precinto de aluminio con solvente 6,0 ml	Tratamiento de pacientes con cáncer avanzado o metastásico de mama y tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas.	Vigente	laboratorios Libra S.A	19966

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIMA 2006M - 00064 86	Docetaxel	Docetaxel Inyectable	Solución inyectable	Caja por un frasco vial con tapón de caucho gris y tapa flip off (gris) aluminio x 20 mg. Frasco vial vidrio tipo I transparente	Cáncer de mama metastásico refractario a otros. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Pacientes con cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo.	En trámite de renovación	Fresenius Kabi Oncology Ltd.	19967
L01C D02	INVIMA 2017M - 00064 93-R1	Docetaxel	Docetaxel 20 mg solución inyectable	Solución inyectable	Caja con 1 vial de vidrio transparente tipo I con tapón de butilo y precinto de aluminio con 0.5 ml de solución concentrada para infusión (40mg/ml) y 1 vial de vidrio tipo I tapón de butilo y precinto de aluminio con solvente 1.5 ml	Está indicado en el tratamiento de los pacientes con cáncer avanzado o metastásico de mama. Cáncer de pulmón avanzado a células no pequeñas	Vigente	laboratorios Libra S.A.	19968
L01C D02	INVIMA 2007M - 00067 28	Docetaxel	Docetaxel solución inyectable 20 mg / 0.5 ml	Solución inyectable	Caja con 1 frasco ampolla de vidrio tipo I con 20 mg de docetaxel + 1 frasco ampolla de vidrio tipo I	Cáncer de mama metastásico refractario a otros. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia	Vencido	laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19969

ATC INVIM A	Registro sanitario	Principio activo INVIM A	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
					con 1.5 ml de solvente.	previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.			
L01C D02	INVIM A 2007M - 00067 28	Docetaxel	Docetaxel solución inyectable 20 mg / 0.5 ml	Solución inyectable	Caja con 5 frascos ampolla de vidrio tipo I con 20 mg de docetaxel c/u+5 frasco ampolla de vidrio tipo I con 1.5 ml de solvente.	Cáncer de mama metastático refractario a otros. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastático y/o localmente avanzado. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.	Vencido	laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19969
L01C D02	INVIM A 2007M - 00067 28	Docetaxel	Docetaxel solución inyectable 20 mg / 0.5 ml	Solución inyectable	Caja con 10 frascos ampolla de vidrio tipo I con 20 mg de docetaxel + 10 frasco ampolla de vidrio tipo I con 1.5 ml de solvente.	Cáncer de mama metastático refractario a otros. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastático y/o localmente avanzado. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.	Vencido	laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19969
L01C D02	INVIM A 2007M - 00067 28	Docetaxel	Docetaxel solución inyectable 20 mg / 0.5 ml	Solución inyectable	Caja con 20 frascos ampolla de vidrio tipo I con 20 mg de docetaxel + 20 frasco ampolla de vidrio tipo I con 1.5 ml de solvente.	Cáncer de mama metastático refractario a otros. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastático y/o localmente avanzado. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.	Vencido	laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19969

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIMA 2007M - 00067 28	Docetaxel	Docetaxel solución inyectable 20 mg / 0.5 ml	Solución inyectable	Caja con 50 frascos ampolla de vidrio tipo I con 20 mg de docetaxel + 50 frasco ampolla de vidrio tipo I con 1.5 ml de solvente.	Cáncer de mama metastásico refractario a otros. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.	Vencido	laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19969
L01C D02	INVIMA 2006M - 00066 36	Docetaxel	Docetaxel 80 mg Inyectable	Solución concentrada para infusión	Caja con 1 frasco vial de concentrado para infusión más frasco vial de solvente (etanol - agua para inyección)	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estado III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	En trámite de renovación	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19969
L01C D02	INVIMA 2006M - 00066 36	Docetaxel	Docetaxel 80 mg Inyectable	Solución concentrada para infusión	Caja con 10 frasco vial de concentrado para infusión más frasco vial de solvente (etanol - agua para inyección)	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estado III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo	En trámite de renovación	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19969

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIMA A 2006M - 00066 36	Docetaxel	Docetaxel 80 mg Inyectable	Solución concentrada para infusión	Caja con 25 frasco vial de concentrado para infusión más frasco vial de solvente (etanol - agua para inyección)	adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	En trámite de renovación	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19969
L01C D02	INVIMA A 2007M - 00070 55	Docetaxel	Docetaxel Inyectable	Solución inyectable	1 frasco vial con docetaxel concentrado 80 mg + solvente	Cáncer de mama metastásico refractario a otro tratamiento. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo.	Vencido	Fresenius Kabi Oncology Ltd.	19974
L01C D02	INVIMA A 2008M - 00088 39	Docetaxel	Docetaxel 20 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartulina con un frasco vial y una ampolla de diluyente	Cáncer de mama metastásico, refractario a otros tratamientos.	Vigente	Glenmark Generics S.A.	19996

ATC INVIM A	Registro sanitario	Principio activo INVIM A	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIM A 2008M - 00087 35	Docetaxel	Docetaxel 80 mg solución inyectable	Solución concentrada para infusión	Caja por frasco ampolla de solución inyectable concentrada (80mg de docetaxel anhidro) más frasco ampolla con diluyente (etanol/	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III y IV) con buen estado funcional.	Vigente	Glenmark Generics S.A.	19996
L01C D02	INVIM A 2009M - 00102 24	Docetaxel	Docetaxel 80 mg / 2 ml solución inyectable	Solución concentrada para infusión	Caja por un vial en vidrio tipo I de 20 ml de volumen con tapón en caucho y sello flip off aluminio conteniendo 2.0 ml de solución	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vigente	Venus Remedies Limited	20007
L01C D02	INVIM A 2010M - 00108 24	Docetaxel	Docetaxel Inyección Concentrate 80 mg	Solución concentrada para infusión	Caja con un vial de vidrio tipo I de 10 ml conteniendo 2 ml de solución	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de	Vigente	VHB Medi Sciences Limited	20012

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIMA 2010M - 00108 25	Docetaxel	Docetaxel Inyección Concentrado 20 mg	Solución concentrada para infusión	Caja con un vial de vidrio tipo I de 10 ml conteniendo 2 ml de solución	la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Cáncer de mama metastásico refractario a otros. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.	Vigente	VHB Medi Sciences Limited	20012
L01C D02	INVIMA 2010M - 00117 01	Docetaxel	Labdosa Plustaxano	Solución inyectable	Caja con 1 vial de vidrio tipo 1 de solución, conteniendo 0.5 ml de solución más 1 vial con diluyente	Cáncer de mama metastásico refractario a otros. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.	Vencido	Laboratorio Dosa S.A.	20020
L01C D02	INVIMA 2010M - 00117 01	Docetaxel	Labdosa Plustaxano	Solución inyectable	Caja con 50 vial de vidrio tipo 1 de solución, conteniendo 0.5 ml de solución más 50 vial con diluyente	Cáncer de mama metastásico refractario a otros. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.	Vencido	Laboratorio Dosa S.A.	20020

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIMA 2010M - 00117 01	Docetaxel	Labdosa Plustaxano	Solución inyectable	Caja con 100 vial de vidrio tipo 1 de solución, conteniendo 0.5 ml de solución más 100 vial con diluyente	Cáncer de mama metastásico refractario a otros. Tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer de seno metastásico y/o localmente avanzado. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecables (estado III y IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante. Tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.	Vencido	Laboratorio Dosa S.A.	20020
L01C D02	INVIMA 2011M - 00120 87	Docetaxel	Labdosa Plustaxano	Solución concentrada para infusión	1 frasco ampolla (vial de 2 ml) de vidrio borosilicato tipo I, incoloro, rotulado con un tapón de bromobutilo teflonad	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estado III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vencido	Laboratorio Dosa S.A.	20022
L01C D02	INVIMA 2011M - 00120 87	Docetaxel	Labdosa Plustaxano	Solución concentrada para infusión	50 frasco ampolla (vial de 2 ml) de vidrio borosilicato tipo I, incoloro, rotulado con un tapón de bromobutilo teflonad	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estado III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vencido	Laboratorio Dosa S.A.	20022

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIMA 2011M - 00120 87	Docetaxel	Labdosa Plustaxano	Solución concentrada para infusión	100 frasco ampolla (vial de 2 ml) de vidrio borosilicato tipo I, incoloro, rotulado con un tapón de bromobutilo teflonad	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vencido	Laboratorio Dosa S.A.	20022
L01C D02	INVIMA 2011M - 00120 80	Docetaxel	Docetaxel 80 mg / 8 ml	Solución concentrada para infusión	Caja x 1 vial de vidrio tipo I x 8 ml.	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vencido	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	20024
L01C D02	INVIMA 2011M - 00120 80	Docetaxel	Docetaxel 80 mg / 8 ml	Solución concentrada para infusión	Caja x 5 viales de vidrio tipo I x 8 ml	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y	Vencido	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	20024

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
						tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.			
L01C D02	INVIMA 2011M - 00120 80	Docetaxel	Docetaxel 80 mg / 8 ml	Solución concentrada para infusión	Caja x 10 viales de vidrio tipo I x 8 ml	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadío III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vencido	Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG	20024
L01C D02	INVIMA 2011M - 00121 12	Docetaxel	Docetaxel Ebewe 20 mg/2ml	Solución inyectable	Caja por 1 vial por 2 ml	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadío III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vencido	Ebewe Pharma	20028
L01C D02	INVIMA 2011M -	Docetaxel	Docetaxel Ebewe	Solución inyectable	Caja por 5 viales por 2 ml	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o	Vencido	Ebewe Pharma	20028

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
	0012112		20 mg/2ml			visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.			
L01C D02	INVIMA 2011M - 0012112	Docetaxel	Docetaxel Ebewe 20 mg/2ml	Solución inyectable	Caja por 10 viales por 2 ml	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vencido	Ebewe Pharma	20028
L01C D02	No reportada	Docetaxel	Docetaxel AMA 80 mg	Solución inyectable	Cada vial en vidrio tipo I con tapón de clorobutilo por 2 ml	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de segunda línea para sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA que están recibiendo terapia antiretroviral en los cuales ha fracasado la quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecable (estado III o IV), con buen estado funcional. tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.	Negado	AMA de Colombia comercializadora internacional ltda.	20038
L01C D02	INVIMA 2012M -	Docetaxel	Docetaxel 80 mg	Solución inyectable	Frasco ampolla en vidrio tipo I conteniendo docetaxel	Cáncer de mama metastásico refractario a otros tratamientos. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de segunda línea para sarcoma de Kaposi en pacientes con SIDA que están recibiendo terapia antiretroviral en los cuales ha	Vigente	Laboratorio internacional Argentino S.A.	20045

ATC INVIM A	Registro sanitario	Principio activo INVIM A	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
	0013828				80mg/2ml más 1 frasco ampolla con 6 ml de diluyente	fracasado la quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado, no resecable (estado III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos.			
L01C D02	INVIM A 2012M - 0013651	Docetaxel	Docetaxel 20 mg / 0.5 ml	Solución inyectable	Caja x 1 frasco ampolla cont. solución concentrada 20 mg/0.5 ml + 1 frasco ampolla cont 1.5 ml de s.disolvente	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastático. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vigente	Laboratorio internacional Argentino S.A.	20045
L01C D02	INVIM A 2012M - 0013516	Docetaxel	Docevia l 80 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un frasco vial con polvo liofilizado para reconstituir en vidrio incoloro tipo I + frasco vial de diluyente x 8 ml en vidrio incoloro tipo I.	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastático. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vigente	laboratorios Chalver de Colombia S.A.	20047
L01C D02	INVIM A 2012M	Docetaxel	Docevia l 20 mg	Polvo liofilizado para	Caja por un vial de vidrio incoloro tipo I con polvo	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastático. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario.	Vigente	laboratorios Chalver de Colombia S.A.	20047

ATC INVIM A	Registro sanitario	Principio activo INVIM A	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
	- 00135 92			reconstituir a solución inyectable	lío filizado para reconstituir, equivalente a 20 mg de docetaxel + diluyente	Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no reseccable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.			
L01C D02	INVIM A 2012M - 00138 97	Docetaxel	Docetaxel concentrado para inyección 80 mg / 2 ml	Solución concentrada para infusión	Combi pack: caja por 1 frasco vial tipo I por 2 ml con tapón de caucho y agrafe de aluminio y solvente : frasco vial tipo I por 6 ml con tapón de caucho y agrafe de aluminio	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no reseccable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. El producto en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vigente	Ropsohn therapeutics S.A.S	20049
L01C D02	INVIM A 2014M - 00150 24	Docetaxel	Docetaxel 20 mg / 0.5 ml	Solución inyectable	Caja por: 1 frasco vial en vidrio tipo I con tapón butilo gris y sello de aluminio flip off conteniendo concentrado + 1 frasco vial en vidrio tipo I con tapón bromobutilo gris y sello de	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no reseccable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo	Vigente	Ropsohn therapeutics S.A.S	20051

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
					aluminio flip off conteniendo 1.5 ml de solvente.	adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.			
L01C D02	INVIMA 2014M - 00149 57	Docetaxel	Taxespira 80 mg/ 8ml	Solución inyectable	Caja por 1 frasco vial de vidrio incoloro tipo I por 10 ml, cierre de clorobutilo y sello de aluminio con tapa flip-off	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Taxotere en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Pacientes con cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo.	Vigente	Hospira INC	20056
L01C D02	INVIMA 2013M - 00145 65	Docetaxel	Taxespira 20 mg/ 2ml	Solución inyectable	Caja por 1 frasco en vidrio transparente tipo I por 2ml	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vigente	Hospira INC	20056
L01C D02	INVIMA 2014M - 00148 57	Docetaxel	Dotaxel 20 mg/0,5 ml	Solución inyectable	Caja con frasco vial de vidrio tipo I transparente, tapón de caucho y agrafe de aluminio (sello	Tratamiento adyuvante en cáncer de mama: en combinación con doxorubicina y ciclofosfamida está indicado para el tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama operable con ganglio positivo, cáncer de mama operable con ganglio negativo (con uno o más factores de riesgo alto (eficacia clínica/estudios clínicos). Cáncer de mama metastásico: en combinación con doxorubicina está	Vigente	Procaps S.A.	20057

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
					flip off rojo) por 2 ml de docetaxel concentrado para inyección más un frasco vial de vidrio tipo I transparente, tapón de caucho y agrafe de aluminio (sello fli	<p>indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico que no recibieron previamente terapia citotóxica para esta enfermedad. Como monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la terapia citotóxica. La quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina o un agente alquilante. En combinación con capecitabina está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia citotóxica. La terapia previa debe haber incluido una antraciclina.</p> <p>Cáncer pulmonar de células no-pequeñas: en combinación con cisplatino está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas irresecables, localmente avanzado o metastásico, en los pacientes que no recibieron previamente quimioterapia para esta enfermedad. en combinación con carboplatino representa una opción de tratamiento para la terapia a base de cisplatino (léanse sobredosis y eficacia clínica/estudios clínicos). Está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico después del fracaso de la quimioterapia previa.</p> <p>Cáncer de ovario.</p> <p>Cáncer de próstata: en combinación con prednisona o prednisolona está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico independiente de andrógeno (refractario a hormonas).</p> <p>Adenocarcinoma gástrico: en combinación con cisplatino 5-fluorouracilo está indicado para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no recibieron quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.</p> <p>Cáncer de cabeza y cuello: en combinación con cisplatino 5-fluorouracilo está indicado para el tratamiento de inducción de pacientes con carcinoma escamocelular de cabeza y cuello localmente avanzado.</p>			
L01C D02	INVIMA 2013M - 00147 87	Docetaxel	Dotaxel 80 mg/2ml	Solución concentrada para infusión	Caja de cartón con frasco vial de vidrio transparente Tipo I, tapón de caucho y agrafe de aluminio	<p>Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de</p>	Vigente	Procaps S.A.	20057

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
					(sello flip off rojo) por 2 ml de docetaxel concentrado para inyección+ frasco vial de vidrio transparente tipo I, tapón de caucho y agrafe de aluminio (sello)	pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. En combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.			
L01C D02	No registrada	Docetaxel	Dovesta c 20 mg concentrado inyectable para solución para infusión	Solución concentrada para infusión	Caja con 1 vial por 0,5 ml que contiene 20 mg de docetaxel +1 vial por 1.8 ml de disolvente	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Negado	Glaxosmithkline Colombia S.A.	20062
L01C D02	INVIMA 2015M - 00158 10	Docetaxel	Docetaxel 20 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja plegadiza que contiene un vial de 6 ml de vidrio tipo I incoloro, cerrado con tapón de fluorotec y una cápsula de sellado de aluminio de tipo flip - off de color azul, el cual contiene 1 ml de solución	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo	Vigente	Fresenius Kabi Oncology Ltd	20064

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01C D02	INVIMA 2015M - 00157 63	Docetaxel	Docetaxel 80 mg/4ml	Solución concentrada para infusión	Caja x 1 frasco ampolla vidrio tipo I sellado aluminio de tipo flip-off color azul x 4 ml solución	adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5- fluorouracilo para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vigente	Fresenius Kabi Oncology Limited	20064
L01C D02	INVIMA 2015M - 00159 69	Docetaxel	Docetaxel 120mg/6ml solución concentrada para infusión	Solución concentrada para infusión	Caja por 1 vial de vidrio tipo I x 6 ml cerrado con tapón de flurotec y un sello de aluminio del tipo flip off de color azul que contiene 6 ml de solución concentrada para infusión.	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no resecable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Taxotere en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Vigente	Fresenius Kabi Oncology Limited	20064
L01C D02	INVIMA 2015M - 00156 41	Docetaxel	Docetaxel 160 mg/ 8 ml	Solución concentrada para infusión	Caja que contiene un vial de 10 ml de vidrio incoloro tipo I, cerrado con tapón de	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células	Vigente	Fresenius Kabi Oncology Ltd	20064

ATC INVIM A	Registro sanitario	Principio activo INVIM A	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
					flurotec y una cápsula de sellado de aluminio de tipo flip-off de color azul que contiene 8 ml de solución concentrada para infusión.	escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no reseccable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.			
L01C D02	INVIM A 2014M - 00153 56	Docetaxel	Docetaxel 80 mg	Solución inyectable	Caja con 1 frasco vial de vidrio tipo I transparente (14 ml de capacidad) con 2 ml de solución inyectable concentrada, tapón de goma gris, precinto de aluminio con flip-off; + 1 frasco vial de vidrio tipo I transparente (14 ml de capacidad) con 6 ml de sol	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastático. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no reseccable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. En combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada. Pacientes con cáncer de mama operable con ganglios negativos con uno o más factores de alto riesgo.	Vigente	Grupo Unipharm S.A. y/o laboratorios Uni S.A.	20067
L01C D02	INVIM A 2014M - 00155 21	Docetaxel	Lildocex 40 mg/ml (20 mg/0.5 ml)	Solución inyectable	Caja de cartón con frasco ampolla (vial), con tapón de goma y precinto de aluminio flip-off con 20 mg / 0,5 ml de docetaxel y frasco ampolla (vial) de vidrio tipo I, con tapón de goma y	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastático. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no reseccable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastático andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma	Pérdida Fuerza Ejecutoria	Eli Lilly and Company	20068

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
					precinto de aluminio-off con 1,8 ml de disolvente	de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.			
L01C D02	INVIMA 2014M - 00153 87	Docetaxel	Lildocex 40 mg/ml (80 mg/2 ml)	Solución concentrada para infusión	Caja con frasco ampolla (vial de vidrio tipo I de 10ml sellado con tapón de goma de 20mm y precinto de aluminio flip-off) de 80mg/2ml de Docetaxel y frasco ampolla con 7,1 ml de Diluyente para LILDOCEX.	Tratamiento de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Tratamiento de pacientes con cáncer de ovario. Tratamiento de pacientes con sarcoma de Kaposi diseminado y/o visceral asociado a SIDA, después del fracaso de quimioterapia previa. Tratamiento de pacientes con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, localmente avanzado, no reseccable (estadio III o IV), con buen estado funcional. Tratamiento de pacientes con cáncer de próstata metastásico andrógeno independiente y coadyuvante y tratamiento coadyuvante en pacientes con cáncer de mama operable con ganglios auxiliares positivos. Docetaxel en combinación con cisplatino y 5-FU para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma gástrico avanzado, incluyendo adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que no han recibido quimioterapia previa para la enfermedad avanzada.	Pérdida Fuerza Ejecutoria	Eli Lilly and Company	20068

Tabla 7. Registros sanitarios Epirubicina

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01DB03	M-00971	Epirubicina	Farmorubicina (epirubicina clorhidrato 50 mg.)	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable	Frasco vial x 50 mg	Coadyuvante en el tratamiento del carcinoma mamario	Vencido	Pharmacia S.P.A.	29447-1
L01DB03	INVIMA M-	Epirubicina	Farmorubicina (epirubicina)	Polvo estéril para reconstituir a	Frasco vial X 10 mg	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma mamario	Vencido	Pharmacia S.P.A.	29448-1

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
	009727-R1		clohidrato 10 mg)	solución inyectable					
No reporta	M-013984	Epirubicina	Farmorubicina RD 50 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	No reporta	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de mama, ovario, tiroides, gástrico y carcinoma transicional: sarcoma neuroblastoma, tumor de Wilms, leucemia linfoblástica aguda, linfomas, neoplasias malignas de pulmón y sangre.	Vencido	Haupt Pharma Latina S. R. L	38279-
L01DB03	INVIMA M-010230	Epirubicina	Farmorubicina CS 10mg/ 5 ml	Inyectables	Frasco de polipropileno x 5 ml	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoide, carcinomas cervificiales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vencido	Pharmacia & Upjohn S.P.A.	225449-1
L01DB03	INVIMA 2008M-010231-R1	Epirubicina	Farmorubicina solución inyectable 50 mg/ 25 ml.	Solución inyectable	Caja con 1 vial (frasco ampolla) en polipropileno contenido 25 ml de la solución inyectable. Tapa de aluminio con la solapa de plástico de la parte superior color púrpura sin impresión. (sellado externo)	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoide, carcinomas cervificiales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vigente	Pfizer S.A.S.	225451-1

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01DB03	INVIMA M-014650	Epirubicina	Epirubicina 10 mg inyectable	Medicamentos no estériles sólidos - polvos y granulados	Frasco ampolla en caja plegadiza	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma transicional: sarcoma, neuroblastoma, carcinoma de mama, ovario, tiroides y gástrico, tumor de Wilms, leucemia linfoblástica aguda, linfomas, neoplasmas malignos de pulmón y sangre.	Cancelado	Laboratorios Filaxis S.A.	19908198-1
No reporta	No reporta	Epirubicina	Epirubicina 50 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	No reporta	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiple y en carcinoma de mama, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Negado	Pharmmarketing	19908200-
L01DB03	INVIMA 2002M-0001224	Epirubicina	Epilem 10mg (Liofilizado para solución inyectable)	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con frasco ampolla de vidrio tipo I incoloro con tapón y sello de aluminio tipo flip off	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiple y en carcinoma de mama, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vencido	Lemery S.A. de C.V.	19924942-1
L01DB03	INVIMA 2002M-0001114	Epirubicina	Epilem liofilizado para solución inyectable 50 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartón con frasco ampolla de vidrio tipo I con tapón de hule de bromobutilo	Tratamiento de leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiple y en carcinoma de mama, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas,	Vencido	Lemery S.A. de C.V.	19924945-1

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
						recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.			
L01DB03	INVIMA 2012M-0001007-R1	Epirubicina	Epirubicina clorhidrato 2mg/1ml	Solución inyectable	Caja con un vial en vidrio transparente tipo I por 5 ml.	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiple y en carcinoma de mama, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vigente	Ebewe Pharma GES. M.B.H. NFG.K.G.	19926703-1
L01DB03	INVIMA 2012M-0001007-R1	Epirubicina	Epirubicina clorhidrato 2mg/1ml	Solución inyectable	Caja con un vial en vidrio transparente tipo I por 25 ml.	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiple y en carcinoma de mama, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vigente	Ebewe Pharma GES. M.B.H. NFG.K.G.	19926703-2

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01DB03	INVIMA 2012M-0001007-R1	Epirubicina	Epirubicina clorhidrato 2mg/1ml	Solución inyectable	Caja con un vial en vidrio transparente tipo I por 50 ml.	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiple y en carcinoma de mama, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vigente	Ebewe Pharma GES. M.B.H. NFG.K.G.	19926703-3
No reporta	No reporta	Epirubicina	Farmorubicina RD 50 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	No reporta	Indicado en el tratamiento de leucemias agudas, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, pancreas, recto sinmoidio, carcinomas cervifaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovarico.	Negado	Pharmacia & Upjohn Company	19934461-
L01DB03	INVIMA 2003M-0002548	Epirubicina	Farmorubicina 10 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartón con 1 vial + 1 ampolleta de diluyente.	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiple y en carcinoma de mama, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Cancelado	Pharmacia Interamerican Corporation	19935272-1

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01DB03	INVIMA 2005M-0004779	Epirubicina	Epilem RU Solución Inyectable	Solución inyectable	Frasco vial de 10 mg/5ml	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sinmoidio, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vencido	Lemery S.A. de C.V.	19956731-1
L01DB03	INVIMA 2005M-0004779	Epirubicina	Epilem RU Solución Inyectable	Solución inyectable	Frasco vial de 50mg/25ml	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sinmoidio, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vencido	Lemery S.A. de C.V.	19956731-2
No reporta	No registra	Epirubicina	Epirubicina 10 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	No reporta	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiple y en carcinoma de mama, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Negado	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19961320-
No reporta	No registra	Epirubicina	Epirubicina 50 mg polvo liofilizado para reconstituir a 25 ml de solución inyectable.	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	No reporta	Tratamiento de leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiple y en carcinoma de mama, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas	Negado	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19961321-

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
						cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.			
L01DB03	INVIMA 2007M-0006939	Epirubicina	Epirubicina	Inyectables	Frasco vial de vidrio ambar tipo I por 25 ml.	Tratamiento de leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiple y en carcinoma de mama, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	En trámite de renovación	Fresenius Kabi Oncology Ltd.	19973149-1
L01DB03	INVIMA 2010M-0011246	Epirubicina	Epirubicin hydrochloride for injection	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1 vial de vidrio tipo I con liofilizado para reconstituir	Tratamiento de leucemias agudas, linfomas, mieloma múltiple y en carcinoma de mama, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vencido	VHB Medi Sciences Limited	20014047-1
L01DB03	INVIMA 2015M-0015693	Epirubicina	Epirubicina clorhidrato 2 mg / ml solución inyectable	Solución inyectable	Caja plegadiza con un vial de vidrio tipo I x25 ml, tapón clorobutilo, sello aluminio y flip - off.	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoidio, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vigente	HB Human Bioscience S.A.S	20062983-1
L01DB03	INVIMA 2014M-0014992	Epirubicina	Epirubicina 50 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 frasco ampolla (vial) en vidrio tipo I incoloro con tapón elastomérico de	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20063700-1

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
L01DB03	INVIMA 2014M-0014992	Epirubicina	Epirubicina 50 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 50 frascos ampolla (viales) en vidrio tipo I incoloro con tapón elastomérico de bromobutilo y precinto flip-off color blanco.	sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20063700-2
L01DB03	INVIMA 2014M-0014992	Epirubicina	Epirubicina 50 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 100 frascos ampolla (viales) en vidrio tipo I incoloro con tapón elastomérico de bromobutilo y precinto flip-off color blanco.	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20063700-3
L01DB03	INVIMA 2014M-0014994	Epirubicina	Epirubicina 10 mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 frascos ampollas en vidrio tipo I	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20063701-1
L01DB03	INVIMA 2014M-0014994	Epirubicina	Epirubicina 10 mg polvo liofilizado para reconstituir a	Polvo liofilizado para reconstituir a	Caja por 50 frascos ampollas en vidrio tipo I	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20063701-2

Evidencia que promueve Confianza

ATC INVIMA	Registro sanitario	Principio activo INVIMA	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro sanitario	Titular del registro sanitario	CUM
			solución inyectable	solución inyectable		hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.			
L01DB03	INVIMA 2014M-0014994	Epirubicina	Epirubicina 10 mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 100 frascos ampollas en vidrio tipo I	En el tratamiento de leucemias agudas, linfomas malignos, sarcomas de partes blandas, carcinoma gástrico, carcinoma del hígado, páncreas, recto sigmoideo, carcinomas cervicofaciales, carcinoma pulmonar, carcinoma ovárico.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20063701-3

Tabla 8. Registros sanitarios Filgrastim

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L03AA02	INVIMA 2014M-014202-R1	Filgrastim adnr (factor metioil recombinante estimulador de las colonias de granulocitos humanos (r-methug-csf) obtenido en e.coli k12)	Neupogen solución inyectable 300mcg/ 1 ml	Solucion inyectable	Caja con 5 frascos ampollas en vidrio conteniendo 1ml de la solución c/u	Neupogen está indicado para reducir la duración de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados con quimioterapia citotóxica convencional con enfermedades malignas (con la excepción de leucemia mielode crónica y síndromes mielodisplásicos) y en la reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea y que se considere presenten un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. Neupogen está indicado para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas en	Vigente	Amgen manufacturing limited	46041-1

Evidencia que promueve Confianza

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>sangre periférica.</p> <p>En pacientes, tanto niños como adultos, con neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática con una cuenta absoluta de neutrófilos (can) = $0,5 \times 10^9/l$, y antecedentes de infecciones graves o recurrentes, la administración prolongada de neupogen está indicada para aumentar la cuenta de neutrófilos y reducir la incidencia y duración de episodios infecciosos.</p> <p>Neupogen está indicado para el tratamiento de la neutropenia persistente (can igual o inferior a $1,0 \times 10^9/l$) en pacientes con infección avanzada por el vih, para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones para tratar la neutropenia no sean adecuadas.</p>			

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L03AA02	INVIMA 2014M-014202-R1	Filgrastim adnr (factor metioil recombinante estimulador de las colonias de granulocitos humanos (r-methug-csf) obtenido en e.coli k12)	Neupogen solución inyectable 300mcg/ 1 ml	Solucion inyectable	Caja con 1 frasco ampolla en vidrio conteniendo 1ml de la solución	<p>Neupogen está indicado para reducir la duración de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados con quimioterapia citotóxica convencional con enfermedades malignas (con la excepción de leucemia mieloide crónica y síndromes mielodisplásicos) y en la reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea y que se considere presenten un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada.</p> <p>Neupogen está indicado para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas en sangre periférica.</p> <p>En pacientes, tanto niños como adultos, con neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática con una cuenta absoluta de neutrófilos (can) = 0,5 x 10⁹/l, y antecedentes de infecciones graves o recurrentes, la administración prolongada de neupogen está indicada para aumentar la cuenta de neutrófilos y reducir la incidencia y duración de episodios infecciosos.</p> <p>Neupogen está indicado para el tratamiento de la neutropenia persistente (can igual o inferior a 1,0 x10⁹/l) en pacientes con infección avanzada por el vih, para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones para tratar la neutropenia no sean adecuadas</p>	Vigente	Amgen manufacturing limited	46041-2
L03AA02	INVIMA 2008M-007141 -R1	Filgrastim	Biofigran 300 mcg	Solucion inyectable	Caja por 5 viales en vidrio tipo i con tapon de goma y cierre flip - off conteniendo 1 ml de solución	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mieloide, en pacientes neutropénicos con anti hiv y en tratamiento de trasplante de médula osea. Agranulosis congenita severa.	Vigente	Bayer health care ag	214314-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L03AA02	INVIMA 2008M-007141 -R1	Filgrastim	Biofigran 300 mcg	Solucion inyectable	Caja por 4 viales en vidrio tipo i con tapon de goma y cierre flip - off conteniendo 1 ml de solucion	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mieloide, en pacientes neutropénicos con anti hiv y en tratamiento de trasplante de médula osea. Agranulosis congenita severa.	Vigente	Biosidus s.a.(fabricante del activo)	214314-2
L03AA02	INVIMA 2008M-007142-R1	Filgrastim	Biofigran 480 mcg	Solucion inyectable	Caja por 5 viales de 1,6 ml.	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mieloide, en pacientes neutropénicos con anti hiv y en tratamiento de trasplante de médula osea. Agranulosis congenita severa.	Vigente	Biosidus s.a.(fabricante del activo)	214316-1
L03AA02	INVIMA 2008M-007142-R1	Filgrastim	Biofigran 480 mcg	Solucion inyectable	Caja por 4 viales de 1,6 ml.	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mieloide, en pacientes neutropénicos con anti hiv y en tratamiento de trasplante de médula osea. Agranulosis congenita severa.	Vigente	Productora de capsulas de gelatina s. A. "procaps s. A."	214316-2
L03AA02	INVIMA 2016M-014489-R2	Filgrastim (millones de unidades) equivalente a 300 µg	Neupogen® solucion inyectable 30 mu / 0,5 ml	Solucion inyectable	Caja por 1 jeringa prellenada con 0,5ml de solución inyectable. Jeringa de vidrio tipo i, tapón interno de caucho butila	Neupogen® está indicado para reducir la duración de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados con quimioterapia citotóxica convencional con enfermedades malignas (con la excepción de leucemia mieloide crónica y síndromes mielodisplásicos) y en la reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablatoivo seguido de trasplante de médula ósea y que se considere presenten un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. Neupogen® está indicado para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas en sangre periférica. En pacientes, tanto niños como adultos, con neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática con una cuenta absoluta de neutrófilos (can) ? 0,5 x 10 ⁹ /l, y antecedentes de infecciones graves o recurrentes, la administración prolongada de neupogen® está indicada para aumentar la cuenta de neutrófilos y reducir la incidencia y duración de episodios infecciosos. Neupogen® está indicado para el tratamiento de la neutropenia persistente (can igual o inferior a 1,0 x 10 ⁹ /l) en pacientes con	Vigente	Productora de capsulas de gelatina s. A. "procaps s. A."	19906434-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						infección avanzada por el vih, para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones para tratar la neutropenia no sean adecuadas.			
L03AA02	INVIMA 2016M-014489-R2	Filgrastim (millones de unidades) equivalente a 300 µg	Neupogen® solución inyectable 30 µg / 0,5 ml	Solución inyectable	Caja por 5 jeringas prellenadas con 0,5ml de solución inyectable. Jeringa de vidrio tipo i, tapón interno de caucho butila	Neupogen® está indicado para reducir la duración de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados con quimioterapia citotóxica convencional con enfermedades malignas (con la excepción de leucemia mieloide crónica y síndromes mielodisplásicos) y en la reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea y que se considere presenten un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. Neupogen® está indicado para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas en sangre periférica. En pacientes, tanto niños como adultos, con neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática con una cuenta absoluta de neutrófilos (can) $\geq 0,5 \times 10^9/l$, y antecedentes de infecciones graves o recurrentes, la administración prolongada de neupogen® está indicada para aumentar la cuenta de neutrófilos y reducir la incidencia y duración de episodios infecciosos. Neupogen® está indicado para el tratamiento de la neutropenia persistente (can igual o inferior a $1,0 \times 10^9/l$) en pacientes con infección avanzada por el vih, para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones para tratar la neutropenia no sean adecuadas.	Vigente	Amgen manufacturing limited	19906434-2
L03AA02	INVIMA 2016M-014489-R2	Filgrastim (millones de unidades) equivalente a 300 µg	Neupogen® solución inyectable 30 µg / 0,5 ml	Solución inyectable	Caja por 1 bandeja conteniendo una jeringa prellenada con 0.5 ml de solución inyectable. Jeringa de vidrio incoloro tipo i, con aguja de acero	Neupogen® está indicado para reducir la duración de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados con quimioterapia citotóxica convencional con enfermedades malignas (con la excepción de leucemia mieloide crónica y síndromes mielodisplásicos) y en la reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea y que se	Vigente	Amgen manufacturing limited	19906434-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					inoxidable y tapón interno de caucho de butilo gris, con o sin protector manual de aguja.	considerare presenten un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. Neupogen® está indicado para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas en sangre periférica. En pacientes, tanto niños como adultos, con neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática con una cuenta absoluta de neutrófilos (can) ? 0,5 x 10 ⁹ /l, y antecedentes de infecciones graves o recurrentes, la administración prolongada de neupogen® está indicada para aumentar la cuenta de neutrófilos y reducir la incidencia y duración de episodios infecciosos. Neupogen® está indicado para el tratamiento de la neutropenia persistente (can igual o inferior a 1,0 x 10 ⁹ /l) en pacientes con infección avanzada por el vih, para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones para tratar la neutropenia no sean adecuadas.			
L03AA02	INVIMA 2016M-014489-R2	Filgrastim (millones de unidades) equivalente a 300 µg	Neupogen® solución inyectable 30 µg / 0,5 ml	Solución inyectable	Caja por 4 bandejas, cada una conteniendo una jeringa prellenada con 0.5 ml de solución inyectable. Jeringa de vidrio incoloro tipo i, con aguja de acero inoxidable y tapón interno de caucho de butilo gris, con o sin protector manual de aguja.	Neupogen® está indicado para reducir la duración de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados con quimioterapia citotóxica convencional con enfermedades malignas (con la excepción de leucemia mieloide crónica y síndromes mielodisplásicos) y en la reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea y que se considere presenten un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. Neupogen® está indicado para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas en sangre periférica. En pacientes, tanto niños como adultos, con neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática con una cuenta absoluta de neutrófilos (can) ? 0,5 x 10 ⁹ /l, y antecedentes de infecciones graves o recurrentes, la administración prolongada de neupogen® está indicada para aumentar la cuenta de neutrófilos y reducir la incidencia y duración de episodios infecciosos. Neupogen® está indicado para el tratamiento	Vigente	Amgen manufacturing limited	19906434-4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						de la neutropenia persistente (can igual o inferior a 1,0 x 10 ⁹ /l) en pacientes con infección avanzada por el vih, para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones para tratar la neutropenia no sean adecuadas.			
L03AA02	INVIMA 2016M-014489-R2	Filgrastim (millones de unidades) equivalente a 300 µg	Neupogen® solución inyectable 30 µg / 0,5 ml	Solución inyectable	Muestra médica: caja por 1 bandeja, conteniendo una jeringa prellenada con 0,5 ml de solución inyectable. Jeringa de vidrio incoloro tipo i, con aguja de acero inoxidable y tapón interno de caucho de butilo gris, con o sin protector manual de aguja.	Neupogen® está indicado para reducir la duración de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril en pacientes tratados con quimioterapia citotóxica convencional con enfermedades malignas (con la excepción de leucemia mieloide crónica y síndromes mielodisplásicos) y en la reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea y que se considere presenten un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. Neupogen® está indicado para la movilización de células progenitoras hematopoyéticas en sangre periférica. En pacientes, tanto niños como adultos, con neutropenia congénita grave, cíclica o idiopática con una cuenta absoluta de neutrófilos (can) $? 0,5 \times 10^9/l$, y antecedentes de infecciones graves o recurrentes, la administración prolongada de neupogen® está indicada para aumentar la cuenta de neutrófilos y reducir la incidencia y duración de episodios infecciosos. Neupogen® está indicado para el tratamiento de la neutropenia persistente (can igual o inferior a 1,0 x 10 ⁹ /l) en pacientes con infección avanzada por el vih, para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones para tratar la neutropenia no sean adecuadas.	Vigente	Amgen manufacturing limited	19906434-5
L03AA02	INVIMA 2013M-0001780-R1	Filgrastim recombinante (célula huésped: e. Coli k-12 w3110, vector: pcsf 451)	Leucosos® inyectable 300mcg	Solución inyectable	Caja por 1 frasco vial de 1. 2 ml en vidrio transparente tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia mielosupresiva para lipomas malignos, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de testículo o neuroblastoma. coadyuvante en el tratamiento de pacientes con trasplante de médula ósea.	Vigente	Amgen manufacturing limited	19925897-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						(según acta 3/2008 de 26,27 y 28 de marzo numeral 2.17.2 de comisión revisora)."			
L03AA02	INVIMA 2013M-0001780-R1	Filgrastim recombinante (celula huesped: e. Coli k-12 w3110, vector: pcsf 451)	Leucosos® inyectable 300mcg	Solucion inyectable	Caja por 10 frascos viales de 1.2 ml en vidrio tipo i transparente	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia mielosupresiva para lipomas malignos, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de testículo o neuroblastoma. coadyuvante en el tratamiento de pacientes con trasplante de medula ósea. (según acta 3/2008 de 26,27 y 28 de marzo numeral 2.17.2 de comisión revisora)."	Vigente	Dong-a st co., ltda.	19925897-2
L03AA02	INVIMA 2008M-0008901	Filgrastim (factor estimulador de colonias de granulocitos, g-csf (30 mui)).....	Hebervital 0.3 mg	Solucion inyectable	Caja de cartón por 1 viales incoloros tipo i (bulbos) de 1 ml	Tratamiento de la neutropenia congénita severa, tratamiento de la neutropenia congénita severa crónica cíclica o neutropenia idiopática, reducción de la neutropenia posterior al trasplante de médula ósea autólogo o alogénico en pacientes con procesos malignos no mieloides, profilaxis primaria y secundaria de la neutropenia inducida por quimioterapia mielosupresiva en regimenes de tratamiento con una incidencia esperada de neutropenia febril mayor o igual al 40% o con factores de riesgo, profilaxis primaria para neutropenia febril y reducción del tiempo de la recuperación de neutrófilos y duración de la fiebre posterior a la inducción o consolidación de la quimioterapia para leucemia mieloide aguda para la movilización de células madre sanguíneas previo y durante la leucoforesis en pacientes en preparación para ablación de médula ósea.	Vigente	Dong-a st co., ltda.	19993558-1
L03AA02	INVIMA 2008M-0008901	Filgrastim (factor estimulador de colonias de granulocitos, g-csf (30 mui)).....	Hebervital 0.3 mg	Solucion inyectable	Caja de cartón por 5 viales incoloros tipo i (bulbos) de 1 ml	Tratamiento de la neutropenia congénita severa, tratamiento de la neutropenia congénita severa crónica cíclica o neutropenia idiopática, reducción de la neutropenia posterior al trasplante de médula ósea autólogo o alogénico en pacientes con procesos malignos no mieloides, profilaxis primaria y secundaria de la neutropenia inducida por quimioterapia mielosupresiva en regimenes de tratamiento con una incidencia esperada de neutropenia febril mayor o igual al	Vigente	Dong-a st co., ltda.	19993558-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						40% o con factores de riesgo, profilaxis primaria para neutropenia febril y reducción del tiempo de la recuperación de neutrófilos y duración de la fiebre posterior a la inducción o consolidación de la quimioterapia para leucemia mieloide aguda para la movilización de células madre sanguíneas previo y durante la leucoforesis en pacientes en preparación para ablación de médula ósea.			
L03AA02	INVIMA 2008M-0008901	Filgrastim (factor estimulador de colonias de granulocitos, g-csf (30 mui)).....	Hebervital 0.3 mg	Solucion inyectable	Caja de cartón por 10 viales incoloros tipo i (bulbos) de 1 ml	Tratamiento de la neutropenia congénita severa, tratamiento de la neutropenia congénita severa crónica cíclica o neutropenia idiopática, reducción de la neutropenia posterior al transplante de médula ósea autólogo o alogénico en pacientes con procesos malignos no mieloides, profilaxis primaria y secundaria de la neutropenia inducida por quimioterapia mielosupresiva en regímenes de tratamiento con una incidencia esperada de neutropenia febril mayor o igual al 40% o con factores de riesgo, profilaxis primaria para neutropenia febril y reducción del tiempo de la recuperación de neutrófilos y duración de la fiebre posterior a la inducción o consolidación de la quimioterapia para leucemia mieloide aguda para la movilización de células madre sanguíneas previo y durante la leucoforesis en pacientes en preparación para ablación de médula ósea.	Vigente	Dong-a st co., ltda.	19993558-3
L03AA02	INVIMA 2009M-0009702	Filgrastim	Filgrastim 300 mcg/ml solución inyectable	Solucion inyectable	Caja con 1 jeringa prellenada de vidrio neutro tipo i con tapón de halobutilo con 1ml solución iny con capacidad de 2.25ml + 1 a	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mieloide. Y en transplante de médula ósea. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.	Vigente	Cimab s.a.	20002046-1
L03AA02	INVIMA 2009M-0009702	Filgrastim	Filgrastim 300 mcg/ml solución inyectable	Solucion inyectable	Caja de cartulina por 1 jeringa prellenada (con capacidad de	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mieloide. Y en transplante de médula ósea. Movilización	Vigente	Laboratorios lemercy s.a. De c.v.	20002046-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					2.25ml vidrio tipo i) por 1 ml + aguja hip	autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.			
L03AA02	INVIMA 2009M-0009702	Filgrastim	Filgrastim 300 mcg/ml solución inyectable	Solucion inyectable	Caja con 1 jeringa prellenada de vidrio neutro tipo i con tapon de halobutilo con 1ml solución iny con capacidad de 1 ml + aguja	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mielóide. Y en trasplante de médula ósea. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.	Vigente	Laboratorios lemyer s.a. De c.v.	20002046-3
L03AA02	INVIMA 2009M-0009702	Filgrastim	Filgrastim 300 mcg/ml solución inyectable	Solucion inyectable	Caja de cartulna por 10 jeringa prellenada (con capacidad de 2.25ml vidrio tipo i) por 1 ml + aguja hip	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mielóide. Y en trasplante de médula ósea. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.	Vigente	Heber biotec s.a.	20002046-4
L03AA02	INVIMA 2009M-0009702	Filgrastim	Filgrastim 300 mcg/ml solución inyectable	Solucion inyectable	Caja de cartulna por 20 jeringa prellenada (con capacidad de 2.25ml vidrio tipo i) por 1 ml + aguja hip	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mielóide. Y en trasplante de médula ósea. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.	Vigente	Heber biotec s.a.	20002046-5
L03AA02	INVIMA 2009M-0009702	Filgrastim	Filgrastim 300 mcg/ml solución inyectable	Solucion inyectable	Caja de cartulna por 30 jeringa prellenada (con capacidad de 2.25ml vidrio tipo i) por 1 ml + aguja hip	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mielóide. Y en trasplante de médula ósea. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.	Vigente	Heber biotec s.a.	20002046-6
L03AA02	INVIMA 2009M-0009702	Filgrastim	Filgrastim 300 mcg/ml solución inyectable	Solucion inyectable	Caja de cartulna por 50 jeringa prellenada (con capacidad de 2.25ml vidrio tipo i) por 1 ml + aguja hip	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mielóide. Y en trasplante de médula ósea. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.	Vigente	Scandinavia pharma ltda.	20002046-7
L03AA02	INVIMA 2009M-0009702	Filgrastim	Filgrastim 300 mcg/ml solución inyectable	Solucion inyectable	Caja de cartulna por 60 jeringa prellenada (con capacidad de	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mielóide. Y en trasplante de médula ósea. Movilización	Vigente	Scandinavia pharma ltda.	20002046-8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					2.25ml vidrio tipo i) por 1 ml + aguja hip	autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.			
L03AA02	INVIMA 2009M-0009702	Filgrastim	Filgrastim 300 mcg/ml solución inyectable	Solución inyectable	Caja de cartulna 100 jeringa prellenada (con capacidad de 2.25ml vidrio tipo i) por 1 ml + aguja hip	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mielóide. Y en trasplante de médula ósea. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.	Vigente	Scandinavia pharma ltda.	20002046-9
L03AA02	INVIMA 2009M-0009702	Filgrastim	Filgrastim 300 mcg/ml solución inyectable	Solución inyectable	Caja con 1 jeringa prellenada de vidrio neutro tipo i con tapon de halobutilo con 1ml solución iny con capacidad de 1ml + aguja	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mielóide. Y en trasplante de médula ósea. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.	Vigente	Scandinavia pharma ltda.	20002046-10
L03AA02	INVIMA 2017M-0011873-R1	Filgrastim recombinante	Zarzio® 30 mu/0,5 ml solución inyectable o para perfusión en jeringa precargada	Solución inyectable	Caja x 1 jeringa prellenada en vidrio+ aguja fija con protector de seguridad	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mielóide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloblástico seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica. Movilización de las células progenitoras de sangre periférica (pbpc) en niños adultos con neutropenia congénita grave, clínica o idiopática con recuento absoluto de neutrófilos (ran) a $0.5 \times 10^9 / l$ y una historia de infecciones graves o recurrentes. La administración a largo plazo de filgrastim esta indicada para aumentar el recuento de neutrófilos y reducir la incidencia y la duración de los acontecimientos relacionados con las infecciones. Tratamiento de la neutropenia persistente (ran $< 1.0 \times 10^9 / l$) en pacientes con infección avanzada	Vigente	Scandinavia pharma ltda.	20022442-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						por vih para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones de tratamiento no sean adecuadas.			
L03AA02	INVIMA 2017M-0011873-R1	Filgrastim recombinante	Zarzio® 30 mu/0,5 ml solucion inyectable o para perfusion en jeringa precargada	Solucion inyectable	Caja x 3 jeringas prellenadas en vidrio + aguja fija con protector de seguridad	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloblástico seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica. Movilización de las células progenitoras de sangre periférica (pbpc) en niños adultos con neutropenia congénita grave, clínica o idiopática con recuento absoluto de neutrófilos (ran) a $0.5 \times 10^9 / l$ y una historia de infecciones graves o recurrentes. La administración a largo plazo de filgrastim esta indicada para aumentar el recuento de neutrófilos y reducir la incidencia y la duración de los acontecimientos relacionados con las infecciones. Tratamiento de la neutropenia persistente ($ran < 1.0 \times 10^9 / l$) en pacientes con infección avanzada por vih para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones de tratamiento no sean adecuadas.	Vigente	Scandinavia pharma ltda.	20022442-2
L03AA02	INVIMA 2017M-0011873-R1	Filgrastim recombinante	Zarzio® 30 mu/0,5 ml solucion inyectable o para perfusion en jeringa precargada	Solucion inyectable	Caja x 5 jeringas prellenadas en vidrio + aguja fija con protector de seguridad	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloblástico seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son	Vigente	Scandinavia pharma ltda.	20022442-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica. Movilización de las células progenitoras de sangre periférica (pbpc) en niños adultos con neutropenia congénita grave, clínica o idiopática con recuento absoluto de neutrófilos (ran) a $0.5 \times 10^9 / l$ y una historia de infecciones graves o recurrentes. La administración a largo plazo de filgrastim esta indicada para aumentar el recuento de neutrófilos y reducir la incidencia y la duración de los acontecimientos relacionados con las infecciones. Tratamiento de la neutropenia persistente (ran $< 1.0 \times 10^9 / l$) en pacientes con infección avanzada por vih para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones de tratamiento no sean adecuadas.			
L03AA02	INVIMA 2017M-0011873-R1	Filgrastim recombinante	Zarzio® 30 mu/0,5 ml solución inyectable o para perfusión en jeringa precargada	Solución inyectable	Caja x 10 jeringas prellenadas en vidrio + aguja fija con protector de seguridad	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloblástico seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica. Movilización de las células progenitoras de sangre periférica (pbpc) en niños adultos con neutropenia congénita grave, clínica o idiopática con recuento absoluto de neutrófilos (ran) a $0.5 \times 10^9 / l$ y una historia de infecciones graves o recurrentes. La administración a largo plazo de filgrastim esta indicada para aumentar el recuento de neutrófilos y reducir la incidencia y la duración de los acontecimientos relacionados con las infecciones. Tratamiento de la neutropenia persistente (ran $< 1.0 \times 10^9 / l$) en pacientes con infección avanzada por vih para reducir el riesgo de desarrollar	Vigente	Scandinavia pharma ltda.	20022442-4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						infecciones bacterianas cuando otras opciones de tratamiento no sean adecuadas.			
L03AA02	INVIMA 2017M-0011873-R1	Filgrastim recombinante	Zarzio® 30 mu/0,5 ml solucion inyectable o para perfusion en jeringa precargada	Solucion inyectable	Muestra médica: caja x 1 jeringa prellenada en vidrio+ aguja fija con protector de seguridad+ tapon bromobutilo	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloblástico seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica. Movilización de las células progenitoras de sangre periférica (pbpc) en niños adultos con neutropenia congénita grave, clínica o idiopática con recuento absoluto de neutrófilos (ran) a $0.5 \times 10^9 / l$ y una historia de infecciones graves o recurrentes. La administración a largo plazo de filgrastim esta indicada para aumentar el recuento de neutrófilos y reducir la incidencia y la duración de los acontecimientos relacionados con las infecciones. Tratamiento de la neutropenia persistente ($ran < 1.0 \times 10^9 / l$) en pacientes con infección avanzada por vih para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones de tratamiento no sean adecuadas.	Vigente	Scandinavia pharma ltda.	20022442-5
L03AA02	INVIMA 2017M-0011873-R1	Filgrastim recombinante	Zarzio® 30 mu/0,5 ml solucion inyectable o para perfusion en jeringa precargada	Solucion inyectable	Muestra médica: caja x 3 jeringa prellenada en vidrio+ aguja fija con protector d	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloblástico seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son	Vigente	Scandinavia pharma ltda.	20022442-6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica. Movilización de las células progenitoras de sangre periférica (pbpc) en niños adultos con neutropenia congénita grave, clínica o idiopática con recuento absoluto de neutrófilos (ran) a $0.5 \times 10^9 / l$ y una historia de infecciones graves o recurrentes. La administración a largo plazo de filgrastim esta indicada para aumentar el recuento de neutrófilos y reducir la incidencia y la duración de los acontecimientos relacionados con las infecciones. Tratamiento de la neutropenia persistente (ran $< 1.0 \times 10^9 / l$) en pacientes con infección avanzada por vih para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones de tratamiento no sean adecuadas.			
L03AA02	INVIMA 2017M-0011873-R1	Filgrastim recombinante	Zarzio® 30 mu/0,5 ml solución inyectable o para perfusión en jeringa precargada	Solución inyectable	Muestra médica: caja x 5 jeringa prellenada en vidrio+ aguja fija con protector d	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloblástico seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica. Movilización de las células progenitoras de sangre periférica (pbpc) en niños adultos con neutropenia congénita grave, clínica o idiopática con recuento absoluto de neutrófilos (ran) a $0.5 \times 10^9 / l$ y una historia de infecciones graves o recurrentes. La administración a largo plazo de filgrastim esta indicada para aumentar el recuento de neutrófilos y reducir la incidencia y la duración de los acontecimientos relacionados con las infecciones. Tratamiento de la neutropenia persistente (ran $< 1.0 \times 10^9 / l$) en pacientes con infección avanzada por vih para reducir el riesgo de desarrollar	Vigente	Laboratorio franco colombiano lafrancol s.a.s.	20022442-7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						infecciones bacterianas cuando otras opciones de tratamiento no sean adecuadas.			
L03AA02	INVIMA 2017M-0011873-R1	Filgrastim recombinante	Zarzio® 30 mu/0,5 ml solución inyectable o para perfusión en jeringa precargada	Solución inyectable	Muestra médica: caja x 10 jeringa prellenada en vidrio+ aguja fija con protector d	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloblástico seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica. Movilización de las células progenitoras de sangre periférica (pbpc) en niños adultos con neutropenia congénita grave, clínica o idiopática con recuento absoluto de neutrófilos (ran) a $0.5 \times 10^9 / l$ y una historia de infecciones graves o recurrentes. La administración a largo plazo de filgrastim esta indicada para aumentar el recuento de neutrófilos y reducir la incidencia y la duración de los acontecimientos relacionados con las infecciones. Tratamiento de la neutropenia persistente (ran $< 1.0 \times 10^9 / l$) en pacientes con infección avanzada por vih para reducir el riesgo de desarrollar infecciones bacterianas cuando otras opciones de tratamiento no sean adecuadas.	Vigente	Laboratorio franco colombiano lafrancol s.a.s.	20022442-8
L03AA02	INVIMA 2014M-0015366	Filgrastim (factor estimulante de colonias de granulocitos humano recombinante)	Genfilgras solución inyectable 300 mcg/ml	Solución inyectable	Caja con una jeringa de vidrio tipo i incoloro, aguja de acero inoxidable, protector de aguja (interior de goma y exterior de pp) prellenada con 1 ml de solución inyectable.	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia, en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica en leucemias agudas, también en neutropenias inducidas por quimioterapia antineoplásica no mieloide. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.	Vigente	Sandoz gmbh	20062343-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L03AA02	INVIMA 2015M-0015624	Filgrastim (factor recombinante estimulante de colonias granulocíticas humanas g-cgf) 300 mcg/0,5 ml.	Valgrastim® 300 mcg	Solucion inyectable	Caja con 1 jeringa prellenada por 0,5 ml cilindro de vidrio tipo i transparente graduado para aguja calibre 27 ½ , tapón del embolo en goma de bromobutilo recubierta con resina diakyo y vástago del embolo en polipropileno color natural.	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mieloides, en pacientes neutropénicos con anti hiv y en tratamiento de trasplante de médula ósea. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica. Pacientes con neutropenia crónica severa.	Vigente	Sandoz gmbh	20062980-1
L03AA02	INVIMA 2015M-0016668	Factor estimulante de colonias de granulocitos rh / filgrastim	Nufil safe	Solucion inyectable	Caja de cartón con jeringas prellenadas de vidrio (usp tipo 1) con agujas de 1 ml de largo con calibre 27 de 14 pulgada con protector de aguja rígido con inserto	En pacientes con cáncer que reciben quimioterapia mielosupresora, rh-g-csf está indicado para reducir la incidencia de la infección manifestada por neutropenia febril, en pacientes con tumores no mieloides maléficos que reciben fármacos mielosupresores contra el cáncer asociado con una significativa incidencia de neutropenia febril grave. En los pacientes con leucemia mieloides aguda, que reciben quimioterapia de inducción o consolidación; el rh-g-csf está indicado para reducir el tiempo de recuperación de neutrófilos y la duración de la fiebre, después de la inducción o consolidación del tratamiento de quimioterapia de los adultos con lma. Pacientes con cáncer que reciben trasplante de médula ósea; el rh-g-csf está indicado para reducir la duración de la neutropenia y la neutropenia relacionada con secuelas clínicas, e.g. Neutropenia febril en pacientes con tumores no mieloides tratados con	Vigente	Sandoz gmbh	20074127-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>quimioterapia mieloide seguida por trasplante de médula.</p> <p>Los pacientes sometidos a recolección y terapia de células madre de sangre periférica, el rh-g-csf es indicado para la movilización de células madre hematopoyéticas en la sangre periférica para su recolección mediante leucoferesis. La movilización permite la recolección de números incrementados de células madres capaces de injerto con colección por leucoféresis, sin movilización o sin recolección de la médula ósea.</p> <p>En los pacientes con neutropenia crónica grave, el rh-g-csf está indicado para la administración crónica para reducir la incidencia y la duración de las secuelas de la neutropenia (e.g. fiebre, infecciones, úlceras orofaríngeas) en pacientes sintomáticos con neutropenia congénita, neutropenia cíclica o neutropenia idiopática.</p>			
L03AA02	INVIMA 2010M-0010495	Factor estimulante de colonias de granulocito recombinante humano (filgrastim)	Genfilgras 300 mcg inyectable	Solucion inyectable	Caja x 1 jeringa prellenada	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mieloide y en trasplante de médula ósea. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.	Perdida fuerza ejec	Sandoz gmbh	20008896-1
L03AA02	INVIMA 2010M-0010495	Factor estimulante de colonias de granulocito recombinante humano (filgrastim)	Genfilgras 300 mcg inyectable	Solucion inyectable	Caja x 5 jeringas prellenada	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mieloide y en trasplante de médula ósea. Movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica.	Perdida fuerza ejec	Sandoz gmbh	20008896-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L03AA02	INVIMA 2007M-0007145	Filgrastim	Inmunef 30 ui solución inyectable	Solución inyectable	Caja de cartón con 1 jeringa de vidrio tipo i prellenada con 300 mcg./0.5 ml.	Tratamiento de la neutropenia congénita severa, tratamiento de la neutropenia congénita severa crónica cíclica o neutropenia idiopática, reducción de la neutropenia posterior al trasplante de médula ósea autólogo o alogénico en pacientes con procesos malignos no mieloides, profilaxis primaria y secundaria de la neutropenia inducida por quimioterapia mielosupresiva en regímenes de tratamiento con una incidencia esperada de neutropenia febril mayor o igual al 40% o con factores de riesgo, profilaxis primaria para neutropenia febril y reducción del tiempo de la recuperación de neutrófilos y duración de la fiebre posterior a la inducción o consolidación de la quimioterapia para leucemia mieloide aguda para la movilización de células madre sanguíneas previo y durante la leucoforesis en pacientes en preparación para ablación de médula ósea.	Cancelado	Sandoz gmbh	19974990-1
L03AA02	INVIMA 2007M-0007141	Filgrastim	Inmunef 48 m ui solución inyectable	Solución inyectable	Caja de cartón con una jeringa de vidrio tipo i prellenada con 480 mcg/0,8 ml	Tratamiento de la neutropenia congénita severa, tratamiento de la neutropenia congénita severa crónica cíclica o neutropenia idiopática, reducción de la neutropenia posterior al trasplante de médula ósea autólogo o alogénico en pacientes con procesos malignos no mieloides, profilaxis primaria y secundaria de la neutropenia inducida por quimioterapia mielosupresiva en regímenes de tratamiento con una incidencia esperada de neutropenia febril mayor o igual al 40% o con factores de riesgo, profilaxis primaria para neutropenia febril y reducción del tiempo de la recuperación de neutrófilos y duración de la fiebre posterior a la inducción o consolidación de la quimioterapia para leucemia mieloide aguda para la movilización de células madre sanguíneas previo y durante	Cancelado	Sandoz gmbh	19974992-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						la leucoforesis en pacientes en preparación para ablación de médula ósea.			
L03AA02	INVIMA 2002M-0001769	Factor estimulante de colonias granulocíticas g-csf (filgrastim)	lor leukocim	Solucion inyectable	Caja por 10 viales (bulbo) de vidrio incoloro tipo i por 1 ml.	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropénia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica no mieloide, en pacientes neutropénicos con anti hiv y en tratamiento de trasplante de médula ósea. Agranulocitosis congénita severa.	Negado	Sandoz gmbh	19930083-1
L03AA02	Sin información disponible	Factor estimulante de colonias granulocíticas g-csf (filgrastim)	lor® leukocim	Solucion inyectable	Caja por 10 viales de vidrio tipo i, tapon de clorbutilo gris y flipoff rojo por 1ml de solucion inyectable cada uno.	Coadyuvante en el tratamiento de neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplásica en leucemias agudas, también en neutropenias inducidas por quimioterapia antineoplásicas no mieloide. En pacientes neutropénicos con sida recibiendo tratamiento anti hiv y en tratamiento de trasplante de médula ósea, movilización autógena de células precursoras hacia la sangre periférica. Agranulocitosis congénita severa. Uso en pediatria	Negado	Sandoz gmbh	20080777-1
Sin información disponible	M-014118	Filgrastrim	Neupogen roche solucion inyectable 480 mg/ 1.6 ml	Solucion inyectable	Sin información disponible	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia antineoplástica no mieloide, en pacientes neutropenicos con antihiv y en tratamiento de trasplante de medula osea, agranulocitosis congenitas y neupogen en pediatria.	Vencido	Sandoz gmbh	46043-
L03AA02	INVIMA 2002M-0001940	Filgrastim recombinante (celula huesped: e. Coli k-12 w3110, vector: pcsf 451)	Leucosos® inyectable 150mcg	Solucion inyectable	Caja por 10 frascos-viales en vidrio tipo i transparente por 0,6 ml.	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia mielosupresiva para lipomas malignos y en el trasplante de médula ósea, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de testículo o neuroblastoma.	Vencido	Sandoz gmbh	19925898-1
L03AA02	INVIMA 2002M-0001940	Filgrastim recombinante (celula huesped: e. Coli k-12 w3110,	Leucosos® inyectable 150mcg	Solucion inyectable	Presentacion institucional: caja x 1 frasco vial por 0. 6ml.	Coadyuvante en el tratamiento de la neutropenia en pacientes sometidos a quimioterapia mielosupresiva para lipomas malignos y en el trasplante de médula ósea, cáncer de pulmón, cáncer de ovario, cáncer de testículo o neuroblastoma.	Vencido	Sandoz gmbh	19925898-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		vector: pcsf 451)							
L03AA02	INVIMA 2011M-0012091	Filgrastim recombinante	Zarzio 48 mu/0.5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Caja por 1 jeringa prellenada en vidrio tipo i con aguja fija con protector de seguridad y tapon en bromobutilo.	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica.	Vencido	Sandoz gmbh	20022546-1
L03AA02	INVIMA 2011M-0012091	Filgrastim recombinante	Zarzio 48 mu/0.5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Caja por 3 jeringas prellenadas en vidrio tipo i con aguja fija con protector de seguridad y tapon en bromobutilo.	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica.	Vencido	Sandoz gmbh	20022546-2
L03AA02	INVIMA 2011M-0012091	Filgrastim recombinante	Zarzio 48 mu/0.5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Caja por 5 jeringas prellenadas en vidrio tipo i con aguja fija con protector de seguridad y tapon en bromobutilo.	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad	Vencido	Sandoz gmbh	20022546-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica.			
L03AA02	INVIMA 2011M-0012091	Filgrastim recombinante	Zarzio 48 mu/0.5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Caja por 10 jeringas prellenadas en vidrio tipo i con aguja fija con protector de seguridad y tapon en bromobutilo.	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica.	Vencido	Sandoz gmbh	20022546-4
L03AA02	INVIMA 2011M-0012091	Filgrastim recombinante	Zarzio 48 mu/0.5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Muestra médica: caja x 1 jeringa prellenada en vidrio tipo i con aguja fija, protector de seguridad y tapon de bromobutilo	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica.	Vencido	Laboratorio franco colombiano lafrancol s.a.s.	20022546-5
L03AA02	INVIMA 2011M-0012091	Filgrastim recombinante	Zarzio 48 mu/0.5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Muestra médica: caja x 3 jeringas prellenadas en vidrio tipo i con aguja fija, protector de seguridad y tapon de bromobutilo	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablativo seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad	Vencido	Valentech s.a.s.	20022546-6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica.			
L03AA02	INVIMA 2011M-0012091	Filgrastim recombinante	Zarzio 48 mu/0.5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Muestra médica: caja x 5 jeringas prellenadas en vidrio tipo i con aguja fija, protector de seguridad y tapon de bromobutilo	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablatoivo seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica.	Vencido	Biocon limited	20022546-7
L03AA02	INVIMA 2011M-0012091	Filgrastim recombinante	Zarzio 48 mu/0.5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Muestra médica: caja x 10 jeringas prellenadas en vidrio tipo i con aguja fija, protector de seguridad y tapon de bromobutilo	Reducción de la duración de la neutropenia y de la incidencia de la neutropenia febril en los pacientes tratados con quimioterapia citotóxica establecida para enfermedades malignas (con excepción de la leucemia mieloide crónica y de los síndromes mielodisplásicos) y reducción de la duración de la neutropenia en los pacientes sometidos a tratamiento mieloablatoivo seguido de trasplante de médula ósea que se considere que presentan un mayor riesgo de experimentar neutropenia grave prolongada. La eficacia y la seguridad del filgrastim son similares en los adultos y en los niños tratados con quimioterapia citotóxica.	Vencido	Centro de inmunologia molecular	20022546-8

Tabla 9. Registros sanitarios Fludarabina

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BB05	INVIMA 2008M-007196 R1	Fludarabina fosfato	Fludara	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 5 viales de vidrio tipo i 50 mg c/u (en forma de polvo liofilizado).	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl)	Vigente	Genzyme Corporation	203335-1
L01BB05	INVIMA 2008M-007196 R1	Fludarabina fosfato	Fludara	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un vial (con polvo liofilizado) de vidrio tipo i por 50 mg	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl)	Vigente	Genzyme Corporation	203335-2
L01BB05	INVIMA 2008M-007196 R1	Fludarabina fosfato	Fludara	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 5 viales de vidrio tipo i 50 mg c/u (en forma de polvo liofilizado)	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl)	Vigente	Genzyme Corporation	203335-3
L01BB05	INVIMA 2007M-0007111	Fludarabina fosfato (equivalente a 39,05 mg de fludarabina)	Fludarabina 50 mg liofilizado para solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un vial x 50 mg	Tratamiento de pacientes con leucemia linfocítica crónica de células b (llc) 6 que no hayan respondido, o hayan empeorado, durante o después de un tratamiento que contenga un agente alquilante. Tratamiento del linfoma de hodkin de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Laboratorios Biopas S.A	19974988-1
L01BB05	INVIMA 2008M-0008989	Fludarabina fosfato (equivalente 39,05 mg de fludarabina base)	Fludarabina polvo liofilizado inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 frasco vial	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl)	Vigente	Laboratorios Libra S.A	19995177-1
L01BB05	INVIMA 2008M-0008989	Fludarabina fosfato (equivalente 39,05 mg de fludarabina base)	Fludarabina polvo liofilizado inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 5 frascos vial	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl)	Vigente	Laboratorios Libra S.A	19995177-2
L01BB05	INVIMA 2010M-0010585	Fludarabina fosfato	Ludabina® 50 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 frasco ampolla en vidrio tipo i conteniendo el polvo liofilizado.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl)	Vigente	Farmaceutica Paraguaya S.A	20007539-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BB05	INVIMA 2010M-0010585	Fludarabina fosfato	Ludabina® 50 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 5 frascos ampollas en vidrio tipo i conteniendo el polvo liofilizado.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl)	Vigente	Farmacéutica Paraguaya S.A	20007539-2
L01BB05	INVIMA 2016M-0010964-R1	Fludarabina fosfato	Fludarabina fosfato polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable 50 mg/ vial	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un vial de vidrio tipo i transparente de 10 ml, tapón de bromobutilo, precinto de aluminio y tapa flip off, con liofilizado	Tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (llc) de células b en pacientes con reservas suficientes de médula ósea. El tratamiento de primera línea con fludarabina solo deberá iniciarse en pacientes con enfermedad avanzada ,estadios iii/iv de rai (estadio c de binet), o estadios i/ii de rai (estadios a/b de binet) en los que el paciente tiene síntomas relacionados con la enfermedad o indicios de enfermedad progresiva.	Vigente	Grupo Unipharm S.A. Y/O Laboratorios Uni S.A.	20012774-1
L01BB05	INVIMA 2017M-0012169-R1	Fludarabina fosfato	Fludarabina 50 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un vial de vidrio tipo i transparente, tapon de bromobutilo y flip-off de seguridad rojo, con 100 mg de polvo liofil.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20026268-1
L01BB05	INVIMA 2017M-0012169-R1	Fludarabina fosfato	Fludarabina 50 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 5 viales de vidrio tipo i transparente, tapon de bromobutilo y flip-off de seguridad rojo, con 100 mg de polvo liofil.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20026268-2
L01BB05	INVIMA 2017M-0012169-R1	Fludarabina fosfato	Fludarabina 50 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 10 viales de vidrio tipo i transparente, tapon de bromobutilo y flip-off de seguridad rojo, con 100 mg de polvo liofil.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20026268-3
L01BB05	INVIMA 2017M-0012169-R1	Fludarabina fosfato	Fludarabina 50 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con 1 frasco ampolla en vidrio incoloro tipo i con tapón de bromobutilo y flip off blanco, por 0.05 g para reconstituir a 2 ml de solución inyectable.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20026268-4
L01BB05	INVIMA 2017M-0012169-R1	Fludarabina fosfato	Fludarabina 50 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con 5 frascos ampolla en vidrio incoloro tipo i con tapón de bromobutilo y flip off blanco, por 0.05 g para	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20026268-5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					reconstituir a 2 ml de solución inyectable.				
L01BB05	INVIMA 2017M-0012169-R1	Fludarabina fosfato	Fludarabina 50 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con 10 frascos ampolla en vidrio incoloro tipo i con tapón de bromobutilo y flip off blanco, por 0.05 g para reconstituir a 2 ml de solución inyectable.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20026268-6
L01BB05	INVIMA 2016M-0016859	Fludarabina fosfato	Fludarabina	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con 1 frasco ampolla de vidrio tipo i, incoloro con tapón elastomérico de bromobutilo y precinto flip off.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Laboratorio Kemex S.A	20083483-1
L01BB05	INVIMA 2016M-0016859	Fludarabina fosfato	Fludarabina	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con 5 frascos ampolla de vidrio tipo i, incoloro con tapón elastomérico de bromobutilo y precinto flip off.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Laboratorio Kemex S.A	20083483-2
L01BB05	INVIMA 2016M-0016859	Fludarabina fosfato	Fludarabina	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con 25 frascos ampolla de vidrio tipo i, incoloro con tapón elastomérico de bromobutilo y precinto flip off.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Laboratorio Kemex S.A	20083483-3
L01BB05	INVIMA 2016M-0016859	Fludarabina fosfato	Fludarabina	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con 50 frascos ampolla de vidrio tipo i, incoloro con tapón elastomérico de bromobutilo y precinto flip off.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Laboratorio Kemex S.A	20083483-4
L01BB05	INVIMA 2016M-0016859	Fludarabina fosfato	Fludarabina	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con 100 frascos ampolla de vidrio tipo i, incoloro con tapón elastomérico de bromobutilo y precinto flip off.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl).	Vigente	Laboratorio Kemex S.A	20083483-5
L01BB05	INVIMA 2011M-0012703	Fludarabina fosfato	Fludarina®	Polvo liofilizado para reconstituir a	Caja con un frasco vial de vidrio por 50 mg.	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking's de bajo grado (lg-nhl)	Perdida fuerza ejec	Biotoscana Farma S.A.	20032747-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
				solucion inyectable					
L01BB05	INVIMA 2002M-0001651	Fludarabina fosfato	Fludara® oral	Tableta cubierta (gragea)	Caja con 1 frasco de seguridad el cual contiene 3 blister con 5 tabletas cada uno	Tratamiento de pacientes con leucemia linfocítica crónica de células b (llc) 6 que no hayan respondido, o hayan empeorado, durante o después de un tratamiento que contenga un agente alquilante. Tratamiento del linfoma de hodkin de bajo grado (lg-nhl)	Vencido	Genzyme Corporation	19926307-1
L01BB05	INVIMA 2002M-0001651	Fludarabina fosfato	Fludara® oral	Tableta cubierta (gragea)	Caja con 1 frasco de seguridad el cual contiene 4 blister con 5 tabletas cada uno	Tratamiento de pacientes con leucemia linfocítica crónica de células b (llc) 6 que no hayan respondido, o hayan empeorado, durante o después de un tratamiento que contenga un agente alquilante. Tratamiento del linfoma de hodkin de bajo grado (lg-nhl)	Vencido	Genzyme Corporation	19926307-2
L01BB05	INVIMA 2010M-0011519	Fludarabina fosfato equivalente a fludarabina	Fludarabina fosfato polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable 50mg/vial	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1 vial de vidrio tipo i con el polvo liofilizado	Leucemia linfocitica cronica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl)	Vencido	Medimex S.A.	20018487-1
L01BB05	INVIMA 2011M-0012071	Fludarabina fosfato	Fludarabina ebewe 50 mg /2ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 10 viales de vidrio tipo i	Leucemia linfocitica crónica tratamiento del linfoma no hodgking's de bajo grado (lg-nhl)	Vencido	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20024848-3
L01BB05	INVIMA 2011M-0012071	Fludarabina fosfato	Fludarabina ebewe 50 mg /2ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 1 vial de vidrio tipo i	Leucemia linfocitica crónica tratamiento del linfoma no hodgking's de bajo grado (lg-nhl)	Vencido	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20024848-1
L01BB05	INVIMA 2011M-0012071	Fludarabina fosfato	Fludarabina ebewe 50 mg /2ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 5 viales de vidrio tipo i	Leucemia linfocitica crónica tratamiento del linfoma no hodgking's de bajo grado (lg-nhl)	Vencido	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20024848-2
L01BB05	INVIMA 2012M-0013131	Fludarabina fosfato	Dabiflux ® 50 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1 vial de vidrio transparente tipo i por 50mg de polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Leucemia linfocitica cronica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl)	Vencido	Procaps S.A.	20036624-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BB05	INVIMA 2012M-0013131	Fludarabina fosfato	Dabiflux ® 50 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 5 viales de vidrio transparente tipo i por 50mg de polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Leucemia linfocítica crónica tratamiento del linfoma no hodgking de bajo grado (lg-nhl)	Vencido	Procaps S.A.	20036624-2

Tabla 10. Registros sanitarios Gemcitabina

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2007M-006958-R1	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina	Gemzar lilly 1 g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con vial de vidrio tipo i que contiene un gramo de polvo liofilizado a reconstituir a un volumen de 25 ml	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platino. Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	En trámite renov	Eli Lilly And Company	215183-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2007M-006959-R1	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina	Gemzar 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un vial de vidrio transparente tipo i con polvo liofilizado para reconstituir a 5 ml	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos.	Vigente	Eli Lilly And Company	215185-2
L01BC05	INVIMA 2006M-0005336	Gemcitabina clorhidrato equivalente a 200mg de gemcitabina base	Oncotabin 200 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 vial de vidrio tipo i incoloro y trans. tapon de caucho bromobutilo gris flip off de p.p. Y agrafe de al.+ solv nacl 0,9%	Tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer pancreático refractario al 5 -fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación.	En trámite renov	Biotoscana Farma S.A.	19955835-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2005M-0005131	Gemcitabina clorhidrato equivalente a 1g de gemcitabina base	Oncotabin 1000 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x un vial de vidrio tipo i con tapon de caucho bromobutilo gris con cierre flip off de polipropileno y agrafe de aluminio	Tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer pancreático refractario al 5 -fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación.	Vencido	Biotoscana Farma S.A.	19955836-1
	INVIMA 2006M-0005972	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina	Gemcitabina clorhidrato inyección 1000mg	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable		Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos.	Negado	Elíptica Médica S.A.	19963608-
L01BC05	INVIMA 2007M-0006907	Gemcitabina clorhidrato	Gemcitabina clorhidrato 200 mg inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1 frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con	En trámite renov	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19970173-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico, para pacientes con cáncer pancreático. Refractario al 5-fu. Para el tratamiento de cáncer de mama, solo o en combinación			
L01BC05	INVIMA 2007M-0006907	Gemcitabina clorhidrato	Gemcitabina clorhidrato 200 mg inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 3 frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico, para pacientes con cáncer pancreático. Refractario al 5-fu. Para el tratamiento de cáncer de mama, solo o en combinación	En tramite renov	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19970173-2
L01BC05	INVIMA 2007M-0006907	Gemcitabina clorhidrato	Gemcitabina clorhidrato 200 mg inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 4 frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico, para pacientes con cáncer pancreático. Refractario al 5-fu. Para el tratamiento de cáncer de mama, solo o en combinación	En tramite renov	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19970173-3
L01BC05	INVIMA 2007M-0006907	Gemcitabina clorhidrato	Gemcitabina clorhidrato 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a	Caja con 25 frasco ampolla de vidrio	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no	En tramite renov	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19970173-4

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
			inyectable liofilizado	solucion inyectable	tipo i incoloro, uso hospitalario	pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico, para pacientes con cáncer pancreático. Refractario al 5-fu. Para el tratamiento de cáncer de mama, solo o en combinación			
L01BC05	INVIMA 2007M-0006907	Gemcitabina clorhidrato	Gemcitabina clorhidrato 200 mg inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja con 50 frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro, uso hospitalario	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico, para pacientes con cáncer pancreático. Refractario al 5-fu. Para el tratamiento de cáncer de mama, solo o en combinación	En tramite renov	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19970173-5
L01BC05	INVIMA 2007M-0006907	Gemcitabina clorhidrato	Gemcitabina clorhidrato 200 mg inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja con 100 frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro, uso hospitalario	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico, para pacientes con cáncer pancreático. Refractario al 5-fu. Para el tratamiento de cáncer de mama, solo o en combinación	En tramite renov	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19970173-6

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2007M-0006907	Gemcitabina clorhidrato	Gemcitabina clorhidrato 200 mg inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 500 frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro, uso hospitalario	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico, para pacientes con cáncer pancreático. Refractario al 5-fu. Para el tratamiento de cáncer de mama, solo o en combinación	En tramite renov	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19970173-7
L01BC05	INVIMA 2007M-0006907	Gemcitabina clorhidrato	Gemcitabina clorhidrato 200 mg inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1000 frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro, uso hospitalario	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico, para pacientes con cáncer pancreático. Refractario al 5-fu. Para el tratamiento de cáncer de mama, solo o en combinación	En tramite renov	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19970173-8

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2007M-0007200	Gemcitabina hcl 227.70 mg.(equivalentes a 200 mg. De gemcitabina)	Gemcitabina 200 mg polvo liofilizado para solucion inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja por 1 fco. Ampolla de vidrio tipo i, incoloro, de 11 ml. Con tapon de caucho bromobutilico y cap de aluminio.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastático y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación.	Perdida fuerza ejec	Sandoz S.A.	19974130-1
L01BC05	INVIMA 2007M-0007028	Gemcitabina clorhidrato 1138,50 mg equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina ® 1 g polvo liofilizado para solucion inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja por 1 frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro por 50 ml	Tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastasico. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastasico. Pacientes con cáncer pancreático refractario al 5 -fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación.	Perdida fuerza ejec	Sandoz S.A.	19974132-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2007M-0007306	Gemcitabina clorhidrato (1,13868 g) equivalente a gemcitabina base	Gebitan® 1 g inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 frasco ampolla	Tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación.	Vigente	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19978376-1
L01BC05	INVIMA 2009M-0009259	Gemcitabina clorhidrato (227,7 mg) equivalente a de gemcitabina base.	Gemtaz - sun 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por vial por 200mg para reconstituir.	Tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación.	Vigente	Sun Pharmaceutical Industries Ltd,	19997219-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2008M-0008837	Gemcitabina clorhidrato (equivalente a 1g de gemcitabina)	Gemtaz- sun 1g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Vial de 1g en caja de cartón	<p>Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu.</p> <p>Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos,coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga.</p>	Vigente	Sun Pharmaceutical Industries Ltd,	19997220-1
L01BC05	INVIMA 2010M-0010666	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina	Okagem 1000	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con vial de vidrio tipo I por 50 ml	<p>Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario</p>	Vigente	Vitalchem Laboratories De Colombia S.A.	20006577-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos, coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga.			
L01BC05	INVIMA 2010M-0010666	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina	Okagem 1000	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con un frasco de vidrio tipo i. Vial por 1000 mg. Polvo liofilizado inyectable.	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos, coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga.	Vigente	Vitalchem Laboratories De Colombia S.A.	20006577-2

Evidencia que promueve Confianza

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2010M-0010662	Gemcitabina clorhidrato 228 mg equivalente a gemcitabina base libre	Gentabim 200 mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un vial de vidrio transparente con polvo liofilizado con 200 mg de gemcitabina.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastático. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastático. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastático y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos.	Vigente	Procaps S.A.	20010932-1
L01BC05	INVIMA 2010M-0010530	Gemcitabina clorhidrato 1140 mg equivalente a gemcitabina base libre	Gentabim 1000 mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un vial de vidrio transparente con polvo liofilizado con 1 g de gemcitabina.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastático. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastático. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastático y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con	Vigente	Procaps S.A.	20010934-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						cáncer de vejiga avanzado o metastásico			
L01BC05	INVIMA 2010M-0010759	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina	Gemcitabina inyeccion 1000 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja plegadiza con vial de vidrio tipo i por 50 ml, que contiene 1000 mg de gemcitabina	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cancer pulmonar de celulas no pequeñas localmente avanzado o metastasico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcimona de pancreas localmente avanzado o metastasico. Para pacientes con cancer pancreatico refractario al 5-fu. Tratamiento de cancer de pulmon de celulas no pequeñas localmente avanzado metastasico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cancer de mama solo o en combinacion. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaido después de una terapia basada en platinos, coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga.	Vigente	Health Net S.A.S	20011001-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2010M-0010758	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina	Gemcitabine inyeccion 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja por vial tipo i con 200 mg de gemcitabina	Tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación.	Vigente	Health Net S.A.S	20011002-1
L01BC05	INVIMA 2010M-0010750	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 1.0 g/ vial	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja por un vial de vidrio tipo i con producto, con tapon de caucho gris con sello flip off de aluminio.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Venus Remedies Limited	20011867-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2010M-0010845	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina	Pamigen® 200mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un frasco ampolla en vidrio tipo i conteniendo el polvo liofilizado con tapon en bromobutilo con sello de aluminio ro	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de pancreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Farmaceutica Paraguaya S.A	20013832-1
L01BC05	INVIMA 2015M-0010977-R1	Gemcitabina clorhidrato 1138,5mg equivalente a gemcitabina	Pamigen® 1000 mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un frasco ampolla incoloro de vidrio tipo i conteniendo el polvo liofilizado, con tapón en bromobutilo, precinto de alu	Cáncer pulmonar de células no pequeñas: está indicado en combinación de cisplatino como primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer inoperable o localmente avanzado (estadio iia ó iiib) o metastásico (estadio iv). Cáncer de páncreas: gemcitabina está indicado como primera línea de tratamiento para pacientes con cáncer pancreático (adenocarcinoma) localmente avanzado (no resecable estadio ii ó iii) o metastásico (estadio iv). También está indicado en pacientes previamente tratados con 5-fu. Cáncer de vejiga: la gemcitabina en combinación con cisplatino está indicada en el	Vigente	Farmaceutica Paraguaya S.A	20013834-1

Evidencia que promueve Confianza

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga.			
L01BC05	INVIMA 2016M-0011215-R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por vial en vidrio tipo i con tapon caucho por 20 ml de solución inyectable. Este volumen viene en por 1, 5, 10 viales/caja	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2016M-0011215-R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por vial en vidrio tipo i con tapon caucho por 50 ml de solución inyectable. Este volumen viene en por 1, 5, 10 viales/caja	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de pancreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-2
L01BC05	INVIMA 2016M-0011215-R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por vial en vidrio tipo i con tapon caucho por 100ml de solución inyectable. Este volumen viene en por 1, 5, 10 viales/caja	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de pancreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-3

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.			
L01BC05	INVIMA 2016M- 0011215- R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 1 vial de vidrio tipo I por 20 ml	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-4

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2016M-0011215-R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 1 vial de vidrio tipo i por 50 ml	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de pancreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-5
L01BC05	INVIMA 2016M-0011215-R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 1 vial de vidrio tipo i por 100 ml	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de pancreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-6

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.			
L01BC05	INVIMA 2016M-0011215-R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 5 viales de vidrio tipo I por 20 ml	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-7

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2016M-0011215-R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 5 viales de vidrio tipo i por 50 ml	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de pancreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-8
L01BC05	INVIMA 2016M-0011215-R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 5 viales de vidrio tipo i por 100 ml	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de pancreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-9

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.			
L01BC05	INVIMA 2016M-0011215-R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 10 viales de vidrio tipo I por 20 ml	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-10

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2016M-0011215-R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 10 viales de vidrio tipo i por 50 ml	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de pancreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-11
L01BC05	INVIMA 2016M-0011215-R1	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 10 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 10 viales de vidrio tipo i por 100 ml	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de pancreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Vigente	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20017458-12

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.			
L01BC05	INVIMA 2011M-0011880	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina	Emcitab - gemcitabina 200 mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x un vial de vidrio tipo i con polvo liofilizado para reconstituir + inserto	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cancer pulmonar de celulas no pequeñas localmente avanzado o metastasico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de pancreas localmente avanzado o metastasico. Para pacientes con cancer pancreatico refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cancer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos.	Vencido	Humax Pharmaceutical S.A.	20021227-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2010M-0011298	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina base	Emcitab	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un frasco ampolla incoloro de vidrio tipo i conteniendo el polvo liofilizado, con tapón en bromobutilo, precinto de alu	Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vencido	Humax Pharmaceutical S.A.	20021229-1
L01BC05	INVIMA 2011M-0012543	Gemcitabina clorhidrato, equivalente a gemcitabina base	Gercizar 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Cja con 1 vial de vidrio tipo i, tapon de bromobutilo y agrafe de aluminio con polvo liof. Equiv. A 200 mg de gemcitabina base.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cancer pulmonar de celulas no pequeñas localmente avanzado o metastasico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de pancreas localmente avanzado o metastasico. Para pacientes con cancer pancreatico refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cancer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído despues de una terapia basada en platinos.	Vencido	Glaxosmithkline Colombia S.A.	20029564-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2011M-0012573	Gemcitabina clorhidrato, equivalente a gemcitabina base	Gercizar 1 g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 vial de vidrio tipo 1 x 50 ml.	Indicaciones: · para el tratamiento de: cáncer de vejiga: gemcitabina está indicada para el tratamiento de cáncer de vejiga localmente avanzado o metastásico en combinación con cisplatino. · cáncer de páncreas: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma localmente avanzado o metastásico del páncreas. · cáncer de pulmón de células no pequeñas: gemcitabina, en combinación con cisplatino, está indicada como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (nsccl, non-small cell lung cancer) localmente avanzado o metastásico. La monoterapia con gemcitabina puede considerarse en pacientes ancianos o aquellos con estado funcional 2. · cáncer de ovario: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con carcinoma epitelial de ovario localmente avanzado o metastásico, en combinación con carboplatino, en pacientes con recaída de enfermedad tras un intervalo libre de recurrencias de al menos 6 meses después del tratamiento de primera línea basado en platino. · cáncer de mama: gemcitabina, en combinación con paclitaxel, está indicada para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama no resecable, localmente recurrente o metastásico, que han recaído luego de recibir quimioterapia adyuvante/neoadyuvante. La	Perdida fuerza ejec	Glaxosmithkline Colombia S.A.	20029565-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina, a menos que estuviera clínicamente contraindicada.			
L01BC05	INVIMA 2012M-0013249	Gemcitabina clorhidrato 2278 mg equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 2000mg/ 50ml	Solucion inyectable	Caja por 1 vial de vidrio tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Perdida fuerza ejec	Sandoz GmbH	20033304-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2012M-0013249	Gemcitabina clorhidrato 2278 mg equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 2000mg/ 50ml	Solucion inyectable	Caja por 5 vial de vidrio tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Perdida fuerza ejec	Sandoz GmbH	20033304-2
L01BC05	INVIMA 2012M-0013249	Gemcitabina clorhidrato 2278 mg equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 2000mg/ 50ml	Solucion inyectable	Caja por 10 vial de vidrio tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Perdida fuerza ejec	Sandoz GmbH	20033304-3

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico			
L01BC05	INVIMA 2012M-0013026	Gemcitabina clorhidrato 45,56mg equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 1000 mg/25 ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 1 vial de vidrio tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Perdida fuerza ejec	Sandoz GmbH	20040180-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2012M-0013026	Gemcitabina clorhidrato 45,56mg equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 1000 mg/25 ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 5 viales de vidrio tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Perdida fuerza ejec	Sandoz GmbH	20040180-2
L01BC05	INVIMA 2012M-0013026	Gemcitabina clorhidrato 45,56mg equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 1000 mg/25 ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 10 viales de vidrio tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Perdida fuerza ejec	Sandoz GmbH	20040180-3

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico			
L01BC05	INVIMA 2012M-0013581	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 1g polvo liofilizado para solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x vial de vidrio tipo i x 1 gramo de polvo liofilizado+inserto	<p>Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cancer pulmonar de celulas no pequeñas localmente avanzado o metastasico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcimona de pancreas localmente avanzado o metastasico. Para pacientes con cancer pancreatico refractario al 5-fu.</p> <p>Tratamiento de cancer de pulmon de celulas no pequeñas localmente avanzado metastasico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cancer de mama solo o en combinacion.tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaido después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con</p>	Vigente	Fresenius Kabi Oncology Limited	20043051-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						cáncer de vejiga avanzado o metastásico			
L01BC05	INVIMA 2012M-0013798	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 200 mg polvo liofilizado para solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x un vial de vidrio tipo I con polvo liofilizado para reconstituir	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-FU. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platino.	Vigente	Fresenius Kabi Oncology Limited	20043052-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2012M-0013300	Gemcitabina clorhidrato 227,8 mg equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 200 mg/5 ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 10 vial de vidrio tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Perdida fuerza ejec	Sandoz GmbH	20045103-3
L01BC05	INVIMA 2012M-0013300	Gemcitabina clorhidrato 227,8 mg equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 200 mg/5 ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 1 vial de vidrio tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Perdida fuerza ejec	Sandoz GmbH	20045103-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico			
L01BC05	INVIMA 2012M-0013300	Gemcitabina clorhidrato 227,8 mg equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 200 mg/5 ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 5 vial de vidrio tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Perdida fuerza ejec	Sandoz GmbH	20045103-2

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2012M-0013801	Gemcitabina clorhidrato 234,750mg (equivalente a de gemcitabina base)	Gembina 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un vial de vidrio incoloro tipo i por 200mg	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Laboratorios Chalver De Colombia S.A.	20045930-1
L01BC05	INVIMA 2012M-0013870	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gembina 1,0 g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un vial de vidrio incoloro tipo i x 1g.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Vigente	Laboratorios Chalver De Colombia S.A.	20045931-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico			
L01BC05	INVIMA 2012M-0013887	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemriochem 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Presentación comercial: caja por 1 frascos ampolla de vidrio tipo i transparentes	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Eriochem S.A	20048010-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2012M-0013887	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemriochem 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Presentación comercial: caja por 2 frascos ampolla de vidrio tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Eriochem S.A	20048010-2
L01BC05	INVIMA 2012M-0013887	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemriochem 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Presentación comercial: caja por 5 frascos ampolla de vidrio tipo i	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Vigente	Eriochem S.A	20048010-3

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.			
L01BC05	INVIMA 2012M-0013887	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemriochem 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Presentación uso clínico : caja por 10 frascos ampolla de vidrio tipo i transparentes	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Eriochem S.A	20048010-4

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2012M-0013887	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemriochem 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Presentación uso clínico : caja por 50 frascos ampolla de vidrio tipo i transparentes	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Eriochem S.A	20048010-5
L01BC05	INVIMA 2012M-0013815	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemriochem ® 1000 mg.	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x frasco ampolla vidrio transparente tipo i con polvo liofilizado 1 g.	Tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer pancreático refractario al 5 -fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos.	Vigente	Eriochem S.A.	20048012-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2013M-0014654	Gemcitabina clorhidrato (1138mg) equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 1g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza x 1 frasco ampolla de vidrio que contiene 1 gramo de polvo liofilizado a reconstituir a 25 ml	<p>Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cancer pulmonar de celulas no pequeñas localmente avanzado o metastasico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcimona de pancreas localmente avanzado o metastasico. Para pacientes con cancer pancreatico refractario al 5-fu.</p> <p>Tratamiento de cancer de pulmon de celulas no pequeñas localmente avanzado metastasico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cancer de mama solo o en combinacion.tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaido después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico</p>	Vigente	Grupo Unipharm S.A. Y/O Laboratorios Uni S.A.	20054873-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2013M-0014665	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina	Gemcitabina polvo liofilizado 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1 frasco ampolla en vidrio tipo i, tapón bromobutilo, precinto de alu y tapa flip-off conteniendo 200mg de gemcitabina.	<p>Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cancer pulmonar de celulas no pequeñas localmente avanzado o metastasico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcimona de pancreas localmente avanzado o metastasico. Para pacientes con cancer pancreatico refractario al 5-fu.</p> <p>Tratamiento de cancer de pulmon de celulas no pequeñas localmente avanzado metastasico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cancer de mama solo o en combinacion.tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaido después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico</p>	Vigente	Damipe Farmaceutica S.A.S	20055392-1

Evidencia que promueve Confianza

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2014M-0014808	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 1000 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro con polvo liofilizado + prospecto.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/ o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Damipe Farmaceutica S.A.S	20055393-1
L01BC05	INVIMA 2014M-0014955	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 200 mg	Polvo esteril para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1 frasco vial de vidrio incoloro tipo i con polvo liofilizado, tapon de caucho gris de bromobutilo y cierre de aluminio	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastático. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastático. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos	Vigente	Actavis Group Ptc Ehf	20055728-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2013M-0014699	Gemcitabina equivalente a 1,14g de gemcitabina clorhidrato	Gemcitabina 1g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza x 1 frasco ampolla de vidrio con 1 gramo de polvo liofilizado para reconstituir a 25 ml	<p>Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cancer pulmonar de celulas no pequeñas localmente avanzado o metastasico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcimona de pancreas localmente avanzado o metastasico. Para pacientes con cancer pancreatico refractario al 5-fu.</p> <p>Tratamiento de cancer de pulmon de celulas no pequeñas localmente avanzado metastasico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cancer de mama solo o en combinacion.tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaido después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico</p>	Vigente	Actavis Group Ptc Ehf	20055730-1

Evidencia que promueve Confianza

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2013M-0014725	Gemcitabina clorhidrato 227,7 mg equivalente a gemcitabina	Gemciseven 200 ®	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un vial de vidrio tipo i transparente con tapón de bromobutilo y agrafe de aluminio por 200 mg	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Seven Pharma Colombia S.A.S	20056917-1
L01BC05	INVIMA 2014M-0015139	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza de cartón x1 frascos ampolla de vidrio tipo i incoloro.	Tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20062272-1

Evidencia que promueve Confianza

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2014M-0015139	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza de cartón x10 frascos ampolla de vidrio tipo i incoloro.	Tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20062272-2
L01BC05	INVIMA 2014M-0015139	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza de cartón x50 frascos ampolla de vidrio tipo i incoloro.	Tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20062272-3

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2014M-0015139	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza de cartón x100 frascos ampolla de vidrio tipo i incoloro.	Tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20062272-4
L01BC05	INVIMA 2014M-0015517	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 1,0 g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro con polvo liofilizado	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/ o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20062273-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2014M-0015479	Gemcitabina hidrocloreto equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 2.0 g polvo liofilizado para solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 vial de vidrio tipo i con polvo liofilizado para reconstituir	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Fresenius Kabi Oncology Limited	20062338-1
L01BC05	INVIMA 2014M-0015121	Gemcitabina hidrocloreto equivalente a gemcitabina	Gemtin® 200mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza por un vial de vidrio tipo i, con tapon de caucho de bromobutilo, agrafe de aluminio y tapa flip off azul por 10 ml	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/ o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Vigente	Hetero Labs Limited	20063469-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico			
L01BC05	INVIMA 2014M-0015121	Gemcitabina hidrocloreto equivalente a gemcitabina	Gemtin® 200mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza por 12 viales de vidrio tipo i, con tapon de caucho de bromobutilo, agrafe de aluminio y tapa flip off azul.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/ o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Hetero Labs Limited	20063469-2

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2014M-0015172	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Fotinetx 1 g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza de cartón x1 frasco ampolla de vidrio incoloro tipo i de 50 ml, tapón bromobutilo gris, agrafe aluminio y precinto plástico pp tipo flip-off color azul.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama sólo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A	20063485-1
L01BC05	INVIMA 2014M-0015053	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Fotinetx® 200 mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1 frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro de 15 ml con tapón de bromobutilo gris y sello de aluminio acoplado a un sello de seguridad flip-off de polipropileno color azul conteniendo el polvo liofilizado.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos.	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A	20063486-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2014M-0014990	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina base	Gemtin® 1000 mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x frasco ampolla de vidrio tipo i ,tapón bromobutilo gris , precinto aluminio, tapa azul flip-off con polvo liofilizado.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu.tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/ o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Hetero Labs Limited	20063548-1
L01BC05	INVIMA 2014M-0014990	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina base	Gemtin® 1000 mg polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 10 frascos ampolla de vidrio tipo i ,tapón bromobutilo gris , precinto aluminio, tapa azul flip-off con polvo liofilizado c/u.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu.tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/ o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Vigente	Hetero Labs Limited	20063548-2

Evidencia que promueve Confianza

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico			
L01BC05	INVIMA 2015M-0015705	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina base	Gemcitabina 1g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartón con 1 frasco ampula de vidrio tipo i transparente con 1g de liofilizado+instructivo anexo	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Laboratorios Pisa S.A. De C.V.	20064604-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2014M-0015436	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina base	Gemcimira 200 mg	Solucion inyectable	Caja con un vial de vidrio tipo i por 5,3 ml de solución inyectable	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Hospira Inc	20064992-1
L01BC05	INVIMA 2014M-0015546	Clorhidrato de gemcitabina equivalente a gemcitabina	Gemcimira® 1 g / 26,3 ml	Solucion inyectable	Caja con 1 vial de vidrio tipo i transparente (capacidad 30 ml) x 26,3 ml de solución inyectable, tapón de caucho (clorobutilo) siliconado gris, y sello de aluminio desprendible.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastático y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos.	Vigente	Hospira Inc.	20064994-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de vejiga avanzado o metastásico.			
L01BC05	INVIMA 2015M-0016415	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gemxuba® 1g	Polvo esteril para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con un vial de vidrio incoloro tipo i por 1 g, tapón de clorobutilo gris y agrafe de aluminio flip-off verde.	Para el tratamiento de: 1. Cáncer de vejiga: gemcitabina está indicada para el tratamiento de cáncer de vejiga localmente avanzado o metastásico en combinación con cisplatino. 2. Cáncer de páncreas: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma localmente avanzado o metastásico del páncreas. 3. cáncer de pulmón de células no pequeñas: gemcitabina, en combinación con cisplatino, está indicada como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (nscL, non-small cell lung cancer) localmente avanzado o metastásico. La monoterapia con gemcitabina puede considerarse en pacientes ancianos o aquellos con estado funcional 2. 4. Cáncer de ovario: gemcitabina está	Vigente	Glenmark Generics S.A.	20077798-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						indicada para el tratamiento de pacientes con carcinoma epitelial de ovario localmente avanzado o metastásico, en combinación con carboplatino, en pacientes con recaída de enfermedad tras un intervalo libre de recurrencias de al menos 6 meses después del tratamiento de primera línea basado en platino. 5. Cáncer de mama: gemcitabina, en combinación con paclitaxel, está indicada para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama no resecable, localmente recurrente o metastásico, que han recaído luego de recibir quimioterapia adyuvante/neoadyuvante. La quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina, a menos que estuviera clínicamente contraindicada.			
L01BC05	INVIMA 2015M-0015932	Gemcitabina (como gemcitabina clorhidrato)	Genuten® 1000	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 vial de vidrio borosilicato tipo I incoloro, tapón de bromobutilo opaco gris oscuro, precinto de aluminio tipo flip off con una cubierta plástica, con polvo liofilizado.	Para el tratamiento de: cáncer de vejiga: gemcitabina está indicada para el tratamiento de cáncer de vejiga localmente avanzado o metastásico en combinación con cisplatino. Cáncer de páncreas: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma localmente avanzado o metastásico del páncreas. Cáncer de pulmón de células no pequeñas: gemcitabina, en combinación con cisplatino, está indicada como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (nscl, non-small cell lung cancer) localmente avanzado o metastásico. La monoterapia con gemcitabina puede considerarse	Vigente	Scandinavia Pharma Ltda.	20078381-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>en pacientes ancianos o aquellos con estado funcional 2. Cáncer de ovario: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con carcinoma epitelial de ovario localmente avanzado o metastásico, en combinación con carboplatino, en pacientes con recaída de enfermedad tras un intervalo libre de recurrencias de al menos 6 meses después del tratamiento de primera línea basado en platino. Cáncer de mama: gemcitabina, en combinación con paclitaxel, está indicada para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama no resecable, localmente recurrente o metastásico, que han recaído luego de recibir quimioterapia adyuvante/neoadyuvante. La quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina, a menos que estuviera clínicamente contraindicada.</p>			

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2015M-0016070	Gemcitabina	Genuten® 200	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 vial de vidrio borosilicato tipo I incoloro, tapón de bromobutilo opaco gris oscuro, precinto de aluminio tipo flip off con una cubierta plástica, con polvo liofilizado.	Para el tratamiento de: cáncer de vejiga: gemcitabina está indicada para el tratamiento de cáncer de vejiga localmente avanzado o metastásico en combinación con cisplatino. Cáncer de páncreas: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma localmente avanzado o metastásico del páncreas. Cáncer de pulmón de células no pequeñas: gemcitabina, en combinación con cisplatino, está indicada como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (nsccl, non-small cell lung cancer) localmente avanzado o metastásico. La monoterapia con gemcitabina puede considerarse en pacientes ancianos o aquellos con estado funcional 2. Cáncer de ovario: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con carcinoma epitelial de ovario localmente avanzado o metastásico, en combinación con carboplatino, en pacientes con recaída de enfermedad tras un intervalo libre de recurrencias de al menos 6 meses después del tratamiento de primera línea basado en platino. Cáncer de mama: gemcitabina, en combinación con paclitaxel, está indicada para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama no resecable, localmente recurrente o metastásico, que han recaído luego de recibir quimioterapia adyuvante/neoadyuvante. La quimioterapia previa debe haber	Vigente	Scandinavia Pharma Ltda.	20078383-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						incluido una antraciclina, a menos que estuviera clínicamente contraindicada.			
L01BC05	INVIMA 2015M-0016472	Gemcitabina clorhidrato 11.39 mg equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 10 mg / ml solución inyectable	Solución inyectable	Comercial: caja de cartón litografiada x1 frasco vial tubular pedernal de vidrio tipo i incoloro x100 ml., tapón bromobutilo color gris oscuro, agrafe de aluminio, flip - off polipropileno color naranja, etiqueta e inserto.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama sólo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Ropsohn Therapeutics S.A.S	20080049-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2015M-0016120	Gemcitabina clorhidrato 227,8 mg equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 200 mg / 20 ml solución inyectable	Solución inyectable	Comercial: caja de cartón x1 frasco vial de vidrio tipo i incoloro x20 ml., tapón bromobutilo color gris oscuro, agrafe de aluminio, flip - off polipropileno color naranja, etiqueta e inserto.	Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama sólo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico.	Vigente	Ropsohn Therapeutics S.A.S	20080054-1
L01BC05	INVIMA 2016M-0017143	Gemcitabina hidrocloreuro equivalente a gemcitabina	Gemcitabina 1000 mg	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con un vial de vidrio de 50ml tipo i tubular incoloro con tapón de caucho gris y sello flip off de aluminio color rojo con 1000mg de gemcitabina polvo liofilizado estéril y un inserto.	Para el tratamiento de: cáncer de vejiga: gemcitabina está indicada para el tratamiento de cáncer de vejiga localmente avanzado o metastásico en combinación con cisplatino. Cáncer de páncreas: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma localmente avanzado o metastásico del páncreas. Cáncer de pulmón de células no pequeñas: gemcitabina, en combinación con cisplatino, está indicada como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (nscL, non-small cell lung cancer) localmente avanzado o metastásico. La monoterapia con	Vigente	Seven Pharma Colombia S.A.S	20090678-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>gemcitabina puede considerarse en pacientes ancianos o aquellos con estado funcional 2. Cáncer de ovario: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con carcinoma epitelial de ovario localmente avanzado o metastásico, en combinación con carboplatino, en pacientes con recaída de enfermedad tras un intervalo libre de recurrencias de al menos 6 meses después del tratamiento de primera línea basado en platino. Cáncer de mama: gemcitabina, en combinación con paclitaxel, está indicada para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama no resecable, localmente recurrente o metastásico, que han recaído luego de recibir quimioterapia adyuvante/neoadyuvante. La quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina, a menos que estuviera clínicamente contraindicada.</p>			

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2016M-0017093	Gemcitabina clorhidrato 227,707 mg equivalente a gemcitabina base	Oncogem 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un vial de vidrio tipo I por 10ml con tapon de bromobutilo gris y agrafe de aluminio.	- Cáncer de vejiga: gemcitabina está indicada para el tratamiento de cáncer de vejiga localmente avanzado o metastásico en combinación con cisplatino.- cáncer de páncreas: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma localmente avanzado o metastásico del páncreas. - cáncer de pulmón de células no pequeñas: gemcitabina, en combinación con cisplatino, está indicada como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (nscL, non-small cell lung cancer) localmente avanzado o metastásico. La monoterapia con gemcitabina puede considerarse en pacientes ancianos o aquellos con estado funcional 2. - cáncer de ovario: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con carcinoma epitelial de ovario localmente avanzado o metastásico, en combinación con carboplatino, en pacientes con recaída de enfermedad tras un intervalo libre de recurrencias de al menos 6 meses después del tratamiento de primera línea basado en platino. - cáncer de mama: gemcitabina, en combinación con paclitaxel, está indicada para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama no resecable, localmente recurrente o metastásico, que han recaído luego de recibir quimioterapia adyuvante/neoadyuvante. La quimioterapia previa debe	Vigente	Cipla Ltd.	20091316-1

Evidencia que promueve Confianza

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						haber incluido una antraciclina, a menos que estuviera clínicamente contraindicada.			
L01BC05	INVIMA 2016M-0017106	Gemcitabina clorhidrato 1138,534 equivalente a gemcitabina base	Oncogem 1000mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un vial de vidrio tipo i con tapon gris de bromobutilo y cierre de aluminio tipo flipp off que contiene polvo liofilizado esteril para reconstituir a solución inyectable.	<p>Para el tratamiento de:</p> <p>cáncer de vejiga: gemcitabina está indicada para el tratamiento de cáncer de vejiga localmente avanzado o metastásico en combinación con cisplatino.</p> <p>Cáncer de páncreas: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma localmente avanzado o metastásico del páncreas.</p> <p>Cáncer de pulmón de células no pequeñas: gemcitabina, en combinación con cisplatino, está indicada como tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (nsccl, non-small cell lung cancer) localmente</p>	Vigente	Cipla Ltd.	20092153-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>avanzado o metastásico. La monoterapia con gemcitabina puede considerarse en pacientes ancianos o aquellos con estado funcional 2.</p> <p>Cáncer de ovario: gemcitabina está indicada para el tratamiento de pacientes con carcinoma epitelial de ovario localmente avanzado o metastásico, en combinación con carboplatino, en pacientes con recaída de enfermedad tras un intervalo libre de recurrencias de al menos 6 meses después del tratamiento de primera línea basado en platino.</p> <p>Cáncer de mama: gemcitabina, en combinación con paclitaxel, está indicada para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama no resecable, localmente recurrente o metastásico, que han recaído luego de recibir quimioterapia adyuvante/neoadyuvante. La quimioterapia previa debe haber incluido una antraciclina, a menos que estuviera clínicamente contraindicada.</p>			

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2016M-0016969	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gestredos® 1000 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con frasco-ampolla de vidrio translucido e incoloro con tapón de bromobutilo no teflonado con flip off violeta.	Indicaciones: coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20096412-1
L01BC05	INVIMA 2016M-0016969	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gestredos® 1000 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 2 frascos - ampolla de vidrio translucido e incoloro con tapón de bromobutilo no teflonado con flip off violeta.	Indicaciones: coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20096412-2

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico			
L01BC05	INVIMA 2016M-0016969	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gestredos® 1000 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 5 frascos - ampolla de vidrio translucido e incoloro con tapón de bromobutilo no teflonado con flip off violeta.	Indicaciones: coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20096412-3

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2016M-0016969	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gestredos® 1000 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Uso hospitalario: caja con 10 frascos - ampolla de vidrio traslucido e incoloro con tapón de bromobutilo no teflonado con flip off violeta.	Indicaciones: coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20096412-4
L01BC05	INVIMA 2016M-0016969	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gestredos® 1000 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Uso hospitalario: caja con 50 frascos - ampolla de vidrio traslucido e incoloro con tapón de bromobutilo no teflonado con flip off violeta.	Indicaciones: coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20096412-5

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico			
L01BC05	INVIMA 2016M-0016970	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gestredos® 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con frasco-ampolla de vidrio translucido e incoloro con tapón de bromobutilo no teflonado con flip off gris.	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20096413-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2016M-0016970	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gestredos® 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 2 frascos - ampolla de vidrio traslucido e incoloro con tapón de bromobutilo no teflonado con flip off gris.	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20096413-2
L01BC05	INVIMA 2016M-0016970	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gestredos® 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 5 frascos - ampolla de vidrio traslucido e incoloro con tapón de bromobutilo no teflonado con flip off gris.	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20096413-3

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico			
L01BC05	INVIMA 2016M-0016970	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gestredos® 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Uso hospitalario: caja con 10 frascos-ampolla de vidrio traslucido e incoloro con tapón de bromobutilo no teflonado con flip off gris.	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20096413-4

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01BC05	INVIMA 2016M-0016970	Gemcitabina clorhidrato equivalente a gemcitabina base	Gestredos® 200 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Uso hospitalario: caja con 50 frascos-ampolla de vidrio translucido e incoloro con tapón de bromobutilo no teflonado con flip off gris.	Coadyudante en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar de células no pequeñas localmente avanzado o metastásico. Para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado o metastásico. Para pacientes con cáncer pancreático refractario al 5-fu. Tratamiento de cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico y/o asociado a cisplatino. Tratamiento del cáncer de mama solo o en combinación. Tratamiento de carcinoma epitelial de ovario recurrente que ha recaído después de una terapia basada en platinos. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes con cáncer de vejiga avanzado o metastásico	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20096413-5

Tabla 11. Registros sanitarios Hidroxiurea

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01XX05	INVIMA 2013M-013672-R2	Hidroxiurea	Hydrea capsulas 500 mg	Capsula dura	Frasco de vidrio color ambar por 100 capsulas	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielocítica crónica resistente, melanoma y carcinoma del ovario recurrente, metastásico o inoperable. Terapia concomitante a la radiación en el control local de carcinoma primario de células escamosas de cabeza y cuello excluyendo labio. Tratamiento de la anemia de células falciformes en pacientes que presentan más de 3 crisis dolorosas secundarias al año.	Vigente	Bristol Myers Squibb De Colombia S.A.	42034-1
L01XX05	INVIMA 2009 M-013160-R1	Hidroxiurea (hidroxicarbamida)	Hydroxyurea 500 mg capsulas	Capsula dura	Caja de carton por 10 blister por 10 capsulas duras cada uno.	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielocítica crónica resistente, melanoma y carcinoma del ovario recurrente metastásico inoperable. Terapia concomitante a la irradiación en el control local del carcinoma primario de células escamosas de cabeza y cuello, excluyendo el labio. Tratamiento de la trombocitemia esencial y de la policitemia vera. Tratamiento de la anemia de células falciformes en pacientes que presentan más de 3 crisis dolorosas secundarias al año	Vigente	Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpreparate Mbh	19901625-1
L01XX05	INVIMA 2012M-0012801	Hidroxiurea	Oxiria® 500 mg capsulas	Capsula dura	Caja x 10 cápsulas en foil de aluminio	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielocítica crónica resistente, melanoma y carcinoma del ovario recurrente,metastásico o inoperable. Terapia concomitante a la radiacion en el control local de carcinoma primario de celulas escamosas de cabeza y cuello excluyendo labio	Perdida fuerza ejec	Biotoscana Farma S.A.	20031290-1
L01XX05	INVIMA 2012M-0012801	Hidroxiurea	Oxiria® 500 mg capsulas	Capsula dura	Caja x 20 cápsulas en foil de aluminio	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielocítica crónica resistente, melanoma y carcinoma del ovario	Perdida fuerza ejec	Biotoscana Farma S.A.	20031290-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						recurrente,metastásico o inoperable. Terapia concomitante a la radiacion en el control local de carcinoma primario de celulas escamosas de cabeza y cuello excluyendo labio			
L01XX05	INVIMA 2012M-0012801	Hidroxiurea	Oxiria® 500 mg capsulas	Capsula dura	Caja x 30 cápsulas en foil de aluminio	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielocítica crónica resistente, melanoma y carcinoma del ovario recurrente,metastásico o inoperable. Terapia concomitante a la radiacion en el control local de carcinoma primario de celulas escamosas de cabeza y cuello excluyendo labio	Perdida fuerza ejec	Biotoscana Farma S.A.	20031290-3
L01XX05	INVIMA 2012M-0012801	Hidroxiurea	Oxiria® 500 mg capsulas	Capsula dura	Caja x 50 cápsulas en foil de aluminio	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielocítica crónica resistente, melanoma y carcinoma del ovario recurrente,metastásico o inoperable. Terapia concomitante a la radiacion en el control local de carcinoma primario de celulas escamosas de cabeza y cuello excluyendo labio	Perdida fuerza ejec	Biotoscana Farma S.A.	20031290-4
L01XX05	INVIMA 2012M-0012801	Hidroxiurea	Oxiria® 500 mg capsulas	Capsula dura	Caja x 100 cápsulas en foil de aluminio	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielocítica crónica resistente, melanoma y carcinoma del ovario recurrente,metastásico o inoperable. Terapia concomitante a la radiacion en el control local de carcinoma primario de celulas escamosas de cabeza y cuello excluyendo labio	Perdida fuerza ejec	Biotoscana Farma S.A.	20031290-5
L01XX05	Sin información disponible	Hidroxiurea (hidroxicarbamida)	Hidroxiurea capsula 500mg.	Capsula dura	Caja plegadiza con 10 capsulas en blister aluminio / aluminio	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielocítica crónica resistente, melanoma y carcinoma del ovario recurrente, metastásico o inoperable. Terapia concomitante a la radiación en el control local de carcinoma primario de células escamosas de cabeza y cuello excluyendo labio.	Negado	Cipla Ltd.	20089953-1
L01XX05	INVIMA M-014801	Hidroxiurea	Frenal capsulas 500mg	Capsula dura	Caja por 100 capsulas en blister, cada blister por 10 capsulas	Leucemia granulocitica cronica, varios neoplasmas incluyendo melanoma, linfoma y tumores trofoblasticos gestacionales.	Vencido	Biogen Laboratorios De Colombia S.A.	19909897-1

Tabla 12. Registros sanitarios Idarubicina

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
	M-014675	Idarubicina clorhidrato	Zavedos i.v x10 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable		Coadyudante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vencido	Pfizer S.A.S.	47810-
L01DB06	INVIMA 2004 M-014582-R1	Idarubicina hcl	Zavedos i.v. X 5 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un frasco que contiene un vial por 5 ml. Con polvo liofilizado.	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vencido	Pharmacia & Upjohn S.P.A.	47811-1
L01DB06	INVIMA 2014M-0003647-R1	Idarubicina clorhidrato	Zavedos i.v. X 10 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco vial por 10mg/10ml	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vigente	Pfizer S.A.S.	19947692-1
L01DB06	INVIMA 2005M-0004939	Clorhidrato de idarubicina	Idaralem® solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartón con frasco vial de vidrio incoloro tipo 1, capacidad 5 ml , tapón de bromobutilo color gris, tipo ventana sello d	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vencido	Lemery S.A. De C.V.	19957081-1
L01DB06	INVIMA 2006M-0006012	Idarubicina clorhidrato	Idaralen® 10 mg liofilizado para solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartón con 1 frasco vial con 10mg de principio activo, para reconstituir a 10ml, con agua para inyectable o solución de	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vencido	Lemery S.A. De C.V.	19966331-1
L01DB06	INVIMA 2007M-0007383	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina 10 mg - liofilizado para solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco vial por 10 mg en vidrio ipo i incoloro	Coadyudante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vigente	Laboratorios Biopas S.A	19974986-1
L01DB06	INVIMA 2008M-0008657	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina clorhidrato 5 mg liofilizado para solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un frasco ampolla de vidrio tipo i con liofilizado, tapon de bromobutilo y	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vigente	Laboratorios Biopas S.A	19991563-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					agrafe de aluminio flip off.				
L01DB06	INVIMA 2010M-0010952	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina 5 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 frasco ampolla de vidrio tipo i transparente de 10 ml conteniendo liofilizado, tapón de bromobu	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20013027-1
L01DB06	INVIMA 2010M-0010952	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina 5 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 5 frascos ampolla de vidrio tipo i transparente de 10 ml conteniendo liofilizado, tapón de bromobu	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20013027-2
L01DB06	INVIMA 2010M-0010952	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina 5 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 10 frascos ampolla de vidrio tipo i transparente de 10 ml conteniendo liofilizado, tapón de bromobu	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20013027-3
L01DB06	INVIMA 2010M-0010883	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina 10 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 frasco ampolla en vidrio tipo i con tapon bromobutilo y precinto de aluminio flip off conteniendo el p.liofi	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vigente	Blau Farmaceutica Colombia S.A.S	20013029-1
L01DB06	INVIMA 2010M-0010883	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina 10 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 5 frascos ampolla en vidrio tipo i con tapon bromobutilo y precinto de aluminio flip off conteniendo el p.liofi	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vigente	Blau Farmaceutica Colombia S.A.S	20013029-2

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01DB06	INVIMA 2010M-0010883	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina 10 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 10 frascos ampolla en vidrio tipo i con tapon bromobutilo y precinto de aluminio flip off conteniendo el p.liofi	Coadyuvante en el tratamiento de la leucemia mielógena aguda del adulto y leucemia linfocítica aguda en niños.	Vigente	Blau Farmaceutica Colombia S.A.S	20013029-3
L01DB06	INVIMA 2014M-0015126	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina clorhidrato 10mg/10ml	Solución concentrada para infusión	Caja con 1 vial de vidrio tipo i por 10mg/10ml.	Idarubicina clorhidrato está indicada en adultos para el tratamiento de la leucemia mielógena aguda (también conocida como leucemia mielóide o lma. Este tipo de leucemia era previamente conocido como leucemia no linfoblástica o lna), para la inducción de remisión en el relapso en pacientes no tratados o para la inducción de remisión en pacientes con relapso o refractarios. Idarubicina clorhidrato está indicado en adultos y niños para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (lla) de relapso como tratamiento de segunda línea. Idarubicina clorhidrato es comúnmente usado en los regímenes de quimioterapia de combinación que incluyen otros agentes citotóxicos.	Vigente	Sandoz Gmbh	20059550-1
L01DB06	INVIMA 2014M-0015126	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina clorhidrato 10mg/10ml	Solución concentrada para infusión	Caja con 2 viales de vidrio tipo i por 10mg/10ml.	Idarubicina clorhidrato está indicada en adultos para el tratamiento de la leucemia mielógena aguda (también conocida como leucemia mielóide o lma. Este tipo de leucemia era previamente conocido como leucemia no linfoblástica o lna), para la inducción de remisión en el relapso en pacientes no tratados o para la inducción de remisión en pacientes con relapso o refractarios. Idarubicina clorhidrato está indicado en adultos y niños para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (lla) de relapso como tratamiento de segunda línea. Idarubicina clorhidrato es comúnmente usado en los regímenes de quimioterapia de combinación que incluyen otros agentes citotóxicos.	Vigente	Sandoz Gmbh	20059550-2

Evidencia que promueve Confianza

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01DB06	INVIMA 2014M-0015126	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina clorhidrato 10mg/10ml	Solución concentrada para infusión	Caja con 3 viales de vidrio tipo i por 10mg/10ml.	Idarubicina clorhidrato está indicada en adultos para el tratamiento de la leucemia mielógena aguda (también conocida como leucemia mieloide o lma. Este tipo de leucemia era previamente conocido como leucemia no linfoblástica o lnl), para la inducción de remisión en el relapso en pacientes no tratados o para la inducción de remisión en pacientes con relapso o refractarios. Idarubicina clorhidrato está indicado en adultos y niños para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (lla) de relapso como tratamiento de segunda línea. Idarubicina clorhidrato es comúnmente usado en los regímenes de quimioterapia de combinación que incluyen otros agentes citotóxicos.	Vigente	Sandoz Gmbh	20059550-3
L01DB06	INVIMA 2014M-0015126	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina clorhidrato 10mg/10ml	Solución concentrada para infusión	Caja con 4 viales de vidrio tipo i por 10mg/10ml.	Idarubicina clorhidrato está indicada en adultos para el tratamiento de la leucemia mielógena aguda (también conocida como leucemia mieloide o lma. Este tipo de leucemia era previamente conocido como leucemia no linfoblástica o lnl), para la inducción de remisión en el relapso en pacientes no tratados o para la inducción de remisión en pacientes con relapso o refractarios. Idarubicina clorhidrato está indicado en adultos y niños para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (lla) de relapso como tratamiento de segunda línea. Idarubicina clorhidrato es comúnmente usado en los regímenes de quimioterapia de combinación que incluyen otros agentes citotóxicos.	Vigente	Sandoz Gmbh	20059550-4

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01DB06	INVIMA 2014M-0015126	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina clorhidrato 10mg/10ml	Solución concentrada para infusión	Caja con 5 viales de vidrio tipo i por 10mg/10ml.	Idarubicina clorhidrato está indicada en adultos para el tratamiento de la leucemia mielógena aguda (también conocida como leucemia mieloide o lma. Este tipo de leucemia era previamente conocido como leucemia no linfoblástica o lnl), para la inducción de remisión en el relapso en pacientes no tratados o para la inducción de remisión en pacientes con relapso o refractarios. Idarubicina clorhidrato está indicado en adultos y niños para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (lla) de relapso como tratamiento de segunda línea. Idarubicina clorhidrato es comúnmente usado en los regímenes de quimioterapia de combinación que incluyen otros agentes citotóxicos.	Vigente	Sandoz Gmbh	20059550-5
L01DB06	INVIMA 2014M-0015126	Idarubicina clorhidrato	Idarubicina clorhidrato 10mg/10ml	Solución concentrada para infusión	Caja con 10 viales de vidrio tipo i por 10mg/10ml.	Idarubicina clorhidrato está indicada en adultos para el tratamiento de la leucemia mielógena aguda (también conocida como leucemia mieloide o lma. Este tipo de leucemia era previamente conocido como leucemia no linfoblástica o lnl), para la inducción de remisión en el relapso en pacientes no tratados o para la inducción de remisión en pacientes con relapso o refractarios. Idarubicina clorhidrato está indicado en adultos y niños para el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (lla) de relapso como tratamiento de segunda línea. Idarubicina clorhidrato es comúnmente usado en los regímenes de quimioterapia de combinación que incluyen otros agentes citotóxicos.	Vigente	Sandoz Gmbh	20059550-6

Tabla 13. Registros sanitarios Ifosfamida

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
	M001238 R 1	Ifosfamida	Holoxan 500 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable		Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmon y mama y sarcomas.	Vencido	Schering gmbh & co. Produktions kg.	31710-
L01AA06	INVIMA 2009 M-001241-R3	Ifosfamida	Holoxan® 2 g.	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable	Caja con un vial de vidrio tipo iii por 2g de polvo liofilizado.	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmón y mama, sarcomas, timoma, cáncer de cervix y tumores germinales".	Vigente	Baxter oncology gmbh	31712-1
	INVIMA M-001402	Ifosfamida estéril	Ifos 2 g frasco ampolla.	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable		Tratamiento de tumores sólidos, (cervix, ovario, testículos) , sarcoma y tratamiento de linfoma, mieloma múltiple, leucemia linfocítica y leucemia granulocítica.	Vencido	Asofarma s.a.i.c.	48225-
L01AA06	M-006545	Ifosfamida	Ifos 2g inyectable liofilizado	Solución inyectable	Envase conteniendo 1 frasco ampolla	Antineoplásico	Vencido	Asofarma s.a.i.c.	60054-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01AA06	INVIMA M-011011	Ifosfamida	Ifosfamida 1 g polvo liofilizado inyectable	Polvo para reconstituir a suspensión oral	Frasco ampolla de vidrio neutro tipo iii incoloro con tapon de caucho bromobutilico y tapa precinto de aluminio por 30 ml	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y cronicas, linfomas, mieloma multiple. formas avanzadas de micosis fungoide, neuroblastoma, carcinoma de ovario y pulmon, mama y sarcomas.	Vencido	Labinco s.a	227255-1
L01AA06	INVIMA M-011020	Ifosfamida 1 g	Ifosfamida 1 g inyectable	Polvo esteril para reconstituir a solución inyectable	Frasco ampolla vidrio por 1 ampolla	Antineoplasico citotatico	Vencido	Labinco s.a	227259-1
L01AA06	INVIMA M-011021	Ifosfamida	Ifosfamida 2 g inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un frasco ampolla de vidrio x 2 g.	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma, carcinoma del ovario, pulmonr, mama y sarcomas.	Vencido	Laboratorios labinca s.a.	227264-1
L01AA06	INVIMA 2009 M-13602 R1	Ifosfamida	Holoxan inyectable 1 g	Polvo esteril para reconstituir a solución inyectable	Caja por un vial en vidrio tipo iii con 1 g de polvo estéril para solución inyectable más inserto	Coadyudante en el tratamiento de leucemias agudas y cronicas linfomas mieloma multiple formas avaladas de micosis fungoides neuroblastoma carcinoma de ovario plumonar de mama y sarcomas. Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmón, mama, sarcomas, timoma, cáncer de cervix y tumores germinales.	Vigente	Baxter oncology gmbh	19904033-1
		Ifosfamida	Ifosfamida 1 g	Solución inyectable		Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas,, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis, neuroblastoma, carcinoma de	Negado	Laboratorios richmond s.a.c.i.f	19938803-

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01AA06	INVIMA 2013M-0002822-R1	Ifosfamida	Tolcamín 1g polvo liofilizado para inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco vial por 1g en porta ampollas por 1 vial en estuche de cartulina	ovario, pulmonar, mama y sarcomas. Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmonar, mama y sarcomas.	Vigente	Tuteur s.a. C.i.f.i.a.	19939158-1
L01AA06	INVIMA 2013M-0002822-R1	Ifosfamida	Tolcamín 1g polvo liofilizado para inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco vial por 1g en porta ampollas por 2 viales en estuche de cartulina	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmonar, mama y sarcomas.	Vigente	Tuteur s.a. C.i.f.i.a.	19939158-2
L01AA06	INVIMA 2013M-0002822-R1	Ifosfamida	Tolcamín 1g polvo liofilizado para inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco vial por 1g en porta ampollas por 5 viales en estuche de cartulina	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmonar, mama y sarcomas.	Vigente	Tuteur s.a. C.i.f.i.a.	19939158-3
L01AA06	INVIMA 2005M-0004567	Ifosfamida	Ifolem® 1 g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco vial por 1g en caja de cartón	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmón y mama, sarcomas.	Vencido	Laboratorios lemerly s.a. De c.v.	19952108-1
L01AA06	INVIMA 2006M-0006405	Ifosfamida	Ifosfamida	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 25 frascos ampolla. Frasco ampolla incoloro tipo i, con capacidad de 20 ml, conteniendo 1 g de liofilizado	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias aguda y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmonar, mama y sarcomas	Perdida fuerza ejec	Laboratorios epicaris s.a.	19962734-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01AA06	INVIMA 2006M-0006405	Ifosfamida	Ifosfamida	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 50 frascos ampolla. Frasco ampolla incoloro tipo i, con capacidad de 20 ml, conteniendo 1 g de liofilizado	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias aguda y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmonar, mama y sarcomas	Perdida fuerza ejec	Laboratorios epicaris s.a.	19962734-2
L01AA06	INVIMA 2006M-0006405	Ifosfamida	Ifosfamida	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 100 frascos ampolla. Frasco ampolla incoloro tipo i, con capacidad de 20 ml, conteniendo 1 g de liofilizado	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias aguda y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmonar, mama y sarcomas	Perdida fuerza ejec	Laboratorios epicaris s.a.	19962734-3
L01AA06	INVIMA 2006M-0005980	Ifosfamida	Ifosfamida 1 g inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro, con 1 g de principio activo.	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmonar, mama y sarcomas.	Vencido	Laboratorios richmond s.a.c.i.f	19963391-1
L01AA06	INVIMA 2008M-0007695	Ifosfamida esteril	Ondofosfamida inyectable: ifosfamida 1g	Polvo esteril para reconstituir a solución inyectable	Frasco vial por 1 gramo	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmonar, mama y sarcomas.	Vigente	Biotoscana farma s.a.	19976970-1
L01AA06	INVIMA 2008M-0008992	Ifosfamida	Ifosfamida - polvo liofilizado inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x frasco ampolla	Coadyudante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas linfomas mieloma multiple formas avaladas de micosis fungoides neuroblastoma	Vigente	Laboratorios libra s.a	19995176-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
						carcinoma de ovario pulmonar de mama y sarcomas coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmón, mama, sarcomas, timoma, cáncer de cervix y tumores germinales".			
L01AA06		Ifosfamida	Ifosfamida 1g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 frasco ampolla	Coadyudante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas linfomas mieloma múltiple formas avaladas de micosis fungoides neuroblastoma carcinoma de ovario pulmonar de mama y sarcomas coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas, mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma, carcinoma de ovario, pulmón, mama, sarcomas, timoma, cáncer de cervix y tumores germinales".	Negado	Glenmark generics s.a.	20008975-1
L01AA06	INVIMA 2015M-0011286-R1	Ifosfamida	Ifosfamida 1g polvo para reconstituir a solución inyectable.	Polvo esteril para reconstituir a solución inyectable	Caja con un frasco de vidrio claro tipo i.	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma carcinoma de ovario, pulmón, y mama y sarcomas.	Vigente	Dinafarma s.a. De c.v.	20014773-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01AA06	INVIMA 2015M-0011286-R1	Ifosfamida	Ifosfamida 1g polvo para reconstituir a solución inyectable.	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 frascos ampula de vidrio (vial) por 1000 mg de polvo para reconstituir a solución inyectable. Vidrio incoloro tipo i con tapon de bromobutilo	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma carcinoma de ovario, pulmón, y mama y sarcomas.	Vigente	Dinafarma s.a. De c.v.	20014773-2
L01AA06	INVIMA 2015M-0011286-R1	Ifosfamida	Ifosfamida 1g polvo para reconstituir a solución inyectable.	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable	Caja por 5 frascos ampula de vidrio (vial) por 1000 mg de polvo para reconstituir a solución inyectable. Vidrio incoloro tipo i con tapon de bromobutilo	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma carcinoma de ovario, pulmón, y mama y sarcomas.	Vigente	Dinafarma s.a. De c.v.	20014773-3
L01AA06	INVIMA 2015M-0011286-R1	Ifosfamida	Ifosfamida 1g polvo para reconstituir a solución inyectable.	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable	Uso institucional: caja por 1 frasco ampula de vidrio (vial) x 1000 mg de polvo para reconstituir a solución inyectable. Vidrio tipo i con tapon de bromobutilo + retapa de aluminio azul liso 20 mm.	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma carcinoma de ovario, pulmón, y mama y sarcomas.	Vigente	Dinafarma s.a. De c.v.	20014773-4
L01AA06	INVIMA 2015M-0011286-R1	Ifosfamida	Ifosfamida 1g polvo para reconstituir a solución inyectable.	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable	Uso institucional: caja por 5 frasco ampula	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis	Vigente	Dinafarma s.a. De c.v.	20014773-5

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
			solución inyectable.		de vidrio (vial) x 1000 mg de polvo para reconstituir a solución inyectable. Vidrio tipo i con tapon de bromobutilo + retapa de aluminio azul liso 20 mm.	fungoides, neuroblastoma carcinoma de ovario, pulmón, y mama y sarcomas.			
L01AA06	INVIMA 2014M-0015046	Ifosfamida	Ifosfamida 1 g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 frasco vial de vidrio tipo i, ambar por 1g	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma carcinoma de ovario, pulmón, y mama y sarcomas.	Vigente	Blau farmaceutica colombia s.a.s	20062271-1
L01AA06	INVIMA 2014M-0015046	Ifosfamida	Ifosfamida 1 g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 50 frasco vial de vidrio tipo i, ambar por 1g	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma carcinoma de ovario, pulmón, y mama y sarcomas.	Vigente	Blau farmaceutica colombia s.a.s	20062271-2
L01AA06	INVIMA 2014M-0015046	Ifosfamida	Ifosfamida 1 g	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 100 frasco vial de vidrio tipo i, ambar por 1g	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma carcinoma de ovario, pulmón, y mama y sarcomas.	Vigente	Blau farmaceutica colombia s.a.s	20062271-3
L01AA06		Ifosfamida	Ifosfamida 1g liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un frasco ambar de vidrio tipo i con tapon en bromobutilo.	Coadyuvante en el tratamiento de leucemias agudas y crónicas, linfomas mieloma múltiple, formas avanzadas de micosis fungoides, neuroblastoma carcinoma de ovario, pulmón, y mama y sarcomas.	Negado	Damipe farmaceutica s.a.s	20064122-1

Tabla 14. Registros sanitarios Irinotecan

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01XX19	INVIMA 2008M-006836 R1	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Camptosar 100 mg /5ml solución inyectable.	Solución inyectable	Caja de carton x 1 frasco vial de vidrio ambar tipo i x 5 ml c/u	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica camptosar es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico, en terapia combinada con sfv y leucovorin. Util en el tratamiento de: cáncer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.	Vigente	Pfizer S.A.S.	207609-1
L01XX19	INVIMA 2008M-006836 R1	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Camptosar 100 mg /5ml solución inyectable.	Solución inyectable	Caja de carton x 1 frasco vial de polipropileno x 5 ml c/u	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica camptosar es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colorrectal metastásico, en terapia combinada con sfv y leucovorin. Util en el tratamiento de: cáncer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma	Vigente	Pfizer S.A.S.	207609-2

L01XX19	INVIMA 2008M- 006836 R1	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Camptosar 100 mg /5ml solucion inyectable.	Solucion inyectable	Caja cartón por 5 frascos vial de vidrio ámbar tipo i x 5ml c/u	<p>maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncologos.</p> <p>Tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica camptosar es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera linea en el cáncer colo-rectal metastasico, en terapia combinada con sfv y leucovorin. Util en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncologos.</p>	Vigente	Pfizer S.A.S.	207609-3
L01XX19	INVIMA 2008M- 006836 R1	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Camptosar 100 mg /5ml solucion inyectable.	Solucion inyectable	Caja cartón por 10 frascos vial de vidrio ámbar tipo i x 5ml c/u	<p>Tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica camptosar es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera linea en el cáncer colo-rectal metastasico, en terapia combinada con sfv y leucovorin. Util en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncologos.</p>	Vigente	Pfizer S.A.S.	207609-4

L01XX19	INVIMA 2008M- 006836 R1	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Camptosar 100 mg /5ml solucion inyectable.	Solucion inyectable	Caja cartón por 5 frascos vial de pp ámbar, con tapón de caucho, tapa plástica flip-off y selle de aluminio x 5ml c/u	Tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica camptosar es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera linea en el cáncer colo- rectal metastasico, en terapia combinada con sfv y leucovorin. Util en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncologos.	Vigente	Pfizer S.A.S.	207609-5
L01XX19	INVIMA 2008M- 006836 R1	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Camptosar 100 mg /5ml solucion inyectable.	Solucion inyectable	Caja cartón por 10 frascos vial de pp ámbar, con tapón de caucho, tapa plástica fl	Tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica camptosar es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera linea en el cáncer colo- rectal metastasico, en terapia combinada con sfv y leucovorin. Util en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncologos.	Vigente	Pfizer S.A.S.	207609-6
L01XX09	INVIMA M- 011621	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Camptosar 40 mg / 2 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Caja de carton con un blister con frasco vial x 2 ml de solucion	Tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reincidido o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluorouracilo, por lo	Vencido	Pharmacia & Upjohn Company	227032-1

						tanto la población para la cual se indica camptosar es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer metastásico en terapia combinada con 5 fu y leucovorin			
L01XX09	INVIMA 2003M- 0002636	Irinotecan clorhidrato	Linatecan 40 mh/2ml	Inyectables	Ampolla por 2 ml	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5- fluoracilo.	Vencido	Asofarma S.A.I.C.	19937969- 1
L01XX19	INVIMA 2014M- 0002734- R1	Irinotecan clorhidrato trihidrato equivalente a irinotecan clorhidrato	Linatecan® 100 mg /5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Caja x 1 frasco ampolla (vial) de vidrio ámbar tipo i con tapón de caucho (bromobutilo teflonado) y precinto.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica éste producto es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colo-rectal metastásico, en terapia combinada con 5-fu y leucovorin. Útil en el tratamiento de: cáncer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.	Vigente	Asofarma S.A.I. Y C	19938138- 1
L01XX19	INVIMA 2014M- 0002734- R1	Irinotecan clorhidrato trihidrato equivalente a irinotecan clorhidrato	Linatecan® 100 mg /5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Frasco ampolla, vidrio ambar por 5 ml. Caja plegadiza por 2 frascos ampolla.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica éste producto es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colo-rectal metastásico, en terapia combinada con 5-fu y leucovorin. Útil en el tratamiento de: cáncer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino,	Vigente	Asofarma S.A.I. Y C	19938138- 2

						cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.			
L01XX19	INVIMA 2014M- 0002734- R1	Irinotecan clorhidrato trihidrato equivalente a irinotecan clorhidrato	Linatecan® 100 mg /5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Frasco ampolla, vidrio ambar por 5 ml. Caja plegadiza por 3 frascos ampolla.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica éste producto es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colo-rectal metastásico, en terapia combinada con 5-fu y leucovorin. Útil en el tratamiento de: cáncer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.	Vigente	Asofarma S.A.I. Y C	19938138- 3
L01XX19	INVIMA 2014M- 0002734- R1	Irinotecan clorhidrato trihidrato equivalente a irinotecan clorhidrato	Linatecan® 100 mg /5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Frasco ampolla, vidrio ambar por 5 ml. Caja plegadiza por 4 frascos ampolla.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica éste producto es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colo-rectal metastásico, en terapia combinada con 5-fu y leucovorin. Útil en el tratamiento de: cáncer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o	Vigente	Asofarma S.A.I. Y C	19938138- 4

						recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.			
L01XX19	INVIMA 2014M- 0002734- R1	Irinotecan clorhidrato trihidrato equivalente a irinotecan clorhidrato	Linatecan® 100 mg /5 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Frasco ampolla, vidrio ambar por 5 ml. Caja plegadiza por 5 frascos ampolla.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica éste producto es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colo-rectal metastásico, en terapia combinada con 5-fu y leucovorin. Útil en el tratamiento de: cáncer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.	Vigente	Asofarma S.A.I. Y C	19938138- 5
L01XX09	INVIMA 2005M- 0004191	Irinotecan clorhidrato trihidrato (equivalente a 100mg de irinotecan clorhidrato anhidro)	Irinotecan sadoz® 100 mg inyectable endovenoso	Solucion inyectable	Caja x 1 frasco vial de 5ml x 100mg, de vidrio neutro tratado ambar, solvente: frasco de vidrio neutro tratado de 5 ml.	Tratamiento de canceres colorrectales metastasicos que hubieran progresado o presentado recurrencia despues de un tratamiento previo efectuado segun las modalidades usuales que incluyan 5 fluorouracilo. Tratamiento de cancer colorectal metastasico como monoterapia o en combinacion con fluoruracilo.	Perdida fuerza ejec	Sandoz S.A.	19948233- 1
L01XX19	INVIMA 2016M- 0004826- R1	Clorhidrato de irinotecan trihidrato	Clorhidrato de irinotecan trihidrato 100 mg / 5 ml	Solucion inyectable	Caja por 1 frasco ampolla en vidrio tipo i ambar con tapon gris de bromobutilo con tapa flip off.	Tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica el producto es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera linea en el cáncer colo-rectal metastasico, en terapia combinada con 5-fu y leucovorina. Util	Vigente	Blau Farmaceutica Colombia S.A.S	19952096- 1

Evidencia que promueve Confianza

						en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.			
L01XX19	INVIMA 2016M- 0004826- R1	Clorhidrato de irinotecan trihidrato	Clorhidrato de irinotecan trihidrato 100 mg / 5 ml	Solucion inyectable	Caja por 5 frascos ampolla en vidrio tipo i ambar con tapon gris de bromobutilo con tapa flip off.	Tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica el producto es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera linea en el cáncer colo-rectal metastasico, en terapia combinada con 5-fu y leucovorina. Util en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.	Vigente	Blau Farmaceutica Colombia S.A.S	19952096- 2
L01XX19	INVIMA 2016M- 0004826- R1	Clorhidrato de irinotecan trihidrato	Clorhidrato de irinotecan trihidrato 100 mg / 5 ml	Solucion inyectable	Caja por 10 frascos ampolla en vidrio tipo i ambar con tapon gris de bromobutilo con tapa flip off.	Tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica el producto es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera linea en el cáncer colo-rectal metastasico, en terapia combinada con 5-fu y leucovorina. Util en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer	Vigente	Blau Farmaceutica Colombia S.A.S	19952096- 3

Evidencia que promueve Confianza

L01XX19	INVIMA 2006M- 0005823	Clorhidrato de irinotecan trihidrato	Tarckorin® 100mg	Solucion inyectable	Caja con vial por 5ml en vidrio tipo i, color ámbar, y tapon teflonado y precinto de seguridad	de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos. Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya recaído o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5 -flurouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica camptosar es aquella que no responde al tratamiento antes citado.	Perdida fuerza ejec	Merck S.A.	19962979- 1
L01XX19	INVIMA 2006M- 0006230	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinotecan libra solucion inyectable	Solucion inyectable	Caja de carton por 1 frasco, con 5ml.	Util en el tratamiento de: · cáncer de las células no pequeñas del pulmón. · cáncer de las células pequeñas del pulmón. · cáncer del cuello uterino. · cáncer ovárico. · cáncer gástrico inoperable o recurrente. · cáncer de esófago. · cáncer de seno inoperable o recurrente. · carcinoma de células escamosas de la piel · melanoma maligno. · linfoma maligno · cáncer de páncreas · glioma. Manejo por oncólogos	En tramite renov	Laboratorios Libra S.A	19966333- 1

						<p>util en el tratamiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> · cáncer de las células no pequeñas del pulmón. · cáncer de las células pequeñas del pulmón. · cáncer del cuello uterino. · cáncer ovárico. · cáncer gástrico inoperable o recurrente. · cáncer de esófago. · cáncer de seno inoperable o recurrente. · carcinoma de células escamosas de la piel <ul style="list-style-type: none"> · melanoma maligno. · linfoma maligno · cáncer de páncreas · glioma. <p>Manejo por oncólogos</p>			
L01XX19	INVIMA 2006M- 0006371	Irinotecan	Irinotecan	Solución concentrada para infusión	Caja con 1 vial por 5 ml	<p>Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reincidento o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluorouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica camptosar es aquella que no responde al tratamiento antes citado.</p>	En trámite renov	Fresenius Kabi Oncology Limited	19967207- 1
L01XX19	INVIMA 2006M- 0006606	Clorhidrato de irinotecán trihidratado	Irinotecán 100 mg / 5 ml solución inyectable	Solución inyectable	Caja por un frasco vial color ambar de vidrio tipo i por 5ml	<p>Acta 6/2000 (2.7.1)</p> <p>el irinotecan en combinación con 5-fluorouracilo y leucovorina esta indicado como un componente de la</p>	En trámite renov	Glenmark Generics S.A.- Pilar Plant.	19968461- 1

						primera línea de tratamiento para los pacientes afectados por carcinomas metastásicos de colon o recto.			
L01XX19	INVIMA 2007M- 0006990	Irinotecan clorhidrato (trihidrato)	Irinotecan	Solucion inyectable	Caja por 1 frasco ampolla de 5 ml	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reincidento o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5 -flurouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica el producto es aquella que no responde al tratamiento antes citado.	Vencido	Laboratorios Biopas S.A	19973304- 1
L01XX19	INVIMA 2007M- 0007091	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinotel 40 mg/ 2 ml	Solucion inyectable	Caja por un vial de vidrio tipo i ambar x 2 ml.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reincidento o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5 -flurouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica camptosar es aquella que no responde al tratamiento antes citado.	Vencido	Fresenius Kabi Oncology Limited	19974846- 1
L01XX19	INVIMA 2007M- 0007168	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Oncotan inyectable	Solucion inyectable	Caja por un vial de vidrio tipo i por 5 ml.	Está indicada en el tratamiento de cánceres colorrectales metastásicos que hubieran progresado o presentado recurrencia después de un tratamiento previo efectuado según las modalidades usuales que incluyen 5-fluorouracilo. Tratamiento de cáncer colorrectal metastásico como monoterapia o en combinación con fluorouracilo.	En tramite renov	Biotoscana Farma S.A.	19975612- 1
L01XX19	INVIMA 2007M- 0007169	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Oncotan inyectable	Solucion inyectable	Caja por un frasco vial de vidrio tipo i por 2 ml.	Está indicada en el tratamiento de cánceres colorrectales metastásicos que hubieran progresado o presentado recurrencia después de un tratamiento previo efectuado según las modalidades usuales que incluyen 5-fluorouracilo. Tratamiento de cáncer colorrectal metastásico como monoterapia o en combinación con fluorouracilo.	En tramite renov	Biotoscana Farma S.A.	19975613- 1
L01XX19	INVIMA 2007M- 0007426	Irinotecan clorhidrato (trihidrato)	Neotecan®	Solucion inyectable	Caja por un frasco ampolla en vidrio ambar tipo i	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reincidento o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5 -flurouracilo. Por lo	Vigente	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19976711- 1

						tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento previo con 5 fluorouracilo.			
L01XX19	INVIMA 2008M- 0007854	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Camptolem 100 mg/ 5 ml	Solucion inyectable	Caja de carton con un frasco ambar en vidrio tipo i con tapon en bromobutilo y sello conteniendo 5 ml de la solucion inyectable	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reinicido o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5 -flurouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento previo con 5 flurouracilo.	Vigente	Lemery S.A. De C.V.	19984431- 1
L01XX19	INVIMA 2009M- 0009111	Clorhidrato de irinotecan trihidratado equivalente a 100mg de clorhidrato de irinotecan	Irinkan 100mg/5ml solución inyectable	Solucion inyectable	Caja con un frasco vial de vidrio tipo i con 5ml de solución inyectable	Tratamiento de segunda línea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica irinkan es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera linea en el cancer colo-rectal metastasisico, en terapia combinada con 5fu y leucovorin. Util en el tratamiento de: cancer de las celulas no pequeñas del pulmon, cancer del cuello uterino, cancer ovarico, cancer gastrico inoperable o recurrente, cancer de esofago, cancer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de celulas escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cancer de pancreas, glioma, manejo por oncologos.	Vigente	Laboratorios Pisa S.A. De C.V.	19993941- 1
L01XX19	INVIMA 2008M- 0008955	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinocyt 100 mg/5ml solución inyectable	Solucion inyectable	Caja por vial por 5 ml.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reinicido o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5 -flurouracilo.	Vigente	Vitalchem Laboratories De Colombia S.A.	19994634- 1
L01XX19	INVIMA 2008M- 0008955	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinocyt 100 mg/5ml solución inyectable	Solucion inyectable	plegadiza con frsco de vidrio tipo i. Vial por 100 mg / 5 ml solucion inyectable.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reinicido o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5 -flurouracilo.	Vigente	Vitalchem Laboratories De Colombia S.A.	19994634- 2
L01XX19	INVIMA 2009M- 0010248	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinotecan clorhidrato trihidrato sandoz 100	Solucion inyectable	Caja plegadiza con 1 frasco vial de vidrio color ambar tipo i con	Tratamiento de segunda línea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia	Vigente	Sandoz S.A.	20006752- 1

			mg solución inyectable		100 mg/5ml de irinotecan clorhidrato trihidrato	previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colo-rectal metastásico, en terapia combinada con 5fu y leucovorin. Util en el tratamiento de: cáncer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovarico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.			
L01XX19	INVIMA 2010M-0010397	Irinotecan clorhidrato trihidrato equivalente a de irinotecan clorhidrato	Labdosa fixano solución inyectable	Solución inyectable	1 frasco vial 5 ml vidrio tipo 1 ambar con tapon de bromobutilo y precinto de aluminio dentro de un estuche y con inserto	Irinotecan clorhidrato trihidrato indicaciones: irinotecan 100mg está indicado en el tratamiento de cánceres colorectales metastásicos que hubieran progresado o presentado recurrencia después de un tratamiento previo efectuado según las modalidades usuales que incluyen 5-fluorouracilo. Tratamiento del cáncer colorectal metastásico como monoterapia o en combinación con fluorouracilo.	Vigente	Laboratorio Dosa S.A.	20007774-1
L01XX19	INVIMA 2010M-0010397	Irinotecan clorhidrato trihidrato equivalente a de irinotecan clorhidrato	Labdosa fixano solución inyectable	Solución inyectable	5 frascos vial 5 ml vidrio tipo 1 ambar con tapon de bromobutilo y precinto de aluminio dentro de un estuche y con inserto	Irinotecan clorhidrato trihidrato indicaciones: irinotecan 100mg está indicado en el tratamiento de cánceres colorectales metastásicos que hubieran progresado o presentado recurrencia después de un tratamiento previo efectuado según las modalidades usuales que incluyen 5-fluorouracilo. Tratamiento del cáncer colorectal metastásico como monoterapia o en combinación con fluorouracilo.	Vigente	Laboratorio Dosa S.A.	20007774-2
L01XX19	INVIMA 2010M-0010397	Irinotecan clorhidrato trihidrato equivalente a de irinotecan clorhidrato	Labdosa fixano solución inyectable	Solución inyectable	10 frascos vial 5 ml vidrio tipo 1 ambar con tapon de bromobutilo y precinto de aluminio dentro de un estuche y con inserto	Irinotecan clorhidrato trihidrato indicaciones: irinotecan 100mg está indicado en el tratamiento de cánceres colorectales metastásicos que hubieran progresado o presentado recurrencia después de un tratamiento previo efectuado según las modalidades usuales que incluyen 5-fluorouracilo.	Vigente	Laboratorio Dosa S.A.	20007774-3

L01XX19	INVIMA 2010M- 0010397	Irinotecan clorhidrato trihidrato equivalente a de irinotecan clorhidrato	Labdosa fixano solucion inyectable	Solucion inyectable	100 frascos vial 5 ml vidrio tipo 1 ambar con tapon de bromobutilo y precinto de aluminio dentro de un estuche y con inserto	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico como monoterapia o en combinación con fluorouracilo. Irinotecan clorhidrato trihidrato indicaciones: irinotecan 100mg está indicado en el tratamiento de cánceres colorectales metastásicos que hubieran progresado o presentado recurrencia después de un tratamiento previo efectuado según las modalidades usuales que incluyen 5-fluorouracilo. Tratamiento del cáncer colorectal metastásico como monoterapia o en combinación con fluorouracilo.	Vigente	Laboratorio Dosa S.A.	20007774- 4
L01XX19	INVIMA 2010M- 0010521	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinotecan 100mg/5ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Caja por vial en vidrio tipo i de 5ml.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colorectal metastático, en terapia combinada con sfv y leucovorin. Útil en el tratamiento de: cáncer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.	Vigente	Fresenius Kabi S.A	20009900- 1
L01XX19	INVIMA 2010M- 0010621	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinotecan solución para inyeccion vial por 100 mg/5 ml	Solucion inyectable	Caja plegadiza con un vial de vidrio ambar tipo i usp, tapon de caucho y sello de aluminio, por 5 ml de solución inyectable.	Tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera linea en el cancer colo-rectal metastasico, en terapia combinada con 5fu y leucovorin. Util en el tratamiento de: cancer de las celulas no pequeñas	Vigente	Venus Remedies Limited	20010926- 1

						del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.			
L01XX19	INVIMA 2010M- 0010605	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Blastovin solución inyectable	Solución inyectable	Un frasco ampolla ámbar por 5ml, tapón de caucho bromobutilo b/20, precinto flip off garnet b/20	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya recaído o progresado luego de la quimioterapia previa basada en 5-fluorouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colo-rectal metastásico, en terapia combinada con 5-fu y leucovorin. Útil en el tratamiento de: cáncer de células no- pequeñas del pulmón. Cáncer de cuello uterino. Cáncer de ovario. Cáncer gástrico inoperable o recurrente. Cáncer de esófago. Cáncer de seno inoperable o recurrente. Carcinoma de células escamosas de la piel. Melanoma maligno. Linfoma maligno. Cáncer de páncreas. Glioma. Manejo por oncólogos.	Vigente	Tuteur S.A.C.I.F.I.A.	20012621- 1
L01XX19	INVIMA 2016M- 0010965- R1	Irinotecan (clorhidrato trihidrato)	Irinotecan solución inyectable 100 mg / 5 ml	Solución inyectable	Caja por un vial ámbar de vidrio tipo i de 5 ml con tapón y precinto de aluminio con flip off blanco.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya recaído o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluorouracilo. Útil en el tratamiento de cáncer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer de las células pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel,	Vigente	Grupo Unipharm S.A. Y/O Laboratorios Uni S.A.	20012770- 1

L01XX19	INVIMA 2010M- 0010932	Irinotecan clorhidrato (trihidrato)	Irinotecan (clorhidrato- trihidrato) solución inyectable 100 mg/5ml	Solución inyectable	Caja con frasco de vidrio tipo i por 5 ml	melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos. Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya recaído o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5 -flurouracilo. Util en el tratamiento de: cáncer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer de las células pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.	Vencido	Medimex S.A.	20018486- 1
L01XX19	INVIMA 2011M- 0012224	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinotecan ebewe 20 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja x 1 vial de vidrio ambar tipo i por 5 ml .	Act 02/2011(3.1.6.3): ind ci posolog norma cond vent tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5- fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica es aquella que no responde al tratamiento con 5 flurouracilo.	Vencido	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20025051- 1
L01XX19	INVIMA 2011M- 0012224	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinotecan ebewe 20 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja x 5 viales de vidrio ambar tipo i por 5 ml .	Act 02/2011(3.1.6.3): ind ci posolog norma cond vent tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5- fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica es aquella que no responde al tratamiento con 5 flurouracilo.	Vencido	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20025051- 2
L01XX19	INVIMA 2011M- 0012224	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinotecan ebewe 20 mg/ml	Solución concentrada para infusión	Caja x 10 viales de vidrio ambar tipo i por 5 ml .	Act 02/2011(3.1.6.3): ind ci posolog norma cond vent tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5- fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica es aquella que no	Vencido	Ebewe Pharma Ges.M.B.H Nfg. Kg	20025051- 3

Evidencia que promueve Confianza

L01XX19	INVIMA 2012M- 0013755	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinotecan clorhidrato trihidrato 100 mg/5ml	Solucion inyectable	Caja con un frasco ampolla x 5 ml de solución inyectable en vidrio tipo i ámbar con tapón de bromobutilo color gris, precinto de	responde al tratamiento con 5 flurouracilo. Tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica camptosar es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera linea en el cáncer colo- rectal metastasico, en terapia combinada con 5-fu y leucovorin. Util en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncologos.	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A.	20045957- 1
L01XX19	INVIMA 2013M- 0014456	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinotecan clorhidrato inyectable 100 mg / 5 ml	Solucion inyectable	Caja por 1 frasco vial de vidrio tipo i color ambar por 5 ml con tapon de bromobutilo y agrafe de aluminio	Tratamiento de segunda linea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la poblacion para la cual se indica este producto es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera linea en el cáncer colo-rectal metastasico, en terapia combinada con 5-fu y leucovorin. Util en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncologos.	Vigente	Ropsohn Therapeutics S.A.S	20053624- 1

L01XX19	INVIMA 2013M- 0014556	Irinotecan clorhidrato trihidrato	Irinotecan 100 mg / 5 ml	Solución concentrada para infusión	Caja x vial de vidrio ambar tipo 1, con tapón bromobutilo, tapa de aluminio con disco de polipropileno x 5 ml.	Tratamiento de segunda línea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colo- rectal metastásico, en terapia combinada con sfv y leucovorin. Util en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.	Vigente	Actavis Group Ptc Ehf	20055733- 1
L01XX19		Clorhidrato de irinotecán trihidratado	Recartec® 100mg/5ml	Solucion inyectable	Caja por un frasco de vidrio ámbar tipo i de 5ml, tapón gris de goma de butil y sello de aluminio.	Información tomada del acta no. 25 de 2014, numeral 3.13.7: tratamiento de segunda línea en cancer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colo- rectal metastásico, en terapia combinada con sfv y leucovorin. Util en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.	Negado	Hospira Inc	20094578- 1
L01XX19		Clorhidrato de	Recartec® 40mg/2ml	Solucion inyectable	Caja por un vial	Tratamiento de segunda línea en cancer de colon o recto en pacientes	Negado	Hospira Inc.	20094584- 1

		irinotecan trihidrato				cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa basada en 5-fluoracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento antes citado. Tratamiento de primera línea en el cáncer colorectal metastásico, en terapia combinada con sfv y leucovorin. Util en el tratamiento de: cancer de las células no pequeñas del pulmón, cáncer del cuello uterino, cáncer ovárico, cáncer gástrico inoperable o recurrente, cáncer de esófago, cáncer de seno inoperable o recurrente, carcinoma de células escamosas de la piel, melanoma maligno, linfoma maligno, cáncer de páncreas, glioma, manejo por oncólogos.			
L01XX19	INVIMA 2016M-0017111	Irinotecan cl0rhidrato trihidrato	Itoxaril solución inyectable	Solucion inyectable	Caja con frasco ampolla de vidrio tipo i traslucido, color ámbar y tapón de bromobutilo teflonado con flip off rojo en cuna de poliestireno termoformado blanco.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa, basada en 5-fluouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento previo con 5 fluouracilo.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097892-1
L01XX19	INVIMA 2016M-0017111	Irinotecan cl0rhidrato trihidrato	Itoxaril solución inyectable	Solucion inyectable	Caja con 2 frascos ampolla de vidrio tipo i traslucido, color ámbar y tapón de bromobutilo teflonado con flip off rojo en cuna de poliestireno termoformado blanco.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa, basada en 5-fluouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento previo con 5 fluouracilo.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097892-2
L01XX19	INVIMA 2016M-0017111	Irinotecan cl0rhidrato trihidrato	Itoxaril solución inyectable	Solucion inyectable	Caja con 3 frascos ampolla de vidrio tipo i traslucido, color ámbar y tapón de bromobutilo	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa, basada en 5-fluouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097892-3

					teflonado con flip off rojo en cuna de poliestireno termoformado blanco.	irinotecan es aquella que no responde al tratamiento previo con 5 fluoracilo.			
L01XX19	INVIMA 2016M- 0017111	Irinotecan cl0rhidrato trihidrato	Itoxaril solución inyectable	Solucion inyectable	Caja con 4 frascos ampolla de vidrio tipo i traslucido, color ámbar y tapón de bromobutilo teflonado con flip off rojo en cuna de poliestireno termoformado blanco.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa, basada en 5-fluouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento previo con 5 fluoracilo.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097892- 4
L01XX19	INVIMA 2016M- 0017111	Irinotecan cl0rhidrato trihidrato	Itoxaril solución inyectable	Solucion inyectable	Caja con 5 frascos ampolla de vidrio tipo i traslucido, color ámbar y tapón de bromobutilo teflonado con flip off rojo en cuna de poliestireno termoformado blanco.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa, basada en 5-fluouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento previo con 5 fluoracilo.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097892- 5
L01XX19	INVIMA 2016M- 0017111	Irinotecan cl0rhidrato trihidrato	Itoxaril solución inyectable	Solucion inyectable	Uso hospitalario: caja con 10 frascos ampolla de vidrio tipo i traslucido, color ámbar y tapón de bromobutilo teflonado con flip off rojo en cuna de poliestireno termoformado blanco.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa, basada en 5-fluouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento previo con 5 fluoracilo.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097892- 6
L01XX19	INVIMA 2016M- 0017111	Irinotecan cl0rhidrato trihidrato	Itoxaril solución inyectable	Solucion inyectable	Uso hospitalario: caja con 20 frascos ampolla de vidrio tipo i traslucido, color ámbar y tapón de bromobutilo teflonado con flip	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa, basada en 5-fluouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento previo con 5 fluoracilo.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097892- 7

					off rojo en cuna de poliestireno termoformado blanco.				
L01XX19	INVIMA 2016M- 0017111	Irinotecan cl0rhidrato trihidrato	Itoxaril solución inyectable	Solucion inyectable	Uso hospitalario: caja con 50 frasco ampolla de vidrio tipo i traslucido, color ámbar y tapón de bromobutilo teflonado con flip off rojo en cuna de poliestireno termoformado blanco.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa, basada en 5-fluouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento previo con 5 fluouracilo.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097892- 8
L01XX19	INVIMA 2016M- 0017111	Irinotecan cl0rhidrato trihidrato	Itoxaril solución inyectable	Solucion inyectable	Uso hospitalario: caja con 100 frascos ampolla de vidrio tipo i traslucido, color ámbar y tapón de bromobutilo teflonado con flip off rojo en cuna de poliestireno termoformado blanco.	Tratamiento de segunda línea en cáncer de colon o recto en pacientes cuya enfermedad haya reiniciado o progresado luego de quimioterapia previa, basada en 5-fluouracilo. Por lo tanto la población para la cual se indica irinotecan es aquella que no responde al tratamiento previo con 5 fluouracilo.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097892- 9

Tabla 15. Registros sanitarios Megestrol

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
G03AC05	INVIMA 2006M-003360 -R1	Acetato de megestrol	Megace suspensión oral 40 mg/ml	Suspensión oral	Caja con un frasco x 240 ml.. Frasco de polietileno.	Anorexia,caquexia o perdida significativa e inexplicable de peso en pacientes con un diagnostico de sindrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)	Perdida fuerza ejec	Bristol Myers Squibb De Colombia S.A.	11737-1
	INVIMA M-002597	Acetato de megestrol	Megestrol 160 mg. (tabletas)	Tableta		Coadyudante en el tratamiento de carcinoma metastásico de edometria	Vencido	Laboratorio Blaskoy Ltda	11764-
L02AB01	INVIMA 2007 M-010105 R2	Acetato de megestrol	Megace tabletas 160 mg	Tableta	Caja de cartulina con un frasco de vidrio ambar, tapon de algodón, tapa de pp por 30 tabletas.	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de mama, caquexia en pacientes con cáncer o vih y anorexia.	Cancelado	Bristol Myers Squibb De Colombia S.A.	30876-1
	M-001465-R1	Acetato de megestrol	Megace tabletas 40 mg	Tableta		Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico del endometrio. Tratamiento de caquexia asociada a cancer y sida.	Vencido	Bristol Myers Squibb De Colombia S.A.	40080-
G03AC05	INVIMA M-013084	Acetato de megestrol micronizado	Asoterón 40 mg	Tableta	Caja con 10 comprimidos en blister de pvc inactinico/aluminio	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio	Vencido	Asofarma S.A.I. Y C.	229985-1
G03AC05	INVIMA M-013084	Acetato de megestrol micronizado	Asoterón 40 mg	Tableta	Caja con 20 comprimidos en blister de pvc inactinico/aluminio	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio	Vencido	Asofarma S.A.I. Y C.	229985-2
G03AC05	INVIMA M-013084	Acetato de megestrol micronizado	Asoterón 40 mg	Tableta	Caja con 30 comprimidos en blister de pvc inactinico/aluminio	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio	Vencido	Asofarma S.A.I. Y C.	229985-3
G03AC05	INVIMA M-013084	Acetato de megestrol micronizado	Asoterón 40 mg	Tableta	Caja con 50 comprimidos en blister de pvc inactinico/aluminio	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio	Vencido	Asofarma S.A.I. Y C.	229985-4
G03AC05	INVIMA M-013084	Acetato de megestrol micronizado	Asoterón 40 mg	Tableta	Caja con 100 comprimidos en	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio	Vencido	Asofarma S.A.I. Y C.	229985-5

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					blister de pvc inactivo/aluminio				
G03AC05	INVIMA M-012004	Megestrol acetato	Acetato de megestrol 160 mg	Tableta	Caja por 30 tabletas	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio.	Vencido	Pharma Chemie B.V.	230239-1
G03AC05	INVIMA M-013061	Acetato de megestrol micronizado	Asoteron 160 mg	Tableta	Blister por 10 comprimidos en estuches por 10 comprimidos	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de mama, caquexia en pacientes con cancer o vih y anorexia. *uso de especialista.	Vencido	Asofarma S.A.I. Y C.	230397-1
G03AC05	INVIMA M-013061	Acetato de megestrol micronizado	Asoteron 160 mg	Tableta	Blister por 10 comprimidos en estuches por 30 comprimidos	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de mama, caquexia en pacientes con cancer o vih y anorexia. *uso de especialista.	Vencido	Asofarma S.A.I. Y C.	230397-2
G03AC05	INVIMA M-013061	Acetato de megestrol micronizado	Asoteron 160 mg	Tableta	Caja plegadiza por 50 comprimidos	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de mama, caquexia en pacientes con cancer o vih y anorexia. *uso de especialista.	Vencido	Asofarma S.A.I. Y C.	230397-3
G03AC05	INVIMA M-013061	Acetato de megestrol micronizado	Asoteron 160 mg	Tableta	Caja plegadiza por 100 comprimidos	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de mama, caquexia en pacientes con cancer o vih y anorexia.	Vencido	Asofarma S.A.I. Y C.	230397-4

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						*uso de especialista.			
G03AC05	INVIMA M-13889	Megestrol (en forma de acetato)	Acetato de megestrol 160 mg comprimidos	Tableta	Caja x 30 comprimidos recubiertos en envase blister al-pvc x 10 unidades cada blister	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio	Cancelado	Laboratorios Filaxis S.A.	19901798-1
G03AC05	INVIMA M-014936	Acetato de megestrol	Megestrol 160 mg tabletas	Tableta	Caja x 30 tabletas	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio, coadyuvante en el tratameinto de carcionoms de mama, caquexia en pacientes con cancer o vih i anorexia	Vencido	Lemery S.A. De C.V.	19913292-1
G03AC05	INVIMA M-014936	Acetato de megestrol	Megestrol 160 mg tabletas	Tableta	Sobre de celopolial 130 mm en caja x 100 tabletas	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastasico de endometrio, coadyuvante en el tratameinto de carcionoms de mama, caquexia en pacientes con cancer o vih i anorexia	Vencido	Lemery S.A. De C.V.	19913292-2
G03AC05	INVIMA 2009M-0009817	Megestrol acetato	Megaplex	Tableta	Caja x 30 tabletas en blister pvc/alu	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma metastásico de endometrio, coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de mama, caquexia en pacientes con cáncer o vih y anorexia.	Vigente	Pharmachemie B.V.	20004640-1

Tabla 16. Registros sanitarios Melfalán

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01AA03	INVIMA 2016 M-005467-R3	Melfalan	Alkeran® 2 mg tabletas	Tableta cubierta con película	Frasco de vidrio ambar tipo iii por 25 comprimidos con tapa plástica.	Tratamiento del mieloma multiple y del adenocarcinoma ovarico avanzado, carcinoma avanzado de mama, melanoma maligno y sarcoma localizado en tejido blando	Vigente	Aspen Labs S.A. De C.V., Mexico	46265-1
L01AA03	INVIMA 2008 M-010510 R1	Melfalan	Alkeran® inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja con un vial en vidrio neutro con tapon de bromobutilo y agrafe en aluminio conteniendo el liofilizado; vial 10 ml de solv.	Tratamiento del mieloma y del adeocarcinoma ovarico avanzado, carcinoma avanzado de mama, melanoma maligno y sarcoma localizado en tejido blando.	Vigente	Aspen Labs S.A. De C.V., Mexico	218558-1
L01AA03	INVIMA 2017M-0017637	Melfalan equivalente a melfalan anhidro	Melfaseven	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja con un vial con el producto de vidrio transparente tipo i, con tapón de caucho gris, agrafe y tapa plástica y un vial con solvente para el producto de vidrio transparente tipo i, con tapón de caucho gris, agrafe y tapa plástica	Tratamiento del mieloma y del adeocarcinoma ovarico avanzado, carcinoma avanzado de mama, melanoma maligno y sarcoma localizado en tejido blando.	Vigente	Seven Pharma Colombia S.A.S	20109103-1

Tabla 17. Registros

sanitarios Mesna

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
V03AF01	INVIMA 2007 M-009635 R-2	Mesna	Uromitexan 400 mg ampollas	Solucion inyectable	Ampolla de vidrio por 4 ml., en caja por 15 ampollas	Prevención de la toxicidad de las oxazofosfamidias (ciclofosfamida e ifosofamida) a nivel de las vias urinarias.	Vigente	Baxter Oncology GmbH	24063-1
V03AF01	INVIMA 2013M-0014153	Mesna (mercapto etano sulfonato sodico)	Mesna 200 mg / 2 ml	Solucion inyectable	Caja por 3 ampollas en vidrio tipo i translucido	Para la prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorrágica, microhematuria y macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A	20049364-1
V03AF01	INVIMA 2013M-0014153	Mesna (mercapto etano sulfonato sodico)	Mesna 200 mg / 2 ml	Solucion inyectable	Caja por 10 ampollas en vidrio tipo i translucido	Para la prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorrágica, microhematuria y macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A	20049364-2
V03AF01	INVIMA 2013M-0014153	Mesna (mercapto etano sulfonato sodico)	Mesna 200 mg / 2 ml	Solucion inyectable	Caja por 100 ampollas en vidrio tipo i translucido	Para la prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorrágica, microhematuria y macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A	20049364-3
V03AF01	INVIMA 2014M-0015383	Mesna	Mesna x 400mg	Solucion inyectable	Caja x 5 ampollas por 4ml	Para la prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorrágica, microhematuria y macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20066044-1
V03AF01	INVIMA 2014M-0015383	Mesna	Mesna x 400mg	Solucion inyectable	Caja x 10 ampollas por 4ml	Para la prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorrágica, microhematuria y	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20066044-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.			
V03AF01	INVIMA 2014M-0015383	Mesna	Mesna x 400mg	Solucion inyectable	Caja x 50 ampollas por 4ml	Para la prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorrágica, microhematuria y macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20066044-3
V03AF01	INVIMA 2016M-0016935	Mesna	Mesna	Solucion inyectable	Caja por 5 ampollas de vidrio tipo i de 4ml cada una.	Para la prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorrágica, microhematuria y macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.	Vigente	Claris Inyectables Limited	20079204-1
V03AF01	INVIMA 2016M-0016935	Mesna	Mesna	Solucion inyectable	Caja por 10 ampollas de vidrio tipo i de 4ml cada una.	Para la prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorrágica, microhematuria y macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.	Vigente	Claris Inyectables Limited	20079204-2
V03AF01	INVIMA 2016M-0016935	Mesna	Mesna	Solucion inyectable	Caja por 25 ampollas de vidrio tipo i de 4ml cada una.	Para la prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorrágica, microhematuria y macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.	Vigente	Claris Inyectables Limited	20079204-3
V03AF01	INVIMA 2015M-0016338	Mesna	Novacarel	Solucion inyectable	Caja x 5 ampollas de vidrio incoloro por 4 ml c/u	Prevención de la toxicidad de las oxazofosfamidas (ciclofosfamida e isofosfamida) a nivel de las vías urinarias.	Vigente	Pisa Farmacéutica Mexicana S.A. De C.V.	20085281-1
V03AF01	INVIMA 2016M-0017264	Mesna	Mesna 100 mg/ml	Solucion inyectable	Vial de vidrio tipo i transparente por	Prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorrágica, microhematuria y	Vigente	Claris Inyectables Limited	20101627-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					10 ml en caja por 5 viales	macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.			
V03AF01	INVIMA 2016M-0017264	Mesna	Mesna 100 mg/ml	Solucion inyectable	Vial de vidrio tipo i transparente por 10 ml en caja por 10 viales	Prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorrágica, microhematuria y macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.	Vigente	Clarix Inyectables Limited	20101627-2
V03AF01	INVIMA 2006M-0006342	Mesna	Mexnair 100 mg /ml inyectable	Solucion inyectable	Caja x 3 amp x 2 ml cada una	Prevención de la toxicidad de las oxazofosfamidas (ciclofosfamida e isofosfamida) a nivel de las vías urinarias.	Perdida fuerza ejec	Biotoscana Farma S.A.	19961672-1
V03AF01	INVIMA 2006M-0006342	Mesna	Mexnair 100 mg /ml inyectable	Solucion inyectable	Caja x 10 amp x 2 ml cada una	Prevención de la toxicidad de las oxazofosfamidas (ciclofosfamida e isofosfamida) a nivel de las vías urinarias.	Perdida fuerza ejec	Biotoscana Farma S.A.	19961672-2
V03AF01	Sin información disponible	Mesna	Mesna 400 mg/ 4 ml solucion inyectable	Solucion inyectable	Caja por 5 ampollas de vidrio claro tipo i.	Prevención de la toxicidad de las oxazofosfamidas (ciclofosfamida e isofosfamida) a nivel de las vías urinarias.	Negado	Dinafarma S.A. De C.V.	20014776-1
R05CB05	INVIMA M-011012	Mesna (2-mercapto etansulfonnato sodico)	Mesna 400 mg/ml inyectable	Solucion inyectable	Estuche de cartulina con ampolla de vidrio tipo i color ambar por 4 ml	Profilaxis para reducir la incidencia de la cistitis hemorragica provocada por las oxazofosforinas	Vencido	Laboratorios Labinca S.A.	227262-1
R05CB05	INVIMA M-011007	2-mercaptoetansulfonato sodico (mesna)	Mesna 200mg/2ml inyectable	Solucion inyectable	Caja por 10 ampollas de 2 ml	Profilaxis para reducir la incidencia de cistitis hemorragica provocado por las oxafosforinas.	Vencido	Laboratorios Labinca S.A.	227266-1
R05CB05	INVIMA 2003M-0002977	Mesna	Uromitexan® 400mg	Tableta cubierta con pelicula	Caja por 10 tabletas en blister pack (aluminio - poliamida/aluminio - pvc)	Para la prevención de la toxicidad del urotelio que incluye cistitis hemorragica, microhematuria y macrohematuria en pacientes tratados con ifosfamida y ciclofosfamida, en dosis consideradas urotóxicas.	Vencido	Baxter Oncology GmbH	19937355-1
R05CB05	INVIMA 2003M-0002833	Mesna	Uromitexan® 600 mg	Tableta cubierta con pelicula	Caja por 10 tabletas en blister de aluminio	Prevención de la toxicidad de las oxazofosfamidas (ciclofosfamida	Vencido	Baxter Oncology GmbH	19937356-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						e isofosfamida) a nivel de las vías urinarias.			
V03AF01	INVIMA 2006M-0005614	Mesna	Uroprot® 400 mg/4 ml solución inyectable	Solución inyectable	Caja con 5 de ampollitas de vidrio ambar tipo i de 5 ml con 4 ml de solución	Prevención de la toxicidad de las oxazofosfamidias (ciclofosfamida e isofosfamida) a nivel de las vías urinarias.	Vencido	Lemery S.A. De C.V.	19961042-1

Tabla 18. Registros sanitarios Mitomicina

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01DC03	INVIMA M-002812-R2	Mitomicina	Mutamycin © inyectable 5 mg.	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco de vidrio tipo i con tapon de caucho con agrafe de aluminio.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático y colorectal, carcinoma de la célula hepática.	Cancelado	Bristol Myers Squibb De Colombia S.A.	35571-1
L01DC03	INVIMA2004M-006000-R2	Mitomicina	Mutamycin 20 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco vial por 20 mg.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático y colorectal, carcinoma de la célula hepática.	Perdida fuerza ejec	Bristol Myers Squibb De Colombia S.A.	48558-1
L01DC03	INVIMA M-011001	Mitomicina	Mitomicina c 20 mg polvo liofilizado para inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco ampolla por 60ml vidrio ambar	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gastrico pancreatico y colorectal, carcinoma de la celula hepatica	Vencido	Laboratorios Labinca S.A.	227248-1
L01DC03	INVIMA 2003M-0002732	Mitomicina c	Riptam 20 mg polvo liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a	Frasco ampolla de vidrio ambar, con polvo liofilizado. Caja por 1 frasco ampolla	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático y colorectal, carcinoma de la célula hepática.	Vencido	Farmacéutica Paraguaya S.A.,	19938139-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01DC03	INVIMA 2003M-0002732	Mitomycin	Riptam 20 mg polvo liofilizado	solucion inyectable Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Frasco ampolla de vidrio ambar, con polvo liofilizado. Caja por 5 frascos ampolla	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático y colorectal, carcinoma de la célula hepática.	Vencido	Farmacéutica Paraguaya S.A.,	19938139-2
		Mitomycin	Mitomycin 20 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable		Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático y colorectal, carcinoma de la célula hepática.	Negado	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19938804-
L01DC03	INVIMA 2004M-0003244	Mitomycin	Minazol polvo liofilizado inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja por 1 frasco ampolla de vidrio neutro ambar.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático y colorectal, carcinoma de la célula hepática.	Vencido	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19940719-1
L01DC03	INVIMA 2004M-0003244	Mitomycin	Minazol polvo liofilizado inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja por 2 frasco ampolla de vidrio neutro ambar.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático y colorectal, carcinoma de la célula hepática.	Vencido	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19940719-2
L01DC03	INVIMA 2004M-0003244	Mitomycin	Minazol polvo liofilizado inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja por 5 frasco ampolla de vidrio neutro ambar.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático y colorectal, carcinoma de la célula hepática.	Vencido	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19940719-3
L01DC03	INVIMA 2004M-0003244	Mitomycin	Minazol polvo liofilizado inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja por 10 frasco ampolla de vidrio neutro ambar.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático y colorectal, carcinoma de la célula hepática.	Vencido	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19940719-4
L01DC03	INVIMA 2015M-0003121-R1	Mitomycin	Al phamycin® 20 mg polvo	Polvo liofilizado para reconstituir a	Frasco - ampolla ambar de vidrio tipo i con tapón de goma butilo y precinto de aluminio en cajas por 1 frasco ampolla	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático, colorectal,	Vigente	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19940720-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
			liofilizado para inyección	solucion inyectable		carcinoma de célula hepática.			
L01DC03	INVIMA 2015M-0003121-R1	Mitomycin	Al phamycin® 20 mg polvo liofilizado para inyección	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Frasco - ampolla ambar de vidrio tipo i con tapón de goma butilo y precinto de aluminio en cajas por 2 frascos ampolla	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático, colorectal, carcinoma de célula hepática.	Vigente	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19940720-2
L01DC03	INVIMA 2015M-0003121-R1	Mitomycin	Al phamycin® 20 mg polvo liofilizado para inyección	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Frasco - ampolla ambar de vidrio tipo i con tapón de goma butilo y precinto de aluminio en cajas por 5 frascos ampolla	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático, colorectal, carcinoma de célula hepática.	Vigente	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19940720-3
L01DC03	INVIMA 2015M-0003121-R1	Mitomycin	Al phamycin® 20 mg polvo liofilizado para inyección	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Frasco - ampolla ambar de vidrio tipo i con tapón de goma butilo y precinto de aluminio en cajas por 10 frascos ampolla	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático, colorectal, carcinoma de célula hepática.	Vigente	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19940720-4
L01DC03	INVIMA 2015M-0003553-R1	Mitomycin	Mixandex pisa	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja de cartón con frasco etiquetado con 5 mg de polvo liofilizado e instructivo anexo.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático y colorectal, carcinoma de la célula hepática.	Vigente	Laboratorios Pisa S.A. De C.V.	19942366-1
L01DC03	INVIMA 2005M-0004881	Mitomycin	Mitolem® liofilizado para solucion inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Frasco vial en caja	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático y colorectal, carcinoma de la célula hepática.	Vencido	Lemery S.A. De C.V.	19959664-1
L01DC03		Mitomycin	Mitomycin 20 mg	Polvo liofilizado	Aja por 1 frasco ampolla ambar tipo 1 por 50 ml	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático, colorectal, carcinoma de célula hepática.	Negado	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20096061-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01DC03	INVIMA 2016M-0017452	Mitomicina	Mitomicina 20	Polvo esteril para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1 frasco ampolla color ámbar de vidrio tipo i, con tapón de bromobutilo elastomérico, no teflonado color gris y precinto de aluminio con tapa flip off violeta.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático, colorectal, carcinoma de célula hepática.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097889-1
L01DC03	INVIMA 2016M-0017452	Mitomicina	Mitomicina 20	Polvo esteril para reconstituir a solución inyectable	Caja con 10 frascos ampolla color ámbar de vidrio tipo i, con tapón de bromobutilo elastomérico, no teflonado color gris y precinto de aluminio con tapa flip off violeta.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático, colorectal, carcinoma de célula hepática.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097889-2
L01DC03	INVIMA 2016M-0017452	Mitomicina	Mitomicina 20	Polvo esteril para reconstituir a solución inyectable	Uso hospitalario: caja con 50 frascos ampolla color ámbar de vidrio tipo i, con tapón de bromobutilo elastomérico, no teflonado color gris y precinto de aluminio con tapa flip off violeta.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático, colorectal, carcinoma de célula hepática.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097889-3
L01DC03	INVIMA 2016M-0017452	Mitomicina	Mitomicina 20	Polvo esteril para reconstituir a solución inyectable	Uso hospitalario: caja con 100 frascos ampolla color ámbar de vidrio tipo i, con tapón de bromobutilo elastomérico, no teflonado color gris y precinto de aluminio con tapa flip off violeta.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático, colorectal, carcinoma de célula hepática.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097889-4
L01DC03	INVIMA 2016M-0017452	Mitomicina	Mitomicina 20	Polvo esteril para reconstituir a solución inyectable	Uso hospitalario: caja con 500 frascos ampolla color ámbar de vidrio tipo i, con tapón de bromobutilo elastomérico, no teflonado color gris y precinto de aluminio con tapa flip off violeta.	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático, colorectal, carcinoma de célula hepática.	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20097889-5
L01DC03		Mitomicina	Mitomicina 5 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1 frasco vial de vidrio ambar x 15mg de polvo para reconstituir a 10ml de sol. Inyectable	Tratamiento paliativo de adenocarcinoma gástrico, pancreático, colorectal, carcinoma de célula hepática. Cáncer superficial de vejiga, carcinoma de células escamosas de cuello uterino	Negado	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20098794-1

Tabla 19. Registros sanitarios Mitoxantrona

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01DB07	INVIMA M-000312-R1	Clorhidrato de mitoxantrona	Novantrone	Solucion inyectable	Ampolla de 20 mg por 10 ml..	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno, coadyudante en el tratamiento de leucemia aguda no linfocítica, leucemia mielogena cronica, linfoma hodgkings.	Vencido	American Cyanamid Company	22522-1
L01DB07	INVIMA M-13642	Diclorhidrato de mitoxantrona (equivalente a 20,0 mg de mitoxantrona base)	Misostol 20 mg mitoxantrona solucion inyectable	Solucion inyectable	Envase con frasco ampolla x 5 unidades	Coadyuvante en el tratamiento de cancer de seno	Vencido	Asofarma S.A.I. Y C.	35447-1
L01DB07	INVIMA M-13642	Diclorhidrato de mitoxantrona (equivalente a 20,0 mg de mitoxantrona base)	Misostol 20 mg mitoxantrona solucion inyectable	Solucion inyectable	Envase con frasco ampolla x 1 unidad	Coadyuvante en el tratamiento de cancer de seno	Vencido	Asofarma S.A.I. Y C.	35447-2
L01DB07	INVIMA M-010741	Mitoxantron clorhidrato (equivalente a 2 mg de mitoxantrona)	Mitozantrona 25 mg/12,5 ml. Inyectable	Solucion inyectable	Caja x 1 vial de vidrio tipo i 25 mg x 12.5 ml	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno.	Vencido	Viatris Gmbh & Co. Kg	224406-1
L01DB07	INVIMA 2008 M-010328 R1	Mitoxantron clorhidrato equivalente a mitoxantrona base	Mitoxantrona 20 mg/10 ml	Solucion inyectable	Caja con un vial de vidrio tipo j y tapón de caucho, por 20 mg/10 ml	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno linfoma no hodgkin, cáncer de próstata hormona resistente, leucemia aguda no linfocítica, leucemia mielógena crónica y linfoma de hodgkin, carcinoma ovárico, cáncer primario de células hepáticas. Linfomas malignos, leucemia	Vigente	Baxter Oncology Gmbh	224410-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01DB07	INVIMA M-010280	Mitoxantron clorhidrato	Mitoxantrona 10 mg /5 ml.	Solucion inyectable	Caja x 1 vial de 10 mg x 5 ml	mieloide aguda y cáncer de próstata. Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno.	Vencido	Viatrix Gmbh & Co. Kg	224419-1
L01DB07	INVIMA M-14365	Clorhidrato de mitoxantrona equivalente a mitoxantrona	Neotalem de 20 mg (solucion inyectable)	Inyectables	Caja por 1 frasco ampolla de vidrio incoloro tipo i, con tapon gris tipo tachuela clorobutilo, con agrafe de aluminio flip off.	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno	Vencido	Lemery S.A. De C.V.	19906264-1
L01DB07	INVIMA 2005M-0004350	Mitoxantrona clorhidrato 2.3284 mg equivalente a mitoxantrona base	Mitoxantrona ebewe solucion concentrada para infusion	Inyectables	Caja con frasco vial de vidrio tipo i por 10 mg/5 ml.	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno	Perdida fuerza ejec	Ebewe Pharma Ges. M.B.H. Nfg.K.G.	19953089-1
L01DB07	INVIMA 2005M-0004350	Mitoxantrona clorhidrato 2.3284 mg equivalente a mitoxantrona base	Mitoxantrona ebewe solucion concentrada para infusion	Inyectables	Caja con frasco vial de vidrio tipo i por 20 mg/10 ml.	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno	Perdida fuerza ejec	Ebewe Pharma Ges. M.B.H. Nfg.K.G.	19953089-2
L01DB07	INVIMA 2016M-0005118-R1	Clorhidrato de mitoxantrona equivalente a mitoxantrona	Formyxan	Solucion inyectable	Caja con vial de vidrio claro tipo i por 10 ml con tapon y flip off azul oscuro	Mitoxantrona está indicada para quimioterapia en pacientes con carcinoma metastático de seno, linfoma de no-hodgkin, leucemia aguda no linfocítica aguda en adultos (anll) y leucemia mielógena crónica en crisis blástica.	Vigente	Laboratorios Pisa S.A. De C.V.	19957104-1
		Mitoxantrona diclorhidrato (equivalente a 20mg de mitoxantrona)	Mitoxantrona 20 mg	Inyectables		Coadyuvante en el tratamiento de cáncer de seno.	Negado	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19961322-
L01DB07	INVIMA 2013M-0014614	Mitoxantrona clorhidrato equivalente a mitoxantrona	Mitoxantrona inyectable 20 mg / 10 ml	Solucion inyectable	Caja por 1 frasco vial en vidrio tipo i con tapon bromobutilo gris	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno linfoma no hodgkin, cáncer de próstata hormona resistente, leucemia	Vigente	Ropsohn Therapeutics S.A.S	20051675-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					oscuro y agrafe de aluminio conteniendo 10 ml de solución inyectable.	aguda no linfocítica, leucemia mielógena crónica y linfoma de hodgkin, carcinoma ovárico, cáncer primario de células hepáticas. Linfomas malignos, leucemia mieloide aguda y cáncer de próstata.			
L01DB07	INVIMA 2014M-0015027	Mitoxantrona base equivalente a 23,28mg de mitoxantrona clorhidrato	Mitoxantrona 20mg/10ml solución inyectable	Solución inyectable	Caja por 1 frasco ampolla en vidrio incoloro por 10ml c/u	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno linfoma no hodking, cáncer de próstata hormona resistente, leucemia aguda no linfocítica, leucemia mielógena crónica y linfoma de hodking, carcinoma ovárico, cáncer primario de células hepáticas, linfomas malignos, leucemia mieloide aguda y cáncer de próstata.	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A	20063242-1
L01DB07	INVIMA 2014M-0015027	Mitoxantrona base equivalente a 23,28mg de mitoxantrona clorhidrato	Mitoxantrona 20mg/10ml solución inyectable	Solución inyectable	Caja por 5 frascos ampollas en vidrio incoloro por 10ml c/u	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno linfoma no hodking, cáncer de próstata hormona resistente, leucemia aguda no linfocítica, leucemia mielógena crónica y linfoma de hodking, carcinoma ovárico, cáncer primario de células hepáticas, linfomas malignos, leucemia mieloide aguda y cáncer de próstata.	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A	20063242-2
L01DB07	INVIMA 2014M-0015027	Mitoxantrona base equivalente a 23,28mg de mitoxantrona clorhidrato	Mitoxantrona 20mg/10ml solución inyectable	Solución inyectable	Caja por 10 frascos ampollas en vidrio incoloro por 10ml c/u	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno linfoma no hodking, cáncer de próstata hormona resistente, leucemia aguda no linfocítica, leucemia mielógena crónica y linfoma de hodking, carcinoma ovárico, cáncer primario de células hepáticas, linfomas malignos, leucemia mieloide aguda y cáncer de próstata.	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A	20063242-3

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01DB07	INVIMA 2014M-0015027	Mitoxantrona base equivalente a 23,28mg de mitoxantrona clorhidrato	Mitoxantrona 20mg/10ml solución inyectable	Solución inyectable	Institucional: caja por 100 frascos ampollas en vidrio incoloro por 10ml c/u	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno linfoma no hodking, cáncer de próstata hormona resistente, leucemia aguda no linfocítica, leucemia mielógena crónica y linfoma de hodking, carcinoma ovárico, cáncer primario de células hepáticas, linfomas malignos, leucemia mieloide aguda y cáncer de próstata.	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A	20063242-4
L01DB07	INVIMA 2014M-0015263	Mitoxantrona clorhidrato	Mitoxantrona 20 mg / 10 ml	Solución inyectable	Caja por 1 frasco de vidrio ampolla tipo i con tapón de bromobutilo y agrafe de aluminio con sello flip-off por 10ml.	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno linfoma no hodgkin, cáncer de próstata hormona resistente, leucemia aguda no linfocítica, leucemia mielógena crónica y linfoma de hodgkin, carcinoma ovárico, cáncer primario de células hepáticas. Linfomas malignos, leucemia mieloide aguda y cáncer de próstata.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20063702-1
L01DB07	INVIMA 2014M-0015263	Mitoxantrona clorhidrato	Mitoxantrona 20 mg / 10 ml	Solución inyectable	Caja por 50 frascos de vidrio ampolla tipo i con tapón de bromobutilo y agrafe de aluminio con sello flip-off por 10ml.	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno linfoma no hodgkin, cáncer de próstata hormona resistente, leucemia aguda no linfocítica, leucemia mielógena crónica y linfoma de hodgkin, carcinoma ovárico, cáncer primario de células hepáticas. Linfomas malignos, leucemia mieloide aguda y cáncer de próstata.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20063702-2
L01DB07	INVIMA 2014M-0015263	Mitoxantrona clorhidrato	Mitoxantrona 20 mg / 10 ml	Solución inyectable	Caja por 100 frascos de vidrio ampolla tipo i con tapón de bromobutilo y agrafe de aluminio con sello flip-off por 10ml.	Coadyuvante en el tratamiento de carcinoma de seno linfoma no hodgkin, cáncer de próstata hormona resistente, leucemia aguda no linfocítica, leucemia mielógena crónica y linfoma de hodgkin, carcinoma ovárico, cáncer primario de células hepáticas. Linfomas malignos, leucemia mieloide aguda y cáncer de próstata.	Vigente	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	20063702-3

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
L01DB07	INVIMA 2014M-0015261	Mitoxantrona clorhidrato (equivalente a 20 mg de mitoxantrona)	Mitoxantrona x 20mg solución inyectable	Solución inyectable	Frasco ampolla de vidrio tipo i por 20mg en 10ml, con tapon gris de bromobutilo y flipp-off de color blanco	leucemia mieloide aguda y cáncer de próstata. Mitoxantrona está indicada para quimioterapia en pacientes con carcinoma metastático de seno, linfoma de no-hodgkin, leucemia aguda no linfocítica aguda en adultos (anll) y leucemia miológena crónica en crisis blástica.	Vigente	Damipe Farmaceutica S.A.S	20064934-1

Tabla 20. Registros sanitarios Oxaliplatino

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01XA03	INVIMA 2008M-007212-R1	Oxaliplatino	Eloxatin inyectable 100mg	Polveriofilizado para reconstituir a solución inyectable	Cajas con un vial de vidrio tipo i sellado con tapon de cloro butilo y agrafe de aluminio con flipp-off color malva	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos, adyuvante en pacientes con cancer colorectal en estadios ii y iii segun clasificación tmn)	Vigente	Sanofi-Aventis De Colombia S.A.	223928-1
L01XA03	INVIMA M 2008 - 007213 R1	Oxaliplatino	Eloxatin inyectable 50 mg	Polveriofilizado para reconstituir a solución inyectable	Cajas con un frasco vial de vidrio tipo i transparente por 50 mg, con tapon en clorobutilo de 20 mm con flip-off verde	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorectal en estadios ii y iii (según clasificación tmn).	Vigente	Sanofi-Aventis De Colombia S.A.	223932-1
L01XA03	INVIMA 2002M-0001178	Oxaliplatino	O-plat 50 mg polvo liofilizado para inyección	Polveriofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 frasco ampolla de vidrio ambar con tapon elastomérico y precinto de aluminio.	Tratamiento del cancer colorectal metastasico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplasicos.	Negado	Asofarma S.A.I.C.	19926917-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01XA03	INVIMA 2002M-0001178	Oxaliplatino	O-plat 50 mg polvo liofilizado para inyección	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 3 frascos ampolla de vidrio ambar con tapon elastomérico y precinto de aluminio.	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Negado	Asofarma S.A.I.C.	19926917-2
L01XA03	INVIMA 2002M-0001175	Oxaliplatino	O-plat 100 mg polvo liofilizado para inyección	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartulina por 1 frasco ampolla de vidrio ambar con tapon elastomero y precinto de aluminio	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Negado	Asofarma S.A.I.C.	19926918-1
L01XA03	INVIMA 2002M-0001175	Oxaliplatino	O-plat 100 mg polvo liofilizado para inyección	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartulina por 3 frascos ampolla de vidrio ambar con tapon elastomero y precinto de aluminio	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Negado	Asofarma S.A.I.C.	19926918-2
L01XA03	INVIMA 2003M-0002335	Oxaliplatino	Oxerin 2 mg/ml	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco ampolla de vidrio neutro tipo i ambar por 50 mg. , tapon de bromobutilo y precinto metálico, en caja por 1 frasco	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Indicado en regímenes de quimioterapia combinados para pacientes con linfoma no hodking agresivos, que recaen posterior a trasplante, o que en la primera recaída no pueden ser llevados a consolidación de la respuesta con trasplante. Pacientes con linfoma no hodking refractarios a la quimioterapia convencional o recaídas posterior a tamo (trasplante de médula ósea).	Vencido	Tuteur S.A.C.I.F.I.A.	19933471-1
L01XA03	INVIMA 2003M-0002335	Oxaliplatino	Oxerin 2 mg/ml	Polvo liofilizado para reconstituir a	Frasco ampolla de vidrio neutro tipo i ambar por 50 mg. , tapon de bromobutilo y precinto metálico, en caja por 5 frascos	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Indicado en regímenes de quimioterapia	Vencido	Tuteur S.A.C.I.F.I.A.	19933471-2

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
				solucion inyectable		<p>combinados para pacientes con linfoma no hodking agresivos, que recaen posterior a trasplante, o que en la primera recaída no pueden ser llevados a consolidación de la respuesta con trasplante.</p> <p>Pacientes con linfoma no hodking refractarios a la quimioterapia convencional o recaídas posterior a tamo (trasplante de médula ósea).</p>			
L01XA03	INVIMA 2003M-0002335	Oxaliplatino	Oxerin 2 mg/ml	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Frasco ampolla de vidrio neutro tipo i ambar por 50 mg. , tapon de bromobutilo y precinto metalico, en caja por 10 frascos	<p>Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Indicado en regímenes de quimioterapia combinados para pacientes con linfoma no hodking agresivos, que recaen posterior a trasplante, o que en la primera recaída no pueden ser llevados a consolidación de la respuesta con trasplante.</p> <p>Pacientes con linfoma no hodking refractarios a la quimioterapia convencional o recaídas posterior a tamo (trasplante de médula ósea).</p>	Vencido	Tuteur S.A.C.I.F.I.A.	19933471-3
L01XA03	INVIMA 2003M-0002750	Polvo liofilizado de oxaliplatino	Oxaliplatino sandoz® 100 mg inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Frasco ampolla de vidrio neutro tipo iii, de color ambar, con tapon de bromobutilo y agrafe de aluminio, por 30 ml de capacidad,	Tratamiento del cancer colorectal metastasico en monoquimioterapia y en asociacion con otros agentes antineoplasicos.	Perdida fuerza ejec	Sandoz S.A.	19937781-1
L01XA03	INVIMA 2003M-0002750	Polvo liofilizado	Oxaliplatino sandoz® 100	Polvo liofilizado para	Frasco ampolla de vidrio neutro tipo iii, de color ambar, con tapon de	Tratamiento del cancer colorectal metastasico en monoquimioterapia	Perdida fuerza ejec	Sandoz S.A.	19937781-2

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
		de oxaliplatino	mg inyectable liofilizado	reconstituir a solución inyectable	bromobutilo y agrafe de aluminio, por 60 ml de capacidad,	y en asociación con otros agentes antineoplásicos.			
L01XA03	INVIMA 2003M-0002749	Oxaliplatino	Oxaliplatino sandoz® 50mg inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco ampolla de vidrio neutro color ámbar tipo iii, con tapon de bromobutilo y agrafe de aluminio de capacidad por 30 ml que c	Tratamiento del cancer colorectal metastasico en monoquimioterapia y en asociacion con otros agentes antineoplásicos.	Perdida fuerza ejec	Sandoz S.A.	19937782-1
L01XA03	INVIMA 2003M-0002749	Oxaliplatino	Oxaliplatino sandoz® 50mg inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco ampolla de vidrio neutro color ámbar tipo iii, con tapon de bromobutilo y agrafe de aluminio de capacidad por 60 ml que c	Tratamiento del cancer colorectal metastasico en monoquimioterapia y en asociacion con otros agentes antineoplásicos.	Perdida fuerza ejec	Sandoz S.A.	19937782-2
		Oxaliplatino	Oxaliplatino 50 mg inyectable liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable		Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Negado	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19938533-
L01XA03	INVIMA 2015M-0003159-R1	Oxaliplatino	Oxerin® 100 mg polvo liofilizado para inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartulina que contine 1 frasco vial de vidrio tipo i color ambar transparente con tapon de bromobutilo y precinto flip-off metalico.	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos. A) indicado en regímenes de quimioterapia combinados para pacientes con linfoma no hodking agresivos, que recaen posterior a transplante, o que en la primera recaída no pueden ser llevados a consolidación de la respuesta con transplante. B) pacientes con linfoma no hodking refractarios a la quimioterapia convencional o recaídas posterior a tamo (transplante de medula osea).	Vigente	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19939159-1
L01XA03	INVIMA 2015M-	Oxaliplatino	Oxerin® 100 mg polvo	Polvo liofilizado para	Caja de cartulina que contine 2 frasco vial de vidrio tipo i color ambar	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes	Vigente	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19939159-2

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
	0003159-R1		liofilizado para inyectable	reconstituir a solución inyectable	transparente con tapon de bromobutilo y precinto flip-off metalico.	antineoplásicos. A) indicado en regímenes de quimioterapia combinados para pacientes con linfoma no hodking agresivos, que recaen posterior a transplante, o que en la primera recaída no pueden ser llevados a consolidación de la respuesta con transplante. B) pacientes con linfoma no hodking refractarios a la quimioterapia convencional o recaídas posterior a tamo (transplante de medula osea).			
L01XA03	INVIMA 2015M-0003159-R1	Oxaliplatino	Oxerin® 100 mg polvo liofilizado para inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartulina que contine 5 frasco vial de vidrio tipo i color ambar transparente con tapon de bromobutilo y precinto flip-off metalico.	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos. A) indicado en regímenes de quimioterapia combinados para pacientes con linfoma no hodking agresivos, que recaen posterior a transplante, o que en la primera recaída no pueden ser llevados a consolidación de la respuesta con transplante. B) pacientes con linfoma no hodking refractarios a la quimioterapia convencional o recaídas posterior a tamo (transplante de medula osea).	Vigente	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19939159-3
L01XA03	INVIMA 2015M-0003159-R1	Oxaliplatino	Oxerin® 100 mg polvo liofilizado para inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartulina que contine 10 frasco vial de vidrio tipo i color ambar transparente con tapon de bromobutilo y precinto flip-off metalico.	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos. A) indicado en regímenes de quimioterapia combinados para pacientes con linfoma no hodking agresivos, que recaen posterior a	Vigente	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19939159-4

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
						transplante, o que en la primera recaída no pueden ser llevados a consolidación de la respuesta con transplante. B) pacientes con linfoma no hodking refractarios a la quimioterapia convencional o recaídas posterior a tamo (transplante de medula osea).			
L01XA03	INVIMA 2015M-0003859-R1	Oxaliplatino	Oxaliplatino 50 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartón con frasco ampolla de vidrio ambar tipo i, tapon de bromobutilo, precinto de seguridad, con polvo liofilizado.	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vigente	Fresenius Kabi S.A.	19946860-1
L01XA03	INVIMA 2015M-0003906-R1	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un frasco ampolla de vidrio tipo i ambar por 50 ml que contiene el polvo liofilizado.	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vigente	Laboratorios Filaxis S.A.	19946861-1
		Oxaliplatino	Davenzol oxaxiplatino 100 mg x 1 fco.	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable		Tratamiento del cáncer de colon rectal metastásico con posterioridad al tratamiento previo con fluorpirimidinas en monoquimioterapia o asociada.	Negado	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19952094-
L01XA03	INVIMA 2005M-0004562	Oxaliplatino	Entia 5 mg/ml	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un vial en vidrio tipo i incoloro, tapon de bromobutilo gris y tapa flip off por 50mg para reconstituir con 10 ml.	Tratamiento del cancer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vencido	Laboratorios Lemery S.A. De C.V.	19952112-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01XA03	INVIMA 2005M-0004562	Oxaliplatino	Entia 5 mg/ml	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un vial en vidrio tipo i incoloro, tapon de bromobutilo gris y tapa flip off por 100 mg para reconstituir con 20 ml.	Tratamiento del cancer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vencido	Laboratorios Lemery S.A. De C.V.	19952112-2
L01XA03	INVIMA 2016M-0005458-R1	Oxaliplatino	Eloxatin® 5 mg/ml (100 mg / 20 ml) solución concentrada para infusión	Solución concentrada para infusión	Caja por 1 vial en vidrio tipo i por 20 ml de solución concentrada	Tratamiento del cancer colorectal metastasico en monoquimioterapia y en asociacion con otros agentes antineoplásicos. Aduvante en pacientes con cáncer colorectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm)?.	En trámite renov	Sanofi-Aventis De Colombia S.A.	19962589-1
L01XA03	INVIMA 2016M-0005630-R1	Oxaliplatino	Eloxatin® 5 mg/ml (50 mg / 10 ml) solución concentrada para infusión	Solución concentrada para infusión	Caja por 1 vial en vidrio tipo i por 10 ml de solución concentrada	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos, adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii según clasificación tnm).	Vigente	Sanofi-Aventis De Colombia S.A.	19962590-1
L01XA03	INVIMA 2006M-0005763	Oxaliplatino	Tarckoplatin® 50 mg polvo liofilizado para solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un frasco x 500 mg de polvo liofilizado	Tratamiento del cancer colorectal metastasico en monoquimioterapia y en asociacion con otros agentes antineoplásicos.	Perdida fuerza ejec	Merck S.A.	19962862-1
L01XA02	INVIMA 2006M-0005727	Oxaliplatino	Tarckoplatin® 100 mg polvo para liofilizado para solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x un frasco ampolla x 1 gramo de polvo liofilizado	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Perdida fuerza ejec	Merck S.A.	19962888-1
L01XA03	INVIMA 2006M-0005762	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100mg polvo liofilizado inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un frasco vial de vidrio ámbar tipo ii por 100 mg.	Tratamiento del cancer colorectal metastasico en monoquimioterapia y en asociacion con otros agentes antineoplásicos.	Vencido	Glenmark Generics S.A.	19963084-1
L01XA03	INVIMA 2006M-0005761	Oxaliplatino	Oxaliplatino 50 mg polvo	Polvo liofilizado para	Caja con frasco vial de vidrio ambar tipo ii por 50 mg oxaliplatino	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia	Vencido	Glenmark Generics S.A	19963088-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
			liofilizado inyectable	reconstituir a solución inyectable		o asociación con otros agentes antineoplásicos			
L01XA03	INVIMA 2006M-0006159	Oxaliplatino	Oxaliplatino 50 mg liofilizado para solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartón con un vial con 50 mg de principio activo	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia y asociación con otros agentes antineoplásicos.	En trámite renov	Laboratorios Libra S.A	19966330-1
L01XA03	INVIMA 2006M-0006142	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg liofilizado para solución inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja de cartón con 1 vial por 50ml	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	En trámite renov	Laboratorios Libra S.A	19966332-1
L01XA03	INVIMA 2006M-0006685	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 frasco ampolla de vidrio ambar tipo i x 100 mg	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	En trámite renov	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19969843-1
L01XA03	INVIMA 2006M-0006685	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 10 frascos ampolla de vidrio ambar tipo i x 100 mg	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	En trámite renov	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19969843-2
L01XA03	INVIMA 2006M-0006685	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 5 frascos ampolla de vidrio ambar tipo i x 100 mg	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	En trámite renov	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19969843-3
L01XA03	INVIMA 2006M-0006685	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 1 frasco ampolla de vidrio transparente tipo i x 100 mg	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	En trámite renov	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19969843-4
L01XA03	INVIMA 2006M-0006685	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 10 frasco ampolla de vidrio transparente tipo i x 100 mg	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia	En trámite renov	Blau Farmacéutica	19969843-5

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
				reconstituir a solución inyectable		y en asociación con otros agentes antineoplásicos.		Colombia S.A.S	
L01XA03	INVIMA 2006M-0006685	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja x 5 frasco ampolla de vidrio transparente tipo i x 100 mg	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	En trámite renov	Blau Farmacéutica Colombia S.A.S	19969843-6
L01XA03	INVIMA 2007M-0006992	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 vial en vidrio ambar tipo i	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vencido	Laboratorios Biopas S.A	19973305-1
L01XA03	INVIMA 2007M-0006989	Oxaliplatino	Oxaliplatino 50mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 frasco ampolla	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vencido	Laboratorios Biopas S.A	19973306-1
L01XA03	INVIMA 2007M-0007016	Oxaliplatino	Oxaliplatino polvo para solución concentrada para infusión.	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable	Caja por un vial por 50 mg. Para reconstituir a 10 ml.	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Perdida fuerza ejec	Ebewe Pharma Ges. M.B.H. Nfg.K.G.	19974394-1
L01XA03	INVIMA 2007M-0007016	Oxaliplatino	Oxaliplatino polvo para solución concentrada para infusión.	Polvo estéril para reconstituir a solución inyectable	Caja por un vial por 100 mg. Para reconstituir a 20 ml.	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Perdida fuerza ejec	Ebewe Pharma Ges. M.B.H. Nfg.K.G.	19974394-2
L01XA03	INVIMA 2007M-0007341	Oxaliplatino	Xaliplat®	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un frasco ampolla incoloro tipo i con tapon de bromobutilo y flip-off rojo de 20 mm.	Tratamiento del cáncer colorectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos	Vigente	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19976714-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01XA03	INVIMA 2007M-0007421	Oxaliplatino	Xaliplat® oxaliplatino 100 mg inyectable	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por un frasco ampolla incoloro tipo i con tapon de bromobutilo y flip-off rojo de 20 mm.	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos	Vigente	Laboratorios Richmond S.A.C.I.F	19978042-1
L01XA03	INVIMA 2008M-0008521	Oxaliplatin	Oxplar® 100	Solución inyectable	caja x frasco vial vidrio tipo i x 50 ml	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico s. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm). En monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vigente	Biotoscana Farma S.A.	19989995-1
L01XA03	INVIMA 2008M-0008521	Oxaliplatin	Oxplar® 100	Solución inyectable	Caja x 2 frascos vial vidrio tipo i x 50 ml	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico s. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm). En monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vigente	Biotoscana Farma S.A.	19989995-2
L01XA03	INVIMA 2008M-0008521	Oxaliplatin	Oxplar® 100	Solución inyectable	Caja x 5 frascos vial vidrio tipo i x 50 ml	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico s. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm). En monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vigente	Biotoscana Farma S.A.	19989995-3

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01XA03	INVIMA 2008M-0008521	Oxaliplatin	Oxplar ® 100	Solucion inyectable	Caja x 10 frascos vial vidrio tipo i x 50 ml	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico s. Aduvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm). En monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vigente	Biotoscana Farma S.A.	19989995-4
L01XA03	INVIMA 2009M-0009116	Oxaliplatino	Pisa zolaxat	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja de cartón con un frasco ampolla con liofilizado frasco de vidrio tipo i, claro boca 20mm, con capacidad para 50 ml, tapón	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos	Vigente	Laboratorios Pisa S.A., De C.V. Planta Tlajomulco	19993868-1
L01XA03	INVIMA 2009M-0009333	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg polvo liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja plegadiza con vial de vidrio tipo i color ámbar de 50 ml de capacidad, tapón goma y precinto de aluminio	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos	Vigente	Grupo Unipharm S.A. Y/O Laboratorios Uni S.A.	19997648-1
L01XA03	INVIMA 2009M-0010000	Oxaliplatino	Oxaliplatino 50 mg vial	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja por vial en vidrio tipo i de 20 ml por 50 mg de oxaliplatino.	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Aduvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm).	Vigente	Vitalchem Laboratories De Colombia S.A.	20004135-1
L01XA03	INVIMA 2010M-0010832	Oxaliplatino	Oxaliplatin injection 100mg/50ml	Solucion inyectable	Caja por una vial de vidrio tipo i ambar por 50 ml	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos	Vigente	Vhb Medi Sciences Limited	20011829-1
L01XA03	INVIMA 2011M-0011856	Oxaliplatino	Oxaliplatin injection 50mg/25ml	Solución concentrada para infusión	Vial de vidrio ambar tipo i por 25 ml en caja de carton	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vencido	Vhb Medi Sciences Limited	20011830-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01XA03	INVIMA 2011M-0012237	Oxaliplatino	Oxaliplatino 50 mg polvo para reconstituir	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con 1 vial de vidrio tipo i de 20 ml por 50 mg de oxaliplatino	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm).	Vencido	Health Net S.A.S	20029508-1
L01XA03	INVIMA 2012M-0012997	Oxaliplatino	Zolaxat®	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja con un frasco ampula con 50 mg de polvo liofilizado	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm).	En trámite renov	Laboratorios Pisa S.A. De C.V.	20035963-1
L01XA03		Oxaliplatino	Oxaliplatino 100mg/20ml	Solución inyectable	Vial de 100 mg por 20 ml	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Negado	Sandoz GmbH	20038385-1
L01XA03	INVIMA 2012M-0013680	Oxaliplatino	Oxaliplatino 50 mg / 10 ml	Solución inyectable	Caja por un vial en vidrio tipo i con tapon gris y flip off naranja de aluminio conteniendo 10 ml de la solución inyectable	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vigente	Fresenius Kabi Oncology Limited	20044067-1
L01XA03	INVIMA 2012M-0013728	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg solución inyectable	Solución inyectable	Caja x 1 frasco ampolla de vidrio tipo i incoloro x 20 ml	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vigente	Fresenius Kabi Oncology Limited	20044068-1
L01XA03		Oxaliplatino	Oxaliplatin ebewe 200 mg / 40 ml	Solución concentrada para infusión	Caja por 1 vial x 40 ml conteniendo 200 mg de oxaliplatino	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Negado	Sandoz GmbH	20044812-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01XA03		Oxaliplatino	Oxaliplatin ebewe 50 mg / 10 ml	Solucion inyectable	Uso institucional: caja por un vial de 50mg/10ml	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia y en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Negado	Sandoz GmbH	20044813-1
L01XA03	INVIMA 2012M-0013752	Oxaliplatino	Oxaliplatino 50 mg polvo liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja con frasco ampolla de vidrio tipo i, color ámbar de 25 ml con tapón de bromobutilo gris.	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm).	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A.	20045956-1
L01XA03	INVIMA 2012M-0013685	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Frasco vial	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos, adyuvante en pacientes con cancer colorrectal en estadios ii y iii segun clasificación tnm)	Vigente	Laboratorio Internacional Argentino S.A.	20045959-1
L01XA03	INVIMA 2012M-0013281	Oxaliplatino	Goxyral® 50 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja con frasco ampolla de vidrio tipo i, color ámbar de 30 ml con tapon de goma de 20 mm y precinto de seguridad en aluminio	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm).	Vencido	Eriochem S.A	20047606-1
L01XA03	INVIMA 2013M-0013970	Oxaliplatino	Goxyral® 100 mg	Polvo liofilizado para reconstituir a solucion inyectable	Caja x 1 frasco vial vidrio ámbar tipo i con 100mg de oxaliplatino	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm).	Vigente	Eriochem S.A	20049106-1
L01XA03	INVIMA 2013M-0014701	Oxaliplatino	Oxaliplatino 50 mg	Polvo esteril para reconstituir a solucion inyectable	Vial de 20ml en vidrio tipo i transparente con cierre en goma bromobutílica, tapa en aluminio y disco en polipropileno por 500mg de los que 50mg son oxaliplatino	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vigente	Actavis Group Ptc Ehf	20056003-1
L01XA03	INVIMA 2014M-0014956	Oxaliplatino	Oxaliplatino 100 mg	Polvo liofilizado para	Caja con 1 frasco vial de vidrio incoloro tipo i con polvo liofilizado, tapon de	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes	Vigente	Actavis Group Ptc Ehf	20056004-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
				reconstituir a solución inyectable	caucho gris de bromobutilo y cierre de aluminio	antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm).			
L01XA03	INVIMA 2014M-0015294	Oxaliplatino	Oxaliplatino 200mg/ 40 ml solución inyectable	Solución inyectable	Caja por un vial de vidrio tipo i incoloro por 40 ml con un tapon de goma con cierre de 20mm sellado con tapa de aluminio flip off de 20mm	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm).	Vigente	Fresenius Kabi Oncology Limited	20062339-1
L01XA03	INVIMA 2014M-0015369	Oxaliplatino	Oxaliplatino 50 mg - liofilizado	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Vial liofilizado por 50mg	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o en asociación con otros agentes antineoplásicos.	Vigente	Damipe Farmaceutica S.A.S	20063579-1
L01XA03	INVIMA 2014M-0015480	Oxaliplatino	Hoxalira® 100 mg/ vial	Solución inyectable	Caja x 1 frasco vial de vidrio tipo i incoloro x 20 ml de solución inyectable, tapón de caucho (bromobutilo) gris, con casquillo de aluminio (agrafe) con tapa flip - off.	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm)	Vigente	Hospira Inc	20067532-1
L01XA03	INVIMA 2014M-0015460	Oxaliplatino	Hoxalira® 50 mg/vial	Solución inyectable	Caja x 1 frasco vial de vidrio tipo i incoloro x 10 ml de solución inyectable, tapón de caucho (bromobutilo) gris, con casquillo de aluminio (agrafe) con tapa flip - off.	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm)	Vigente	Hospira Inc	20067533-1
L01XA03		Oxaliplatino	Crisapla 100	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Estuche de cartulina con 1 frasco ampolla de vidrio tipo i	Tratamiento auxiliar de cáncer de colon, estadio iii (dukes c) después de la resección completa del tumor primario. Tratamiento de cáncer metastásico colorrectal.	Negado	Laboratorio Lkm S.A	20098316-1
L01XA03		Oxaliplatino	Crisapla 100	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Estuche de cartulina con 2 frasco ampolla de vidrio tipo i	Tratamiento auxiliar de cáncer de colon, estadio iii (dukes c) después de la resección completa del tumor primario. Tratamiento de cáncer metastásico colorrectal.	Negado	Laboratorio Lkm S.A	20098316-2

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01XA03		Oxaliplatino	Crisapla 100	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Estuche de cartulina con 3 frasco ampolla de vidrio tipo i	Tratamiento auxiliar de cáncer de colon, estadio iii (dukes c) después de la resección completa del tumor primario. Tratamiento de cáncer metastásico colorrectal.	Negado	Laboratorio Lkm S.A	20098316-3
L01XA03		Oxaliplatino	Crisapla 100	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Estuche de cartulina con 4 frasco ampolla de vidrio tipo i	Tratamiento auxiliar de cáncer de colon, estadio iii (dukes c) después de la resección completa del tumor primario. Tratamiento de cáncer metastásico colorrectal.	Negado	Laboratorio Lkm S.A	20098316-4
L01XA03		Oxaliplatino	Crisapla 100	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Estuche de cartulina con 5 frasco ampolla de vidrio tipo i	Tratamiento auxiliar de cáncer de colon, estadio iii (dukes c) después de la resección completa del tumor primario. Tratamiento de cáncer metastásico colorrectal.	Negado	Laboratorio Lkm S.A	20098316-5
L01XA03	INVIMA 2016M-0017393	Oxaliplatino	Crisapla ® 50	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 2 frasco ampolla de vidrio tipo i ámbar con tapón de bromobutilo, precinto de aluminio y flip off verde	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm)	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20098319-2
L01XA03	INVIMA 2016M-0017393	Oxaliplatino	Crisapla ® 50	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 3 frasco ampolla de vidrio tipo i ámbar con tapón de bromobutilo, precinto de aluminio y flip off verde	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm)	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20098319-3
L01XA03	INVIMA 2016M-0017393	Oxaliplatino	Crisapla ® 50	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 4 frasco ampolla de vidrio tipo i ámbar con tapón de bromobutilo, precinto de aluminio y flip off verde	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm)	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20098319-4
L01XA03	INVIMA 2016M-0017393	Oxaliplatino	Crisapla ® 50	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 5 frasco ampolla de vidrio tipo i ámbar con tapón de bromobutilo,	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20098319-5

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
				reconstituir a solución inyectable	precinto de aluminio y flip off verde	antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm)			
L01XA03	INVIMA 2016M-0017393	Oxaliplatino	Crisapla® 50	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja por 1 frasco ampolla de vidrio tipo i ámbar con tapón de bromobutilo, precinto de aluminio y flip off verde	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos. Adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm)	Vigente	Laboratorio Lkm S.A	20098319-1
L01XA03		Oxaliplatino	Oxalipro 50 mg.	Solución para infusión	Caja por 1 vial de vidrio tipo 1 con tapon y agrafe de aluminio, con 50 mg en 10 ml de oxaliplatino	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos, "adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm)".	Negado	Cipla Limited.	20104336-1
L01XA03	INVIMA 2017M-0017726	Oxaliplatino	Oxalipro 100 mg	Solución para infusión	Caja con un vial por 20 ml, de vidrio tipo i. Sello de aluminio y tapon de caucho; con inserto,	Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico en monoquimioterapia o asociación con otros agentes antineoplásicos, "adyuvante en pacientes con cáncer colorrectal en estadios ii y iii (según clasificación tnm)".	Vigente	Cipla Limited	20104411-1
L01XA03	INVIMA 2017M-0017744	Oxaliplatino	Oxaliseven 50	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con un frasco vial de vidrio tipo i por 50 mg con tapón de caucho gris, agrafe y tapa plástica.	Tratamiento auxiliar de cáncer de colon, estadio iii (dukes c) después de la resección completa del tumor primario. Tratamiento de cáncer metastásico colorrectal.	Vigente	Seven Pharma Colombia S.A.S	20109105-1
L01XA03	INVIMA 2017M-0017738	Oxaliplatino	Oxaliseven 100	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Caja plegadiza con un frasco vial de vidrio tipo i por 100 mg con tapón de caucho gris, agrafe y tapa plástica.	Tratamiento auxiliar de cáncer de colon, estadio iii (dukes c) después de la resección completa del tumor primario. Tratamiento de cáncer metastásico colorrectal.	Vigente	Seven Pharma Colombia S.A.S	20109106-1

Tabla 21. Registros sanitarios Vinorelbina

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01CA04	INVIMA 2011M-012459-R1	Ditartrato de vinorelbina 69,25 mg equivalente a vinorelbina	Navelbine 50 mg/5ml	Solución inyectable	Caja de cartón con vial x 5 ml. Frasco vial de vidrio neutro tipo i tapón elastomero tapa de aluminio flip-top.	Carcinoma pulmonar de células no pequeñas y carcinoma mamario.	En trámite renov	Pierre Fabre Medicament Production (Pfmp)	39172-1
L01CA04	INVIMA M-012461-R1	Ditartrato de vinorelbina equivalente a vinorelbina 30,00 mg	Navelbine 30mg/3ml	Solución inyectable	Caja por un frasco vial de vidrio tipo i por 3 ml	Carcinoma pulmonar de células no pequeñas y carcinoma mamario	Vencido	Laboratorios Pierre Fabre Medicament Production	39173-1
L01CA04	INVIMA M-012458	Ditartrato de vinorelbina equivalente a vinorelbina	Navelbine 40 mg/4ml	Solución inyectable	Caja con un vial por 4 ml	Carcinoma pulmonar de células no pequeñas y carcinoma mamario.	Vencido	Laboratorios Pierre Fabre Medicament Production	39174-1
L01CA04	INVIMA M-012460	Ditartrato de vinorelbina equivalente a vinorelbina	Navelbine 10 mg/1ml	Solución inyectable	Caja con un vial por 1 ml	Carcinoma pulmonar de células no pequeñas y carcinoma mamario.	Vencido	Laboratorios Pierre Fabre Medicament Production	39175-1
L01CA04	INVIMA 2003M-0002294	Bitartrato de vinorelbina equivalente a vinorelbina base	Zinavin 10 mg./ml.	Solución inyectable	Frasco ampolla de vidrio incoloro tipo i con tapón elastomérico por 1 ml., en caja por 1 frasco ampolla.	Carcinoma pulmonar de células no pequeñas y carcinoma mamario.	Vencido	Tuteur S.A.C.I.F.I.A.	19933498-1
L01CA04	INVIMA 2003M-0002294	Bitartrato de vinorelbina equivalente a vinorelbina base	Zinavin 10 mg./ml.	Solución inyectable	Frasco ampolla de vidrio incoloro tipo i con tapón elastomérico por 1 ml., en caja por 5 frascos ampollas.	Carcinoma pulmonar de células no pequeñas y carcinoma mamario.	Vencido	Tuteur S.A.C.I.F.I.A.	19933498-2
L01CA04	INVIMA 2003M-0002294	Bitartrato de vinorelbina equivalente a vinorelbina base	Zinavin 10 mg./ml.	Solución inyectable	Frasco ampolla de vidrio incoloro tipo i con tapón elastomérico por 1 ml., en caja por 10 frascos ampollas.	Carcinoma pulmonar de células no pequeñas y carcinoma mamario.	Vencido	Tuteur S.A.C.I.F.I.A.	19933498-3

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01CA04	INVIMA 2003M-0002982	Vinorelbina bitartrato 13,85 mg equivalente a vinorelbina	Vinorelbina sandoz® 10 mg inyectable endovenoso	Polvo liofilizado para reconstituir a solución inyectable	Frasco ampolla de vidrio tratado, color ambar, con tapón de caucho bromobutilico y agrafe, en estuche de cartulina	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Perdida fuerza ejec	Sandoz S.A.	19937783-1
L01CA04	INVIMA 2003M-0002981	Vinorelbina bitartrato 69,25 mg equivalente a vinorelbina	Vinorelbina sandoz (r) 50 mg inyectable endovenoso	Solucion inyectable	Frasco ampolla vidrio tratado, color ambar, con tapón de caucho bromobutilico y agrafe de 5 ml de capacidad, en caja de cartón	Carcinoma pulmonar de células no pequeñas y carcinoma mamario	Perdida fuerza ejec	Laboratorios Labinca S.A.	19937784-1
		Bitartrato de vinorelbina equivalente a vinorelbina	Zinavin 50 mg solución inyectable	Inyectables		Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Negado	Tuteur S.A. C.I.F.I.A.	19939230-
L01CA04	INVIMA 2016M-0004790-R1	Vinorelbina ditartrato equivalente a vinorelbina base	Vinorelbina solución inyectable 50 mg / 5 ml	Solucion inyectable	Caja plegadiza con 1 frasco ampolla de vidrio incoloro con tapon gris de bromobutilo con tapa flip-off blanco.	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario.	Vigente	Blau Farmaceutica Colombia S.A.S	19952093-1
L01CA04	INVIMA 2016M-0004790-R1	Vinorelbina ditartrato equivalente a vinorelbina base	Vinorelbina solución inyectable 50 mg / 5 ml	Solucion inyectable	Caja plegadiza con 5 frascos ampolla de vidrio incoloro con tapon gris de bromobutilo con tapa flip-off blanco.	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario.	Vigente	Blau Farmaceutica Colombia S.A.S	19952093-2
L01CA04	INVIMA 2016M-0004790-R1	Vinorelbina ditartrato equivalente a vinorelbina base	Vinorelbina solución inyectable 50 mg / 5 ml	Solucion inyectable	Caja plegadiza con 10 frascos ampolla de vidrio incoloro con tapon gris de bromobutilo con tapa flip-off blanco.	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario.	Vigente	Blau Farmaceutica Colombia S.A.S	19952093-3
L01CA04	INVIMA 2005M-0004580	Ditartrato de vinorelbina equivalente a vinorelbina	Viessia® solución inyectable	Solucion inyectable	Caja con un frasco ampolla x 1 ml	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Vencido	Lemery S.A. De C.V.	19953726-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01CA04	INVIMA 2005M-0004580	Ditartrato de vinorelbina equivalente a vinorelbina	Viessia® solución inyectable	Solución inyectable	Caja con un frasco ampolla x 5 ml	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Vencido	Lemery S.A. De C.V.	19953726-2
L01CA04	INVIMA 2006M-0005856	Vinorelbina bitartrato 13,85 mg equivalente a vinorelbina	Vinorelbine ebewe solución concentrada para infusión	Solución concentrada para infusión	Caja de cartón con 1 frasco vial de vidrio tipo i por 10mg/ml	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Vencido	Ebewe Pharma Ges. M.B.H. Nfg.K.G.	19964808-2
L01CA04	INVIMA 2006M-0005856	Vinorelbina bitartrato 13,85 mg equivalente a vinorelbina	Vinorelbine ebewe solución concentrada para infusión	Solución concentrada para infusión	Caja de cartón con 1 frasco vial por 50mg/5ml	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Vencido	Ebewe Pharma Ges. M.B.H. Nfg.K.G.	19964808-3
L01CA04		Ditartrato de vinorelbina (equiv. A 50 mg. De vinorelbina) 69.270 mg.	Tarckorel® 50 mg	Solución inyectable	Caja por un frasco ampolla de solución iny. Por 5 ml.	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Negado	Merck S.A.	19975002-1
L01CA04	INVIMA 2007M-0007638	Vinorelbine tartrato equivalente a vinorelbine	Vinobina 10mg/ml	Solución inyectable	Caja con un frasco vial de vidrio tipo i por 2 ml conteniendo 10mg/ml de vinorelbina	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario.	Perdida fuerza ejec	Biotoscana Farma S.A.	19985562-1
L01CA04	INVIMA 2008M-0008022	Vinorelbina tartrato equivalente a vinorelbina	Vinobina 50mg/ 5ml	Solución inyectable	Caja con un frasco vial de vidrio tipo i por 5 ml conteniendo vinorelbine 50mg/5ml	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario.	Perdida fuerza ejec	Biotoscana Farma S.A.	19985564-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01CA04	INVIMA 2010M-0010414	Vinorelbina ditartrato	Labdosa vilne® vinorelbina 50 mg	Suspension inyectable	Estuche de cartulina con 1 frasco ampolla en vidrio borosilicato tipo i incoloro con la sln inyectable y tapon de bromobutilo	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Vigente	Laboratorio Dosa S.A.	20007950-1
L01CA04	INVIMA 2010M-0010414	Vinorelbina ditartrato	Labdosa vilne® vinorelbina 50 mg	Suspension inyectable	Estuche de cartulina con 5 frascos ampolla en vidrio borosilicato tipo i incoloro con la sln inyectable y tapon de bromobutilo	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Vigente	Laboratorio Dosa S.A.	20007950-2
L01CA04	INVIMA 2010M-0010414	Vinorelbina ditartrato	Labdosa vilne® vinorelbina 50 mg	Suspension inyectable	Estuche de cartulina con 10 frascos ampolla en vidrio borosilicato tipo i incoloro con la sln inyectable y tapon de bromobutilo	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Vigente	Laboratorio Dosa S.A.	20007950-3
L01CA04	INVIMA 2010M-0010414	Vinorelbina ditartrato	Labdosa vilne® vinorelbina 50 mg	Suspension inyectable	Estuche de cartulina con 100 frascos ampolla en vidrio borosilicato tipo i incoloro con la sln inyectable y tapon de bromobutilo	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Vigente	Laboratorio Dosa S.A.	20007950-4
L01CA04	INVIMA 2010M-0011283	Bitartrato de vinorelbina equivalente a vinorelbina	Vinorelbina para inyeccion 50 mg / 5 ml	Solución concentrada para infusión	Caja plegadiza con 1 vial por 50mg/5ml de solución concentrada inyectable para infusión.	Carcinoma pulmonar de celulas no pequeñas y carcinoma mamario.	Vencido	Vitalchem Laboratories De Colombia S.A.	20017532-1
L01CA04	INVIMA 2012M-0013315	Vinorelbina bitartrato equivalente a vinorelbina	Fada vinorelbina 50mg/5ml	Solucion inyectable	Caja por frasco ampolla de vidrio tipo 1incoloro, con tapon de bromobutilo y tapa flip off	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario.	Vencido	Laboratorio Internacional Argentino S.A.	20045958-1
L01CA04	INVIMA 2012M-0013277	Vinorelbina bitartrato equivalente a vinorelbina base	Vinorel® 50 mg	Solucion inyectable	Frasco ampolla transparente de 5 ml de vidrio tipo i boca 13 mm, con tapon de clorobutilo gris y precinto de seguridad en alu.	Carcinoma pulmonar de células pequeñas y carcinoma mamario	Vencido	Eriochem S.A	20047604-1

ATC INVIMA	REGISTRO SANITARIO	Principio activo	Nombre comercial	Forma farmacéutica	Presentación comercial	Indicación	Estado del registro	Titular	CUM
L01CA04	INVIMA 2017M-0017647	Vinorelbina bitartrato 69,25 mg equivalente a vinorelbina base	Gelovin 50 mg	Solución concentrada para infusión	Caja plegadiza por 1 vial de vidrio tipo I incoloro por 5 ml con tapón de caucho y sello flip-off de aluminio con disco de color azul	Carcinoma pulmonar de células no pequeñas y carcinoma mamario.	Vigente	Cipla Ltd	20094488-1
L01CA04	INVIMA 2017M-0017688	Vinorelbina bitartrato 13,85 mg equivalente a vinorelbina base	Gelovin 10 mg	Solución concentrada para infusión	Caja plegadiza por 1 vial de vidrio tipo I incoloro por 1 ml, con tapón de caucho y sello flip-off de aluminio con disco de color violeta.	Carcinoma pulmonar de células no pequeñas y carcinoma mamario.	Vigente	Cipla Ltd	20094490-1

Anexo 2 Priorización tecnologías

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría	Registrado en Colombia
L02BX03	Terapia dirigida	Abiaterona	2011	No		No
L01XE13	Proteinquinasa	Afatinib	2013	No		S
L03AC01	Coadyudante	Aldesleukin	1992	No		No
L01XE36	Proteinquinasa	Alectinib	2015	No		No
L04AA34	Monoclonal	Alemtuzumab	2001	No		Pérdida de fuerza de ejecución
L01XX01	Terapia dirigida	Amsacrina	No aprobada en FDA	No		No
L02BG03	Hormonoterapia	Anastrozol	1995	Estadios tempranos de cáncer Cáncer de mama metastásico		Si
L01XX02	Quimioterapia	Asparaginasa pegilada	2011	No		No
A04AD12	Coadyudante	Aprepitant / fosaprepitant	2003	No		Si
L01XX02	Quimioterapia	Asparaginasa	1978	Leucemia linfoblástica aguda	Leucemia linfoblástica aguda	Si
L01XX02	Quimioterapia	Erwina Asparaginasa	2011	No		No
L01XE17	Proteinquinasa	Axitinib	2012	No		Si
L01BC07	Terapia dirigida	Azacitidina	2004	No		Si
L01AA09	Terapia dirigida	Bendamustina	2008	Leucemia Linfocítica crónica Linfoma folicular		Si
L01XC07	Monoclonal	Bevacizumab	2004	Preparaciones del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF)		Si
L02BB03	Quimioterapia	Bicalutamida	1995	Cáncer de próstata metastásico.		Si
L01DC01	Quimioterapia	Bleomicina	1973	Linfoma no Hodgkin Sarcoma de kaposi Tumor de células germinales de ovario Tumor de células germinales de testículo	Linfoma Hodgkin Tumores de células germinales	Si

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría	Registrado en Colombia
L01XC19	Monoclonal	Blinatumomab	2014	No		No
L01XX32	Proteínquinasa	Bortezomib	2003	No		Si
L01XE14	Proteínquinasa	Bosutinib	2012	No		Si
L01XC12	Monoclonal	Brentuximab vedotin	2011	No		Si
L02AE01	Hormonoterapia	Buserelina		No		Si
L01AB01	Quimioterapia	Busulfan	1950	Si		Si
L01CD04	Terapia dirigida	Cabazitaxel	2010	No		Si
L01BC06	Quimioterapia	Capecitabina	1998	Cáncer de colon en etapa temprana Cáncer de recto en estadio temprano Cáncer de mama metastásico Cáncer colorrectal metastásico		Si
L01XA02	Quimioterapia	Carboplatino	1989	Cáncer de mama en etapa temprana Cáncer epitelial de ovario Cáncer de la nasofaringe Cáncer de pulmón de células no pequeñas Osteosarcoma Retinoblastoma	Osteosarcoma Retinoblastoma	Si
L01XX45	Proteínquinasa	Carfilzomib	2012	No		Si
L01AD01	Quimioterapia	Carmustina	1977	No		Si
L01XE28	Proteínquinasa	Ceritinib	2015	No		No
L01XC06	Monoclonal	Cetuximab	2004	No		Si
L01AA01	Quimioterapia	Ciclofosfamida	1959	Cáncer de mama en etapa temprana Cáncer de mama metastásico Leucemia linfoblástica aguda Leucemia linfocítica crónica Linfoma de Burkitt Linfoma difuso de células B grandes Linfoma folicular	<u>Rabdomiosarcoma</u> <u>Sarcoma de Erwing</u> <u>Leucemia linfoblástica aguda</u> <u>Linfoma Burkitt</u> <u>Linfoma Hodking</u>	Si

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría	Registrado en Colombia
				Neoplasia trofoblástica gestacional Rabdomiosarcoma Sarcoma de Ewing		
G03HA01	Hormonoterapia	Ciproterona	No aprobada en FDA	No		Si
L01XA01	Quimioterapia	Cisplatino	1978	Cáncer de cuello uterino (como radio-sensibilizador) Cáncer de cabeza y cuello (como radio-sensibilizador) Cáncer nasofaríngeo (como radio-sensibilizador) Cáncer de pulmón de células no pequeñas Osteosarcoma Tumor de células germinales ováricas Tumor de células germinales testiculares	Osteosarcoma Tumores de células germinales	Si
L01BC01	Quimioterapia	Citarabina	1969	Leucemia mielógena aguda -Leucemia linfoblástica aguda - Leucemia promielocítica aguda - Linfoma de Burkitt.	Leucemia linfoblástica aguda - Linfoma de Burkitt.	Si
L01BB04	Terapia dirigida	Cladribina	1993	No		Si
M05BA02	Coadyudante	clodronate	No tiene aprobación FDA	No		Si
L01AA02	Quimioterapia	Clorambucilo	1952	Leucemia linfocítica crónica		Si
L01XE38	Proteínquinasa	Cobimetinib	2015	No		No
L01XE16	Proteínquinasa	Crizotinib	2011	No		Si
L01XE23	Proteínquinasa	Dabrafenib	2013	No		Si
L01AX04	Quimioterapia	Dacarbazine	1975	Linfoma no Hodgkin	Linfoma no Hodgkin	Si

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría	Registrado en Colombia
L01DA01	Quimioterapia	Dactinomicin (actinomicina-d)	1964	Neoplasia trofoblástica gestacional Rabdomiosarcoma Tumor de Wilms	Tumor de Wilms Rabdomiosarcoma	Si
L01XC24	Monoclonal	Daratumumab	2015	No		No
B03XA02	Coadyudante	Darbepoetin	2001	No		Si
L01XE06	Terapia dirigida	Dasatinib	2006	Leucemia mieloide crónica resistente al imatinib		Si
L01DB02	Quimioterapia	Daunorubicina	1979	Leucemia linfoblástica aguda Leucemia mielógena aguda Leucemia promielocítica aguda	Leucemia linfoblástica aguda	Si
L01BC08	Terapia dirigida	Decitabine	2006	No		Si
L02BX02	Hormonoterapia	Degarelix	2008	No		Si
M05BX04	Monoclonal	Denosumab	2010	No		Si
V03AF02	Coadyudante	Dexrazoxane	1995	No		Si
L01CD02	Quimioterapia	Docetaxel	1996	Cáncer de mama en etapa temprana Cáncer de mama metastásico Cáncer metastásico de próstata		Si
L01DB01	Quimioterapia	Doxorubicin	1974	Cáncer de mama en etapa temprana Cáncer de mama metastásico Leucemia linfoblástica aguda Linfoma de Burkitt Linfoma de Hodgkin Linfoma difuso de células B grandes Linfoma folicular Osteosarcoma Sarcoma de Ewing Sarcoma de Kaposi Tumor de Wilms	Osteosarcoma, sarcoma de Erwing, leucemia linfoblástica aguda, tumor de Wilms, linfoma Brurkitt, linfoma hodking	Si
L02BB04	Hormonoterapia	Enzalutamide	2012			Si
L01DB03	Quimioterapia	Epirrubicina	1999	No		Si

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría	Registrado en Colombia
B03XA01	Coadyudante	Epoetin	1993	No		Si
L01XX41	Coadyudante	EriBULin	2010	No		Si
L01XE03	Proteinquinasa	Erlotinib	2004	No		Si
L01XX11	Hormonoterapia	Estramustine	1981	No		Si
L01AD04	Quimioterapia	Estreptozocin	1982	No		No
L01CB01	Quimioterapia	Etopósido	1983	Cáncer de pulmón de células no pequeñas Leucemia linfoblástica aguda Linfoma de Burkitt Linfoma de Hodgkin Neoplasia trofoblástica gestacional Retinoblastoma Sarcoma de Ewing Tumor de células germinales ováricas Tumor de células germinales testiculares	Retinoblastoma, Sarcoma de Erwin, tumor de células germinales, Linfoma burkitt, linfoma hodgkin, leucemia linfoblástica aguda	Si
L01XE10	Terapia dirigida	Everolimus	2009	No		Si
L02BG06	Hormonoterapia	Exemestane	1999	No		Si
L03AA02	Coadyudante	Filgrastim	1991	Neutropenia después de la quimioterapia mielotóxica previa Neutropenia febril asociada con quimioterapia mielotóxica. Para facilitar la administración de regímenes de quimioterapia a altas dosis Profilaxis primaria en pacientes con alto riesgo de desarrollar Profilaxis secundaria para pacientes que han experimentado	Profilaxis de neutropenia febril asociada a quimioterapias causantes de mielotoxicidad Profilaxis secundarias de pacientes que han tenido neutropenia febril Facilitar a administración de regímenes con dosis altas de quimioterapia	Si
L01BB05	Terapia dirigida	Fludarabina	1991	Leucemia linfocítica crónica		Si

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría	Registrado en Colombia
L01BC02	Quimioterapia	Fluorouracilo	1962	Cáncer colorrectal metastásico Cáncer de colon en estadio temprano Cáncer de la nasofaringe. Cáncer de mama en etapa temprana Cáncer de recto en estadio temprano		Si
L02BB01	Hormonoterapia	Flutamida	1989	No		Si
L02BA03	Hormonoterapia	Fulvestrant	2002	No		Si
L01XE02	Proteinquinasa	Gefitinib	2003	No		Si
L01BC05	Quimioterapia	Gemcitabine	1996	Cáncer epitelial de ovario Cáncer de pulmón de células no pequeñas		Si
L02AE03	Hormonoterapia	Goserelin	1989	No		Si
L01XX05	Quimioterapia	Hidroxiurea (hidroxicarbamida)	1967	Leucemia mieloide crónica		Si
L01XE27	Proteinquinasa	Ibrutinib	2013	No		Si
L01DB06	Quimioterapia	Idarubicina	1990	No		Si
L01XX47	Proteinquinasa	Idelalisib	2014	No		No
L01AA06	Quimioterapia	Ifosfamida	1967	Osteosarcoma Rabdomiosarcoma Sarcoma de Ewing Tumor de células germinales ováricas Tumor de células germinales testiculares	Osteosarcoma, rabdomiosarcoma, sarcoma de erwin, tumores de células germinales	Si
L01XE01	Proteinquinasa	Imatinib	2001	Leucemia mieloide crónica Tumor estromal gastrointestinal		Si
L03AB	Inmunoterapia	Interferón alfa 2b	1989	No		Si
L01XC11	Monoclonal	Ipilimumab	2011	No		Si
L01XX19	Quimioterapia	Irinotecan	1996	Cáncer colorrectal metastásico		Si

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría	Registrado en Colombia
L01DC04	Terapia dirigida	Ixabepilona	2007	No		Si
L01XX50	Proteinquinasa	Ixazomib	2015	No		No
H01CB03	Hormonoterapia	Lanreotide	2007	No		Si
L01XE07	Proteinquinasa	Lapatinib	2007	No		Si
L04AA13	Terapia dirigida	Lenalidomida	2005	No		Si
L01XE29	Proteinquinasa	Lenvatinib	2015	No		No
L02BG04	Hormonoterapia	Letrozole	1997	No		Si
V03AF03	Coadyudante	Leucovorin (folinato de calcio o cualquiera de las formas del ácido folínico)	1952	Cáncer de colon en estadio temprano Cáncer de recto en estadio temprano Neoplasia trofoblástica gestacional Cáncer colorrectal metastásico Osteosarcoma Linfoma de Burkitt	Osteosarcoma Linfoma de Burkitt	Si
L02AE02	Hormonoterapia	Leuprolida	1985	Cáncer de mama en etapa temprana Cáncer metastásico de próstata		Si
L01AD02	Quimioterapia	Lomustina	1977	No		Cancelado
L02AB02	Hormonoterapia	Medroxiprogesterona	1996	No		Si
L02AB01	Quimioterapia	Megestrol, Acetato	1967	No		si
L01AA03	Quimioterapia	Melfalan	1964	Si		Si
L01BB02	Quimioterapia	Mercaptopurina	1953	Leucemia linfoblástica aguda Leucemia promielocítica aguda	Leucemia linfoblástica aguda	Si
V03AF01	Coadyudante	Mesna	1988	Osteosarcoma Rabdomiosarcoma Sarcoma de Ewing. Tumor de células germinales ováricas Tumor de células germinales testiculares	Osteosarcoma, rabdomiosarcoma, sarcoma de erwin, tumores de células germinales	Si

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría	Registrado en Colombia
L01BA01	Quimioterapia	Metotrexate	1953	Cáncer de mama en etapa temprana Leucemia linfoblástica aguda Leucemia promielocítica aguda Neoplasia trofoblástica gestacional Osteosarcoma	Osteosarcoma, leucemia aguda linfoblástica	Si
L01DC03	Quimioterapia	Mitomicina	1981	No		Si
L01XX23	Terapia dirigida	Mitotane	1960	No		No
L01DB07	Quimioterapia	Mitoxantrona	1987	No		Si
	Quimioterapia	Nab-paclitaxel	2005	No		Si
L01BB07	Terapia dirigida	Nelarabina	2005	No		No
L01XE08	Proteinquinasa	Nilotinib	2007	Leucemia mieloide crónica resistente a imatinib		Si
L02BB02	Hormonoterapia	Nilutamida	1996	No		No
L01XC17	Monoclonal	Nivolumab	2014	No		Si
L01XC15	Monoclonal	Obinutuzumab	2013	No		Si
H01CB02	Hormonoterapia	Octreotida LAR	1998	No		Si
L01XC10	Monoclonal	Ofatumumab	2009	No		No
L01XX46	Proteinquinasa	Olaparib	2014	No		No
L01XE35	Proteinquinasa	Osimertinib	2015	No		No
L01XA03	Quimioterapia	Oxaliplatino	1999	Cáncer de colon en etapa temprana Cáncer colorrectal metastásico		Si
L01CD01	Quimioterapia	Paclitaxel	1992	Cáncer epitelial de ovario Cáncer de mama en etapa temprana Cáncer de mama metastásico Sarcoma de Kaposi Cáncer de nasofaringe	Tumores de células germinales de ovario	Si

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría	Registrado en Colombia
				Cáncer de pulmón de células no pequeñas Tumor de células germinales ováricas		
L01XE33	Proteinquinasa	Palbociclib	2015	No		No
M05BA03	Coadyudante	Pamidronato	1991	No		Si
L01XC08	Monoclonal	Panitumumab	2006	No		Si
L01XE11	Proteinquinasa	Pazopanib	2009	No		Si
L03AA13	Coadyudante	Pegfilgrastim	2002	No		Si
L01DB01	Quimioterapia	pegilated liposomal DOXOrubicin	1995	No		Si
L01XC18	Monoclonal	Pembrolizumab	2014	No		Si
L01BA04	Terapia dirigida	Pemetrexed	2004	No		Si
L01XC13	Monoclonal	Pertuzumab	2012	No		Si
L04AX06	Terapia dirigida	Pomalidomide	2013	No		No
L01XE24	Proteinquinasa	Ponatinib	2012	No		No
L01XD01	Terapia dirigida	Porfimer	2003	No		No
L01XB01	Quimioterapia	Procarbazina	1969	Si		No
L01BA03	Hormonoterapia	Raltitrexed	No aprobada en FDA	No		Vencido
L01XC21	Monoclonal	Ramucirumab	2014	No		No
L01XE21	Proteinquinasa	Regorafenib	2012	No		No
L01XC02	Monoclonal	Rituximab	1997	Leucemia linfocítica crónica Linfoma difuso de células B grandes Linfoma folicular		Si
L01XX39	Proteinquinasa	Romidepsin	2009	No		No
L01XE18	Proteinquinasa	Ruxolitinib	2011	No		Si
L04AC11	Monoclonal	Siltuximab	2014	No		No

Evidencia que promueve Confianza

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría	Registrado en Colombia
L01XE05	Proteínquinasa	Sorafenib	2005	No		Si
L01XE04	Proteínquinasa	Sunitinib	2006	No		Si
L04AX02	Terapia dirigida	Talidomide	1998	No		Si
L02BA01	Hormonoterapia	Tamoxifeno	1977	Cáncer de mama en etapa temprana Cáncer de mama metastásico		Si
L01BC03	Quimioterapia	Tegafur	No aprobada en FDA	No		Perdida Fuerza Ejecución
L01AX03	Quimioterapia	Temozolomida	2001	No		Si
L01XE09	Inmunoterapia	Temsirolimus	2007	No		Si
L01CB02	Quimioterapia	Teniposido	1992	No		no
L01BB03	Quimioterapia	Tioguanina	1966	Leucemia linfoblástica aguda	Leucemia linfoblástica aguda	Si
L01AC01	Quimioterapia	Tiotepa	1959	Si		No
L01XX17	Quimioterapia	Topotecan	1996	No		Si
L01CX01	Terapia dirigida	Trabectedina	2004	No		Si
L01XE25	Proteínquinasa	Trametinib	2013	No		Si
L01XC03	Monoclonal	Trastuzumab	1998	Cáncer de mama HER2 positivo en etapas tempranas Cáncer de mama metastásico HER2 positivo		Si
L01XC14	Monoclonal	Trastuzumab emtansine	2013	No		Si
L01XX14	Quimioterapia	Tretinoína	1995	Leucemia promielocítica aguda		Si
L01XX27	Terapia dirigida	Trióxido de arsénico	2000	No		Si
L02AE04	Hormonoterapia	Triptorelina	2000	No		Si
L01XE12	Terapia dirigida	Vandetanib	2011	No		No
L01XE15	Proteínquinasa	Vemurafenib	2011	No		Si
L01XX52	Terapia dirigida	Venetoclax	2016	No		No
L01CA01	quimioterapia	Vinblastina	1958	Sarcoma de Kaposi. Tumor de células germinales ováricas	Tumores de células germinales, linfoma Hodking	Si

ATC	Clase	Principio activo	Año de registro	Incluida en listado OMS 20 ^a adultos	Incluida en listado OMS 6 ^a pediatría	Registrado en Colombia
				Tumor de células germinales testiculares Linfoma de Hodgkin		
L01CA02	quimioterapia	Vincristina	1963	Leucemia linfoblástica aguda Linfoma de Burkitt. Linfoma de Hodgkin Linfoma difuso de células B grandes Linfoma folicular Neoplasia trofoblástica gestacional Rabdomiosarcoma Retinoblastoma Sarcoma de Ewing Sarcoma de Kaposi Tumor de Wilms	Retinoblastoma, Rabdomiosarcoma, Sarcoma de Erwin, tumor de wilms, Linfoma burkitt, linfoma hodking	Si
L01CA03	Terapia dirigida	Vindeseine	No aprobada en FDA	No		No
L01CA04	Quimioterapia	Vinorelbina	1994	Cáncer de pulmón de células no pequeñas Cáncer de mama metastásico		Si
L01XX43	Proteinquinasa	Vismodegib	2012	No		No
L01XX38	Terapia dirigida	Vorinostat	2006	No		Si
M05BA08	Coadyudante	Zolendronato	2001	No		Si

Anexo 3 Datos del modelo

ATC	Principio activo	Casos observados recobros	Casos estimados incluyendo régimen subsidiado
L01BC06	Capecitabina	2185	2780
L01AD01	Carmustina	0	4
L01DA01	Dactinomicin (actinomicina-d)	106	135
L01DB02	Daunorubicina	256	325
L01CD02	Docetaxel	1418	1804
L01DB03	Epirubicina	340	432
L03AA02	Filgrastim	1004	1277
L01BB05	Fludarabina	231	294
L01BC05	Gemcitabine	1023	1301
L01XX05	Hidroxiurea (hidroxicarbamida)	376	482
L01DB06	Idarubicina	197	251
L01AA06	Ifosfamida	871	1109
L01XX19	Irinotecan	1011	1287
L02AB01	megestrol, Acetato	0	30
L01AA03	Melfalan	41	53
V03AF01	Mesna	1335	1700
L01DC03	Mitomicina	181	229
L01DB07	Mitoxantrona	100	126
L01XA03	Oxaliplatino	2497	3178
L01XX14	Tretinoína (Ac. Todo trans retinoico)	190	241
L01CA04	Vinorelbina	187	238

Tabla 24. Dosis de Capecitabina

Capecitabina	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Gastrointestinal - Colorrectal				
Protocolo				
XELOX	1.000	mg /m ²	4	81.600
XELOX + bevacizumab	1.000	mg /m ²	4	81.600
Capecitabina	1.250	mg /m ²	14	357.000
CapeOX (oxaliplatin + capecitabina)	925	mg /m ²	14	264.180
Capecitabina + RDT	825	mg /m ²	5	84.150
CapeOX + bevacizumab	925	mg /m ²	14	264.180
Capecitabina + bevacizumab	925	mg /m ²	14	264.180
Dosis promedio				199.556
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 8	\$ 9	\$ 11	

Tabla 25. Dosis de Carmustina

Carmustina	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Linfoma Hodgkin				
Protocolo				
Mini -BEAM	60	mg /m ²	1	612
Dosis promedio				612
Cáncer de cerebro				
Protocolo				
Agente simple	175	mg /m ²	4	7.140
Dosis promedio				7.140
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	

Precio por mg \$ 20.313 \$ 20.401 \$ 20.455

Tabla 26. Dosis de Dactinomicina

Dactinomicina	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Sarcomas				
Protocolo				
VAC/IE	1,25	mg /m ²	1	14,88
VAIA	0,5	mg /m ²	3	15,30
VACA	0,5	mg /m ²	3	25,50
Dosis promedio				11,75
Coriocarcinoma				
Protocolo				
MAC	2,5	mg/día	5	127,5
Tumor de Wilms				
Protocolo				
Pre y post cirugía	15	mg/kg	1	2.604
Cáncer de testículo				
Protocolo				
Actinomicina	2,5	mg/día	5	75
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 97.531	\$ 105.999	\$ 118.296	

Tabla 27. Dosis de Daunorrubicina

Daunorrubicina	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Inducción de la remisión en la leucemia linfótica aguda de niños y de adultos				
Protocolo				
GRAALL-2003	40	mg /m ²	3	1.224
GRAALL-2003	30	mg /m ²	3	918
Dosis promedio				1.071
Leucemia mieloide aguda				
Protocolo				
Menores de 60 años Opción 1 Inducción	75	mg /m ²	3	2.295
Menores de 60 años Opción 2	60	mg /m ²	3	1.836

Menores de 60 años Opción 3	60	mg /m ²	3	1.836
Mayores de 60 años LMA de novo sin citogenética o marcadores desfavorables; sin antecedentes de trastorno hematológico	75	mg /m ²	3	2.295
Mayores de 60 años citogenética o marcadores desfavorables; antecedentes de trastorno hematológico Terapia de baja intensidad Opción 2	75	mg /m ²	3	2.295
Mayores de 60 años respuesta completa después de terapia intensiva Opción 1	75	mg /m ²	3	2.295
Dosis promedio				2.142
Leucemia mieloide crónica				
Protocolo				
Terapia de inducción en leucemia mieloide aguda fase avanzada Ph(+) AYA (Age 15 - 39 Years)	50	mg /m ²	3	1.530
Terapia de inducción en leucemia mieloide aguda fase avanzada Ph(+) AYA (Age 15 - 39 Years)	30	mg /m ²	2	408
Menores de 60 años Opción 2	60	mg /m ²	3	561
Menores de 60 años Opción 3	60	mg /m ²	3	1.224

Mayores de 60 años LMA de novo sin citogenética o marcadores desfavorables; sin antecedentes de trastorno hematológico	75	mg /m ²	3	2.295
Mayores de 60 años citogenética o marcadores desfavorables; antecedentes de trastorno hematológico Terapia de baja intensidad Opción 2	75	mg /m ²	3	2.295
Dosis promedio				1.386
Leucemia linfoblástica aguda				
Protocolo				
Inducción a la remisión para riesgo bajo (estándar) para LLA precursores B	30	mg /m ²	2	612
Inducción a la remisión para riesgo bajo (estándar) para LLA células T	30	mg /m ²	4	816
Inducción a la remisión para LLA de riesgo intermedio LLA precursores B y T	30	mg /m ²	4	748
Inducción a la remisión para LLA de riesgo alto	30	mg /m ²	4	816
Bloque 2 de LLA consolidación	30	mg /m ²	1	306
Dosis promedio				659,6
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 1.102	\$ 1.219	\$ 1.284	

Tabla 28. Dosis de Docetaxel

Docetaxel	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Cáncer gástrico				
Protocolo				
Docetaxel + irinotecan	35	mg /m ²	1	357
Docetaxel + cisplatino + fluorouracilo	75	mg /m ²	1	765
Docetaxel + cisplatino	85	mg /m ²	1	867
Docetaxel Opción 1	100	mg /m ²	1	1.020
Docetaxel Opción 2	36	mg /m ²	1	1.101,6
Dosis promedio				822,12
Cáncer de esófago				
Protocolo				
Irinotecan + docetaxel	50	mg /m ²	2	1.020
Irinotecan + docetaxel	50	mg /m ²	2	1.020
Dosis promedio				1.020
Cáncer de cabeza y cuello				
Protocolo				
Docetaxel + cisplatino + fluorouracilo	75	mg /m ²	1	765
Cisplatino + docetaxel	75	mg /m ²	1	765
Cisplatino + docetaxel	75	mg /m ²	1	765
Cisplatino + docetaxel + cetuximab	75	mg /m ²	1	765
Docetaxel	70	mg /m ²	1	714
Dosis promedio				754,8
Cáncer de mama				
Protocolo				
Docetaxel	80	mg /m ²	1	816
Docetaxel + capecitabina	75	mg /m ²	14	10.710

Pertuzumab + trastuzumab + docetaxel	87,5	mg /m ²	1	893
TC	75	mg /m ²	1	765
TAC	75	mg /m ²	1	765
AC + docetaxel	100	mg /m ²	1	1.020
TCH	75	mg /m ²	1	765
TCH + pertuzumab	75	mg /m ²	1	765
AC + docetaxel HERb2 positivo	100	mg /m ²	1	1.020
Docetaxel + ciclofosfamida + trastuzumab	75	mg /m ²	1	765
FEC Seguido de trastuzumab + docetaxel	87,5	mg /m ²	1	893
FEC Seguido de docetaxel	100	mg /m ²	1	1.020
Docetaxel + doxorubicina	75	mg /m ²	1	765
Transtuzumab + Docetaxel	35	mg /m ²	3	1.071
Pertuzumab +trastuzumab + docetaxel + FEC	87,5	mg /m ²	1	893
Dosis promedio				1.528
Cáncer de ovario				
Protocolo				
Docetaxel + carboplatino	67,5	mg /m ²	1	688,5
Dosis promedio				688,5
Cáncer de pulmón				
Protocolo				
CISPDOCE	75	mg /m ²	1	765
CRBPDOCE	75	mg /m ²	1	765
Docetaxel	75	mg /m ²	1	765
CISPDOCE segunda línea	75	mg /m ²	1	765
Docetaxel	100	mg /m ²	1	1.020
Docetaxel	100	mg /m ²	1	1.020
Docetaxel + gemcitabina	85	mg /m ²	1	867
Docetaxel + bevacizumab	75	mg /m ²	1	765

Dosis promedio				841,5
Cáncer de próstata				
Protocolo				
Docetaxel + estramustina Opción 1	35	mg /m ²	2	714
Docetaxel + estramustina Opción 2	60	mg /m ²	1	612
Docetaxel + prednisona	75	mg /m ²	1	765
Docetaxel	75	mg /m ²	1	765
Dosis promedio				714
Sarcoma de Kaposi				
Protocolo				
Docetaxel	25	mg /m ²	1	340
Dosis promedio				340
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 2.144	\$ 2.243	\$ 2.278	

Tabla 29. Dosis de Epirubicina

Epirubicina	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Cáncer de mama				
Protocolo				
Epirubicina	75	mg /m ²	1	765
FEC	50	mg /m ²	2	1.020
Epirubicina + CMF	100	mg /m ²	1	680
EC	75	mg /m ²	1	765
EC	100	mg /m ²	1	1.020
FEC seguido de pertuzumab + trastuzumab + docetaxel	100	mg /m ²	1	1.020
FEC seguido por pertuzumab + trastuzumab +paclitaxel	100	mg /m ²	1	1.020
Pertuzumab +trastuzumab + docetaxel + FEC	90	mg /m ²	1	918

Pertuzumab +trastuzumab + paclitaxel + FEC	90	mg /m ²	1	918
Dosis promedio				902,88
Cáncer de cabeza y cuello (nasofaringe)				
Protocolo				
Cisplatino + epirubicina +paclitaxel	60	mg /m ²	1	612
Dosis promedio				612
Cáncer gástrico				
Protocolo				
ECF	50	mg /m ²	1	510
ECF modificado con oxaliplatino	50	mg /m ²	1	510
ECF modificado con capecitabina	50	mg /m ²	1	510
ECF modificado con oxaliplatino y capecitabina	50	mg /m ²	1	510
Dosis promedio				510
Sarcoma de partes blandas				
Protocolo				
Epirifos	130	mg /m ²	1	1.326
Dosis promedio				1.326
Linfoma difuso de células B grandes				
Protocolo				
CEOP + rituximab	60	mg /m ²	1	612
Dosis promedio				612
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 3.004	\$ 3.718	\$ 4.495	

Tabla 30. Dosis de Filgrastim

Filgrastim	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Neutropenia Febril				
Protocolo				
Neutropenia Febril	6	mcg/kg	14	25.200
Dosis promedio				25.200
Precio por mg	\$ 254	\$ 271	\$ 279	

Tabla 31. Dosis de Fludarabina

Fludarabina	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Linfoma no Hodgkin				
Protocolo				
FCM	25	mg/m2	3	765
FCM+R	25	mg/m2	3	765
Fludarabina	25	mg/m2	5	1.275
FCM+R Paliativo	25	mg/m2	3	765
Dosis promedio				892,5
Leucemia mieloide aguda				
Protocolo				
Menores de 60 años Opción 4	30	mg/m2	5	1.530
Terapia para enfermedad refractaria Opción 2	30	mg/m2	5	1.530
Dosis promedio				1.530
Leucemia mieloide crónica				
Protocolo				
Menores de 60 años Opción 4	30	mg/m2	5	1.530
Dosis promedio				1.530
Leucemia linfocítica crónica				
Protocolo				
CF	20	mg/m2	5	1.020
FP	30	mg/m2	5	1.530
FR	25	mg/m2	5	1.275
FCR	25	mg/m2	3	765
Fludarabina	25	mg/m2	5	1.275
Dosis promedio				1.173
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 8.403	\$ 9.516	\$ 11.133	

Tabla 32. Dosis de Gemcitabina

Gemcitabina	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Cáncer de pulmón				
Protocolo				
Gemcitabina + cisplatino	1.250	mg/m2	2	25.500

Gemcitabina + carboplatino	1.000	mg/m2	3	30.600
Gemcitabina + cisplatino opción 1	1.000	mg/m2	2	20.400
Gemcitabina + cisplatino opción 2	1.250	mg/m2	2	25.500
Docetaxel+ gemcitabina	1.000	mg/m2	2	20.400
Vinorelbina+ gemcitabina	1.000	mg/m2	2	20.400
Gemcitabina	1.250	mg/m2	2	25.500
Dosis promedio				24.042,86
Cáncer de páncreas				
Protocolo				
Gemcitabina + capecitabina Opción 1	1.000	mg/m2	3	30.600
Gemcitabina + capecitabina Opción 1	1.000	mg/m2	2	20.400
Gemcitabina + docetaxel + capecitabina	750	mg/m2	2	15.300
Gemcitabina + oxaliplatino Opción 1	1.000	mg/m2	1	10.200
Gemcitabina + oxaliplatino Opción 2	1.000	mg/m2	1	10.200
Gemcitabina + oxaliplatino Opción 2	1.000	mg/m2	3	35.700
Gemcitabina	1.000	mg/m2	3	35.700
Gemcitabina	1.000	mg/m2	3	35.700
Gemcitabina	1.000	mg/m2	3	30.600
Gemcitabina	1.000	mg/m2	3	30.600
Dosis promedio				25.500
Cáncer de vejiga				
Protocolo				
Gemcitabina + cisplatino	1.000	mg/m2	3	30.600
Gemcitabina + cisplatino	1.000	mg/m2	3	20.400

Gemcitabina + carboplatino	1.000	mg/m2	2	20.400
Gemcitabina	1.200	mg/m2	3	36.720
Gemcitabina + paclitaxel	1.250	mg/m2	1	12.750
Ifosfamida + doxorubicina + gemcitabina	150	mg/m2	2	3.060
Gemcitabina	1.200	mg/m2	4	48.960
Gemcitabina	75	mg/m2	3	2.295
Dosis promedio				21.898,13
Cáncer de ovario				
Protocolo				
Gemcitabina + cisplatino	1.125	mg/m2	2	22.950
Gemcitabina	1.000	mg/m2	2	20.400
Gemcitabina + carboplatino	1.000	mg/m2	2	20.400
Gemcitabina + doxorubicina liposomal	1.000	mg/m2	2	20.400
Dosis promedio				21.037,5
Cáncer de mama				
Protocolo				
Gemcitabina	1.000	mg/m2	3	30.600
GT	1.250	mg/m2	2	25.500
Gemcitabina + carboplatino	1.000	mg/m2	2	20.400
Gemcitabina + trastuzumab	1.200	mg/m2	2	24.480
Dosis promedio				25.245
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 78	\$ 91	\$ 112	

Tabla 33. Dosis de Hidroxiurea

Hidroxiurea	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Hematológico				
Protocolo				
HYDR	15	mg/kg	1	383.250
Dosis promedio				383.250
Cáncer de Cabeza y cuello				
Protocolo				

Terapia sistémica + radioterapia concurrente	1.000	mg/kg	11	143.000
Dosis promedio				143.000
Leucemia mieloide aguda y crónica				
Protocolo				
Mayores de 60 años no candidatos a terapia intensiva Terapia de baja intensidad opción 2	25	mg/kg	1	638.750
Dosis promedio				638.750
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 1,5	\$ 2,3	\$ 2,5	

Tabla 34. Dosis de Idarrubicina

Idarrubicina	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Leucemia linfoblástica aguda				
Protocolo				
GRAALL-2003 rescate	12	mg /m ²	3	367,2
GRAALL-2003 Intensificación tardía	9	mg /m ²	3	275,4
Regímenes que contienen citarabina	40	mg /m ²	1	408
Dosis promedio				350,2
Leucemia mieloide aguda				
Protocolo				
Menores de 60 años Opción 1 y 3	12	mg /m ²	3	367,2
Menores de 60 años Opción 4	8	mg /m ²	3	244,8

Mayores de 60 años LMA de novo sin citogenética o marcadores desfavorables; sin antecedentes de trastorno hematológico	12	mg /m ²	3	367,2
Mayores de 60 años citogenética o marcadores desfavorables; antecedentes de trastorno hematológico Terapia de baja intensidad Opción 2	12	mg /m ²	3	367,2
Mayores de 60 años respuesta completa después de terapia intensiva Opción 1	12	mg /m ²	3	367,2
Terapia para enfermedad refractaria Opción 2	10	mg /m ²	3	306
Terapia para enfermedad refractaria Opción 4	7	mg /m ²	3	214,2
Dosis promedio				319,114
Leucemia mieloide aguda promielocítica				
Protocolo				
Recomendaciones PETHEMA LPA2012 menores de 60 años	12	mg /m ²	4	489,6
Recomendaciones PETHEMA LPA2012 Mayores de 60 años	12	mg /m ²	3	367,2

Mayores de 60 años menores de 60 con riesgo bajo Opción 1	5	mg /m ²	4	204
Mayores de 60 años menores de 60 con riesgo bajo Opción 3	12	mg /m ²	1	122,4
Menores de 60 años con riesgo intermedio Opción 1	5	mg /m ²	4	204
Menores de 60 años con riesgo intermedio Opción 3	12	mg /m ²	1	122,4
Menores de 60 años con riesgo alto Opción 1	5	mg /m ²	4	204
Menores de 60 años con riesgo alto Opción 3	12	mg /m ²	1	81,6
Dosis promedio				428,4
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 15.007	\$ 57.708	\$ 67.300	

Tabla 35. Dosis de Ifosfamida

Ifosfamida	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Sarcomas Osteogénico				
Protocolo				
Neoadyudante	3.000	mg /m ²	3	91.800
Adyudante	2.800	mg /m ²	3	85.680
VAC/IE	1.800	mg /m ²	3	55.080
VAIA	2.000	mg /m ²	3	61.200
VIDE	3.000	mg /m ²	3	91.800
VAIA	2.000	mg /m ²	3	61.200
Ifosfamida + carboplatino + etopósido	1.800	mg /m ²	2	36.720
Ifosfamida a dosis altas	1.800	mg /m ²	5	91.800
Dosis promedio				71.910

Linfoma no Hodgkin pediátrica				
Protocolo				
Bajo riesgo	800	mg /m ²	5	8.000
Riesgo 1	800	mg /m ²	5	8.000
Riesgo 2	800	mg /m ²	5	8.000
Riesgo 3	800	mg /m ²	5	8.000
Riesgo 4	800	mg /m ²	5	8.000
RIESGO 4-SNC	800	mg /m ²	5	8.000
Riesgo alto	800	mg /m ²	5	8.000
Dosis promedio				8.000
Linfoma no Hodgkin				
Protocolo				
ICE + rituximab	5.000	mg /m ²	1	51.000
MINE	1.330	mg /m ²	3	40.698
MINE + rituximab	2.000	mg /m ²	3	61.200
CODOX-M/IVAC (modificado) (cyclophosphamide + vincristine + doxorubicin + high-dose methotrexate alternating with ifosfamide + etoposide + high-dose cytarabine)	1.500	mg /m ²	5	76.500
Dosis promedio				57.349,50
Cáncer de vejiga				
Protocolo				
Ifosfamida + doxorubicina + gemcitabina	1.500	mg /m ²	5	76.500
Dosis promedio				76.500
Hematología linfoma de Hodgkin				
Protocolo				
(MINE) Mitoxantrona + Ifosfamida + Mesna + Etoposido	1.330	mg /m ²	3	40.698
ICE	5.000	mg /m ²	1	51.000
Dosis promedio				45.849
Sarcomas partes blandas				
Protocolo				
Epirifos	1.800	mg /m ²	5	91.800

Dosis promedio				91.800
Linfoma primario del SNC				
Protocolo				
Primera línea	1.500	mg /m ²	3	45.900
Dosis promedio				45.900
Cáncer de cérvix				
Protocolo				
Ifosfamida	1.500	mg /m ²	1	15.300
Ifosfamida + paclitaxel	1.600	mg /m ²	3	48.960
Ifosfamida + cisplatino	1.600	mg /m ²	4	65.280
Dosis promedio				43.180
Pulmón - Células no pequeñas				
Protocolo				
Ifosfamida	2.000	mg /m ²	1	20.400
Dosis promedio				20.400
Cáncer de testículo				
Protocolo				
Etopósido + ifosfamida + mesna + cisplatino	1.200	mg /m ²	5	61.200
Vinblastina + ifosfamida + cisplatino + mesna	1.200	mg /m ²	5	61.200
Paclitaxel + ifosfamida + mesna + cisplatino	1.500	mg /m ²	4	61.200
Paclitaxel + ifosfamida + mesna + carboplatino (Altas dosis)	2.000	mg /m ²	4	81.600
VIP	1.200	mg /m ²	5	61.200
Dosis promedio				65.280
Timoma				
Protocolo				
VIP	1.200	mg /m ²	5	61.200
Ifosfamida	1.500	mg /m ²	5	76.500
Dosis promedio				68.850
Leucemia linfoblástica aguda				

Protocolo				
Bloque 2 de la consolidación	1.600	mg /m ²	3	48.960
Dosis promedio				48.960
Carcinoma de ovario				
Protocolo				
BIP	5.000	mg /m ²	1	51.000
BIC	400	mg /m ²	3	12.240
Dosis promedio				31.620
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 47,35	\$ 57,23	\$ 67,83	

Tabla 36. Dosis de Irinotecan

Irinotecan	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Cáncer colorrectal				
Protocolo				
FOLFOXIRI	165	mg /m ²	1	1.683
FOLFOXIRI+bevacizumab	165	mg /m ²	1	1.683
IROX	200	mg /m ²	1	2.040
FOLFIRI	180	mg /m ²	1	1.836
FOLFIRI + bevacizumab	180	mg /m ²	1	1.836
FOLFIRI + cetuximab	180	mg /m ²	1	1.836
FOLFIRI + panutumumab	180	mg /m ²	1	1.836
IRIN	125	mg /m ²	4	5.100
IRIN	180	mg /m ²	1	1.836
IRIN	350	mg /m ²	1	3.570
IRIN(Wx4)	125	mg /m ²	4	5.100
CETU IRIN(Q2W)	125	mg /m ²	4	5.100
XELIRI OPCIÓN 1	250	mg /m ²	1	2.550
XELIRI OPCIÓN 2	150	mg /m ²	1	1.530
Bevacizumab +cetuximab +irinotecan	180	mg /m ²	1	1.836
CETU IRIN+CETU	180	mg /m ²	1	1.836
Dosis promedio				2.575,50
Cáncer de cuello uterino				

Protocolo				
Irinotecan	125	mg /m ²	1	1.275
Irinotecan+ cisplatino	60	mg /m ²	3	1.836
Irinotecan	125	mg /m ²	4	5.100
Dosis promedio				2.737
Cáncer de ovario				
Protocolo				
Irinotecan +bevacizuman	60	mg /m ²	3	1.836
Dosis promedio				1.836
Cáncer de pulmón				
Protocolo				
Carboplatino + irinotecan	50	mg /m ²	3	1.530
Cisplatino +irinotecan	60	mg /m ²	3	1.836
Irinotecan	90	mg /m ²	3	2.754
Irinotecan	300	mg /m ²	1	3.060
Dosis promedio				2.295
Cáncer gástrico				
Protocolo				
Fluorouracil e irinotecan (irinotecan + leucovorin + 5-FU)	150	mg /m ²	1	1.530
Irinotecan	350	mg /m ²	1	3.570
Irinotecan + cisplatino	65	mg /m ²	1	663
Irinotecan + fluopirimidina	250	mg /m ²	1	2.550
Irinotecan + fluopirimidina	180	mg /m ²	1	1.836
Docetaxel + irinotecan	50	mg /m ²	1	510
IPB	65	mg /m ²	2	1.326
Dosis promedio				1.712,14
Cáncer páncreas				
Protocolo				
FOLFIRINOX	180	mg /m ²	1	1.836
Dosis promedio				1.836
Gliomas				
Protocolo				

Bevacizumab + irinotecan	340	mg /m ²	1	3.468
Irinotecan	600	mg /m ²	1	6.120
Bevacizumab + irinotecan	340	mg /m ²	1	3.468
Dosis promedio				4.352
Cáncer de esófago				
Protocolo				
Irinotecan + cisplatino	65	mg /m ²	4	2.652
Irinotecan + docetaxel	35	mg /m ²	2	714
5-FU e irinotecan (irinotecan + leucovorin + 5-FU)	80	mg /m ²	1	816
Irinotecan + fluopirimidina	250	mg /m ²	14	35.700
Fluorouracil e irinotecan (irinotecan + leucovorin + 5-FU)	180	mg /m ²	1	1.836
Irinotecan + docetaxel	35	mg /m ²	2	714
Dosis promedio				7.072
Cáncer de piel				
Protocolo				
Irinotecan	350	mg /m ²	2	7.140
Dosis promedio				7.140
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 119	\$ 193	\$ 271	

Tabla 37. Dosis de Megestrol

Megestrol	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Cáncer de mama				
Protocolo				
Megestrol	40	mg	365	58.400
Dosis promedio				58.400
Cáncer de endometrio				
Protocolo				
Megestrol	160	mg	365	58.400
Dosis promedio				58.400

Caquexia				
Protocolo				
Megestrol	800	mg	365	292.000
Dosis promedio				292.000
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$2.67	\$ 2, 94	\$3, 23	

Tabla 38. Dosis de Melfalan

Melfalan	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Cáncer colorrectal				
Protocolo				
MPT	4	mg /m ²	7	285,6
Melpred	8,5	mg /m ²	4	346,8
Meldexa	10	mg /m ²	4	408,0
BMP Régimen estándar	9	mg /m ²	4	367,2
BMP Régimen alternativo	9	mg /m ²	4	367,2
Dosis promedio				355,0
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 4.648	\$ 4.648	\$ 4.648	

Tabla 39. Dosis de Mesna

Mesna	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Linfoma de Hodgkin				
Protocolo				
(MINE) Mitoxantrona + Ifosfamida + Mesna + Etoposido	1330	mg /m ²	3	40.698
(MINE) Mitoxantrona + Ifosfamida + Mesna + Etoposido	500	mg /m ²	3	15.300
Dosis promedio				27.999
Linfoma no Hodgkin				
Protocolo				

MINE + rituximab	2.000	mg /m ²	3	61.200
Dosis promedio				61.200
Sarcoma de partes blandas				
Protocolo				
Epirifos	360	mg /m ²	5	18.360
Dosis promedio				18.360
Leucemia linfoblástica aguda				
Protocolo				
LLA-INC 2012	300	mg /m ²	1	3.060
Dosis promedio				3.060
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 21	\$ 24	\$ 27	

Tabla 40. Dosis de Mitomicina

Mitomicina	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Cáncer superficial de vejiga				
Protocolo				
5 FU + mitomicina	12	mg /m ²	1	122,4
Dosis promedio				122,4
Cáncer superficial de vejiga				
Protocolo				
Mitomicina	6	mg /m ²	1	61,2
Dosis promedio				61,2
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 6.857	\$ 7.490	\$ 8.127	

Tabla 41. Dosis de Mitoxantrona

Mitoxantrona	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Cáncer de próstata recidivante resistente a la castración				
Protocolo				
Mitoxantrona + prednisona	12	mg /m ²	1	122,4
Dosis promedio				122,4
Linfoma de Hodgkin				
Protocolo				
MINE	8	mg /m ²	1	81,6
Dosis promedio				81,6
Linfoma no Hodgkin				
Protocolo				

CNOP	10	mg /m ²	1	102
MINE + rituximab	8	mg /m ²	1	81,6
FCM	10	mg /m ²	1	102
FCM+R	6	mg /m ²	1	61,2
Dosis promedio				86,7
Leucemia mieloide aguda				
Protocolo				
Terapia para enfermedad refractaria Opción 3 con Mitoxantrona	6	mg /m ²	6	367,2
Mayores de 60 años LMA de novo sin citogenética o marcadores desfavorables; sin antecedentes de trastorno hematológico	12	mg /m ²	3	367,2
Mayores de 60 años citogenética o marcadores desfavorables; antecedentes de trastorno hematológico Terapia de baja intensidad Opción 2	12	mg /m ²	3	367,2
Dosis promedio				367,2
Leucemia mieloide crónica				
Protocolo				
Mayores de 60 años LMA de novo sin citogenética o marcadores desfavorables; sin antecedentes de trastorno hematológico	12	mg /m ²	3	367,2

Mayores de 60 años citogenética o marcadores desfavorables; antecedentes de trastorno hematológico Terapia de baja intensidad Opción 2	12	mg /m ²	3	367,2
Dosis promedio				367,2
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 1.047	\$ 1.174	\$ 1.293	

Tabla 42. Dosis de Oxaliplatino

Oxaliplatino	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Cáncer colorrectal				
Protocolo				
FOLFOXIRI	85	mg /m ²	1	867
FOLFOXIRI+bevacizumab	85	mg /m ²	1	867
IROX	85	mg /m ²	1	867
mFOLFOX6	85	mg /m ²	1	867
mFOLFOX6 + Beva	85	mg /m ²	1	867
mFOLFOX6 + PNTM	85	mg /m ²	1	867
XELOX	130	mg /m ²	1	1.326
XELOX + beva	130	mg /m ²	1	1.326
FUFOX	50	mg /m ²	4	2.040
CapeOX (oxaliplatin + capecitabina)	130	mg /m ²	1	1.326
CapeOX + bevacizumab	130	mg /m ²	14	18.564
FOLFOX4 + cetuximab	85	mg /m ²	1	867
Dosis promedio				2.554,25
Linfoma no hodgkin agresivos				
Protocolo				
GEMOX	100	mg /m ²	1	1.020

GEMOX + rituximab	100	mg /m ²	1	1.020
Dosis promedio				1.020
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 787,70	\$ 938,07	\$ 1.046,46	

Tabla 43. Dosis de Tretinoína

Tretinoína	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Leucemia mieloide aguda promielocítica				
Protocolo				
Recomendaciones PETHEMA LPA2012 inducción mayores de 60 y menores de 60	45	mg /m ²	1	459
Recomendaciones PETHEMA LPA2012 Inducción mayores de 60 y menores de 60	45	mg /m ²	15	6.885
Recomendaciones PETHEMA LPA2012 consolidación mayores de 60 y menores de 60 opción 1, Opción 2, Opción, Opción 3	45	mg /m ²	15	6.885
Recomendaciones PETHEMA LPA2012 consolidación mayores de 60 y menores de 60 opción 1, Opción 2, Opción, Opción 3 mantenimiento	45	mg /m ²	15	13.770
Dosis promedio				6.999,75
Precio por mg	\$ 12	\$ 14	\$ 17	

Tabla 44. Dosis de Vinorelbine

Vinorelbine	Dosis	Unidad de dosificación	Días	Total dosis
Carcinoma mamario				
Protocolo				
Vinorelbine	25	mg /m ²	1	255
Trastuxumab + vinorelbine opción 1	25	mg /m ²	1	255
Trastuxumab + vinorelbine opción 2	30-35	mg /m ²	2	663
Dosis promedio				391
Cáncer de pulmón de células no pequeñas.				
Protocolo				
Vinorelbine + cisplatino Opción 1	25	mg /m ²	4	1.020
Vinorelbine + cisplatino Opción 2	30	mg /m ²	4	816
Vinorelbine + cisplatino Opción 3	25-30	mg /m ²	2	374
Vinorelbine + carboplatino	30	mg /m ²	2	408
Vinorelbine + cisplatino	25	mg /m ²	2	510
Vinorelbine + cisplatino+cetixumab	25	mg /m ²	4	1.020
Vinorelbine + gemcitabina	25	mg /m ²	2	510
Vinorelbine	30	mg /m ²	3	918
Dosis promedio				697
	Pr. min	Pr. prom	Pr. max	
Precio por mg	\$ 681	\$ 686	\$ 696

Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud®

Evidencia que promueve Confianza

Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud®

Evidencia que promueve Confianza

Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud®

Evidencia que promueve Confianza

www.iets.org.co

Carrera 49 a No. 91 - 91
Bogotá, D.C., Colombia

(+571) 3770100

contacto@iets.org.co

[@ietscolombia](https://twitter.com/ietscolombia)

[ietscolombia](https://www.youtube.com/channel/UCi2scolombia)